




R. 5

3/17

f

Constit. xx, arg. die, 28, mensis Aprilis, anno, salutis 1865

Uoluer

 Linm

27  
C. 6



Det 13  

---

no 72





REALDI COLUMBI  
CREMONENSIS,  
In almo Gymnasio Romano  
Anatomici celeberrimi,  
DE RE ANATOMICA  
LIBRI XV.



VENETIIS, Ex Typographia Nicolai Beuilacquæ, M D LIX.  
CVM PRIVILEGIIS.









# PIO IIII. PONT. MAX.

LAZARVS ET PHOEBVS COLVMBI

S. ET F. P. D.



CRIPSERAT Realdus Columbus Cremonensis pater superioribus annis de re Anatomica libros xv. distinctè sanè atque accuratè : quos cum à doctissimis uiris probari , atque expeti intelligeret propediem æditurus erat. Iamq; æneis caracteribus Venetijs describebantur, cum illum nobis præ propera mors inuidit. Quamobrem nos qui ha-

ctenus in luctu ac mœrore ob tanti viri obitum uersabamur: fœlicissimo atque exoptatissimo Pontificatus tui nomine audito, cœpimus aliquantulum respirare, atque eisdem patris labores ædere, tibiq; P I E IIII. Pont. Max. nuncupare statuimus. cui enim quæso, te Pontifice uiuens pater suas nuncupasset uigilias, nisi tuæ Sanctitati, à qua se amari, & diligere, & magnifici certò sciebat? à qua facillè euehi, atque ad alia cudenta poterat impelli. Neque id mirum: tu enim non modo patri magno Anatomico semper fauisti, sed cum omnibus præclaris disciplinis iam inde à puero refertissimus sis: doctos uiros omnes qui ad te accesserunt consilio, & autoritate fouisti, & tuis semper amplissimis opibus aluisti. Vt igitur Beatissime Pater Realdi demortui memoria te Pontifice reuiuifcat, innata tua benignitate hos de Anatome libros hilari fronte suscipe, eiusque liberis, qui tuis sanctissimis pedibus prouoluti pietatem tuam implorant, fer opem, ut auxilio liberalitatis adiuti, tanti patris uestigia persequi possint, ac in bonarum literarum studia dies noctesque toto pectore incumbere. Deus ac dominus noster qui te in Petri sedem consentientibus omnium patrum suffragijs collocauit, quam diutissime incolumem fœlicemque conseruet.

# REALDVS COLVMBVS CREMONENSIS CANDIDO LECTORI.



VM mihi in mentem venit post diuturnos, & pene infinitos, quos in secandis hominum cadaueribus suscepi labores, de uniuersa Anatome primum, deinde uero de anatomica administratione, quæ obseruari, & cum rei natura consentire experimento didici, scribere: putavi non defuturos, qui meos hosce conatus tanquam inutiles & superuacaneos aspernarentur, quippe qui noua de rebus anatomicis in lucem edentibus suum Auicennam, principem omnium, ut ipsi asserunt, disciplinarum, Mundinum, Carpum, proceres in Anatome viros magno cum fastu obijciunt, quorum scriptis in hoc argumento nihil quicquam adijci posse videatur. Alios non modo quos dixi, sed Galenum, Vesaliūmq; in medium asferre, post quorum scripta de humanis corporibus secandis tractare, superbi, ambitiosi que scriptoris officium arbitrantur esse. ueruntamen ex his nemo me à scribendo detertere potuit, cum eorum friuolis scilicet obiectionibus facili, uereq; responderi possit. quod enim ad tres illos auctores attinet, quos primo obijciebant, carmen illud tritum illis existimo conuenire,

Sunt bona, sunt quædam mediocria, sunt mala plura.

De Galeno autem non negauerim illum non modo in Anatome mihi, cæterisq; sed in reliquis medicinarum partibus ducem fuisse, infinitumque esse quantum tanto viro medici omnes post Hippocratem debeant: tamen cum simias, cynocephalosq; pro humanis corporibus ille fecerit, erroribus compluribus Galeni libri de re anatomica non scateri non possunt. De Vesalio uero hoc primum præfabor, me illum honoris gratia domi, forisq; semper nominasse, illiusq; scripta non esse à doctorum manibus ullo prætextu excutienda, quippe qui diuinis de rebus anatomicis Galeni laboribus de re anatomica multa suo Marte addiderit, multa primus errata deprehenderit, correxeritque, ea est tam huiusce nobilissimæ, præutilis, arque adeo necessariæ facultatis anatomice difficultas, ut vni omnia peruia esse non possint: ita ut ne ingens quidem, atque insigne Vesalij volumen de fabrica humani corporis suis erroribus careat. Quamobrem nihil tibi mirum videri debet lector optime, si post tot conatus excellentissimorum virorum de ipsdem rebus tractare non vereamur. nam cum artes omnes atque disciplinæ per additionem deinceps posterorum perficiantur, fiet haud dubie ut post multos huius argumenti diligentissimos scriptores Anatomes quoque cognitio perfecta denique euadat, neque nostra in ipsdem rebus industria superuacua iudicari merito possit. Iudicium uero harum rerum obsecro te ne prius feras quam cuncta perlegeris. Vale cande lector, atque omnia boni consule. quæ si placuisse intellexero, maiora videbis sat scio. Datæ ROMÆ Calen. Iunij. M D LIX.

## EXEMPLVM PRIVILEGII S. R. ECCLESIAE.

G. Ascanius Sfortia Sanctæ Mariæ in via lata Diaconus Cardinalis de Santa Flora  
S. R. E. Camerarius.



NI VERSIS & singulis bibliopolis, impressoribus, librarijs, & alijs id genus artificibus tam almæ Urbis quam aliorum quoruncunque Sanctæ Romanæ Ecclesiæ mediate vel immediate subiectorum prouinciarum, ciuitatum, oppidorum & locorū salutem in Domino & obedientiam: Quandoquidem, sicuti nobis fide dignorum testimonio innouit, Dominus Realdus Columbus Cremonensis nonnullos libros de re Anatomica à se cōpositos, Venetijs partim nuper impressos, partim proxime ut sperat, imprimendos, est editurus, Nos volentes oportune ut par est, prouidere, ne eidem Domino Realdo qualiacunque inde prouentura, & lucrum & laus à quopiam alio præripiatur, sed ut indultrix, & laborum suorum, ipse & non quiuus alius præmia ferat, De mandato Sanctissimi Domini nostri Papæ vniū vocis oraculo nobis facto, & Auctoritate nostra Camerariatus officii, Vobis omnibus, & singulis superscriptis sub excōmunicationis latæ sententiæ, & quingentorū ducatorū auri Cameræ Apostolicæ inferendorū ac librorum siquos cōtra huius nostræ inhibitionis formam im primi continget, amissionis, alijsq; nostri arbitrij pœnis stricte inhibebimus, ne durante decennio proxime-



me futuro dictos prefati Domini Realdi libros, vsquam in vrbe aut Prouinciis. Ciuitatibus, oppidis, & locis predictis sine dicti Domini Realdi consensu seu licentia imprimere, vel impressos vendere audeatis aut presumatis, Alioquin &c. Contrarijs non obstantibus quibuscunque. Datum Romæ in Camera Apostolica, Die xviij. Iunij. M D LIX. Pontificatus predicti Santissimi in Christo Patris & Domini nostri Domini Pauli diuina prouidentia Papæ iiii. Anno Quinto.

Locus Sigilli

G. Ascanius Cardinalis Camerarius.

Hic. de Tarano.

## EXEMPLVM PRIVILEGII CAESAREI.

**F**ERDINANDVS Diuina fauente clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus ac Rex Germaniæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiae, Sclauoniæ, &c. Infans Hispaniarum, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ &c. Marchio Morauie &c. Comes Tyrolis &c. Notum esse volumus vniuersis, quod cum nobis demonstratum sit honorabilem doctum nostrum & sacri Imperij fidelem dilectum Realdum Columbum Cremonensem Medicinæ Doctorem multo labore summissque vigilis opus Anatomicum omnibus Medicinæ studiosis apprimè vtile concinnasse, quod in lucem hominū ædere cōstituerit, dummodo fauore nostro ac priuilegio firmissimo cōtra emulorum fraudes & dolos, qui forte ipsum, aut Typographum vitiosa emulatione, aut finistris artibus debito fructu, & emolumento fraudarent, munitus & instructus sit; Nos sanè intelligentes, quantū rerum Anatomicarum cognitio omnibus Medicinæ candidatis ac Professoribus utilis sit, tam præclaros eiusdem Realdi conatus, non solum clementer approbauimus, verum etiam autoritate nostra Cæsarea promouē dos esse duximus. Quocirca per præsentes literas scienter, atque animo bene deliberato, & ex Cæsarea autoritate nostra, seriò ac firmiter inhibemus ac vetamus, vniuersis & singulis Typographis & bibliopolis, atque alijs quibuscunque; qui in Sacro Romano Imperio & Regnis Dominiisq; nostris hereditariis vel imprimendis vel vendendis libris, seu quacunque alia ratione ac modo librariā negociationē exercent, nequis eorum præmemoratum opus Anatomicū postquam eiusdem Realdi opera & studio in lucem prodierit, per totum decennium ab æditionis absolutæ die numerandū, intra Sacri Imperij & omnium Regnorum ac Prouinciarum nostrarum fines ac pomezia eodem uel alio caractere recudere, aut vbiunque recudendum dare, alioque impressum adducere, viderè vel distrahere, palam uel occultè aut sit. Quisquis uero aliter fecerit & interdictum hoc nostrum neglexerit, is debet non solum eiusmodi libris impressis priuari, quos nimirum præfatus Realdus uel eius hæredes, & sibi vindicare poterint, eo auxilio magistratus eius loci, aut sua quoque auctoritate apprehendere, & dicto Realdo eiusve hæredibus ex æquo soluendis & numerandis multari. Ita tamen ut prædictus Realdus bina exemplaria librorum singulorum ad Imperialem Cancellariam latinam primo quoque tempore mittere teneatur; Proinde mādamus vniuersis & singulis nostris ac sacri Imperij Romani subditis & fidelibus dilectis, tam ecclesiasticis quam secularibus, cuiuscunque gradus, ordinis, status, conditionis, & dignitatis extiterint, præsertim uerò ijs qui in magistratu constituti sunt, & vel superiorem suorum uel proprio nomine ac loco, iuris & iustitiæ administrationē exercent, ne quemquam hoc priuilegium seu interdictum nostrum impunè uiolare, spernere vel negligere patiantur, sed siquos contumaces compererint, præscripta pœna plecti, & quibuscunque rectè fieri potest modis coerceri curent, quatenus & ipsi grauissimam indignationē nostram ac eandem multam incurrere noluerint; Quod enim hæc rata & firma sint hæc literis nostris testatum esse volumus, quas dedimus manus nostræ subscriptione, & sigilli nostri impressione roboratas in nostra, & Imperij ciuitate Augusta Vindelicorum die secūda Aprilis, Anno Domini Millesimo, Quingentesimo, Quinquagesimo nono. Regnorum nostrorum Romani Vigesimo Nono, aliorum vero Tricesimo tertio.

Locus Sigilli

Ferdinandus

Ad mandatum Sacræ  
Cæsareæ Maiestatis proprium

V. Seld.

M. Singhmose.

## EXEMPLVM PRIVILEGII GAL- LIARVM REGIS.



**H**ENRY par la grace de Dieu Roy de France a noz amez, & feaulx les gens de noz Court de parlemens, est grand Conseil; Bailliz, Seneschaulx, Preuostz, Iuges, ou leurs Lieutenans, est à tous noz aultres Iusticiers, & officiers quil appartendra fa-  
lut, & dilection. Scauoir faisons; Que nous inclinans liberallement alla supplica-  
tion, & Requette qui faicte nous ha este de la part de Realdo Colombo de Cremona.  
Est affin quil ait moyen de se recompenfer aucunement de la despense quil ha  
faicte durant le temps quil ha esté employe à composer certain beau liure de la no-  
thomye; le quel il ha mis en lumiere depuis peu de tēps. A icelluy pour ces causes, & aultres à ce nous  
mouuans. Auōs à icelluy Realdo Colombo permis, accorde & octroye, est par le teneur de ces presen-  
tes permettons, accordōs, est octroyons uoulons, & nous plaist. Que par tel des Imprimeurs iurez de  
nostre dicte uille de Paris, ou aultres que bon luy semblera. Il puisse & luy laisse faire Imprimer son-  
dict liure de la nothomye; auquel Imprimeur affin quil ait meilleur moyen de faire les fraitz & despē  
ces necessaires pour faire l'impresion d'icelluy liure. Nous auons de noz grace speciale, plaine puis-  
sance & auctorité Royal donne & donnons par ces presentes, Conge, permission, preuilleige est octroy  
d'Imprimer ledict liure dudit Colombo en telle marge, de telz caractaires, tant de foyz, & en tel nom  
bre quil voudra, icelluy mettre & exposer en uente, debiter & faire comme bō luy semblera. Pourueu  
que en icelluy ne se trouue aucune chose contraire, est au preiudice de nostre sainte foy & Religion  
Chrestienne. En defendant treflexpressemēt par ces presentes, à tous libraires, Imprimeurs, & aultres  
de quelque estat qualite, & condicion quilz soient de ne Imprimer, ou faire Imprimer ledict liure d'i-  
celluy Colombo, le uendre, faire uendre, debiter, ne distribuer par nostre Royaulme ne ailleurs; Est ce  
durant le temps & terme de dix ans prochains, & consecutifz, Que nous auōs lymitte, & lymittons au  
dict Imprimeur pour ioyr de leffect de noz presens permission, preuilleige, & octroy. A commēcer du  
iour que ledict liure sera acheue d'Imprimer; Sur peyne (aulx aultres libraires Imprimeurs, & aultres  
qui cotreueniront auidictes defences, & se trouueront saiziz dudit liure Imprimē en nostre Royaul-  
me par aultre que par luy, & son adueu,) de confiscation d'icelluy liure, & d'amende arbitraire à nous à  
appliquer. Si uous mandons, commandons, & enioignons, & à chascun de uous endroit foy, & fīcōme  
à luy appartendra. Que de noz presens grace, conge, permission preuilleige, & octroy; & de tout le  
contenu en celsdictes presentes. Vous faictez leuifrez, & laissez ledict Realdo Colombo, & celluy des-  
dictz Imprimeurs iurez. Auquel il aura baille à Imprimer sondict liure ioyr, est user plainement & pai-  
siblement. Cessans & faizans cesser tous troubles & empeschemens au contraire. Car tel est nostre plai-  
sirs, Non obstant quelzconques ordonnances, restrinctions, maudemens, ou defences & lettres impe-  
treēs, ou à impetrees à ce contraires. Donné à Villiers Cofteretz le quatriēme iour de Mars. Lan  
de grace Mil cinqcent cinquante huict. Et de nostre Regne le douziēme.

Par le Roy

Duthier.

Le lieu du Seaux

## EXEMPLVM PRIVILEGII ILLVSTRIS. SENATVS VENETI.



**A**VENTIVS Priolus Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Vniuersis, & singulis  
tam magistratibus huius vrbs nostrę Venetiarum, quā Rētoribus Iudicētibz,  
& ministris nostris quibuscunq; significamus Come alli 23. del mese presente hab  
biamo concesso con il Senato nostro à Maestro Realdo Colombo Cremonese me  
dico, che niuno altro che lui, o che hauerà causa da lui, possā stampar, ne far stāpar  
in questa nostra Cittā di Venetia, ne in alcun luogo del Dominio nostro, ne altrove  
ue stampata in quelli vender l'opera de Anatomia per lui cōposta, per spatio d'An-  
ni X. prossimi, sotto pena di perder l'opere, & ducati cento per cadauna opera ciascaduna uolta che  
contrafarà da esser diuisa un terzo all'Arsenal nostro, un terzo al magistrato che farà l'efecution, & vn  
terzo al dicto supplicante, essendo però esso supplicante tenuto di offeruar tutto quello che è disposto  
in materie di stampe, Però con l'autorità del detto Senato commettemo à tutti, & cadaun di uoi che  
offeruar, & far offeruar debbiate la concession nostra sopraditta. Datz in nostro Ducali palatio Die  
xxix. Octob. Indictione ii. M D LVIII.

Q V O D suprascriptis iussum est Priuilegijs, hoc idem Philippi Regis Hispaniarum, Ducis Florentię,  
Ducis item Ferrarię decretis cautum, sancitumque est. quorum omnium exemplaria apud me sunt.  
atq; hac de re tum bibliopolas, tum etiam typographos omnes admonitos esse uolumus.



# INDEX CAPITVM TOTIVS OPERIS.



LIB. I.	
PROOEMIUM	pagina 1
De Ossibus in vniuersum	2
De appendicibus, atque processibus Ossium	4
De compositione ossium	8
Tabula compositionis ossium	9

De diuisione ossium	10
De capitis ossibus, siue caluaria	25
De osse iugali	25
De ossiculis organi auditorij	26
De maxilla superiore	28
De inferiore maxilla	31
De dentibus	33
De capitis foraminibus	36
De osse hyoide	41
De laringe	43
De dorso in vniuersum	45
De vertebis cervicis, & capitis motibus	47
De vertebis thoracis	52
De lumborum vertebis	54
De sacro & coccigis osse	59
De thorace	59
De osse pectoris	64
De scapulis	65
De clauiculis	68
De humero	69
De cubito	71
De brachiali	74
De postbrachiali	76
De digitis	78
De ilium osse	80
De femore	83
De tibia	86
De patella	88
De pedis ossibus, ac primum de tala	89
De pedio	95
De digitis	95
De sesaminiis	96

## LIB. II.

De cartilaginibus	97
De palpebrarum cartilaginibus	98
De aurium cartilaginibus	98
De nasi cartilaginibus	99
De maxilla inferioris cartilaginibus	99
De aspera arteria cartilaginibus	100
De spine dorsi cartilaginibus	100
De cartilaginib. in superiore pectoris parte	101
De cartilaginibus in medio pectore	101
De costarum cartilaginibus	101
De scutiformi cartilaginibus	102
De Cartilaginibus in scapula, Coxendicis, ac ti-	

bia sinibus

De Cartilaginibus iuxta brachiale	102
De Cartilaginibus inter pubis ossa	103
De Articulorum cartilaginib.	103
De vnguibus	104

## LIB. III.

De ligamentis	104
De capitis ligamentis	105
De ligamentis capitis cum duabus primis vertebis	105
De hyoidis ac lingue ligamentis	107
De ligamentis Brachialis	107
De ligamentis femoris tibiaeq;	108
De ligamentis inter sacrum os, & coxendicis	108
De ligamentis transversis in pede	109
De ligamentis reliquorum articulorum	109
De ligamentis Cubito, Tibie, ac pubi appositis	

109

De ligamentis Hepatis	109
-----------------------	-----

## LIB. IIII.

Descelecto	110
------------	-----

## LIB. V.

De Musculis	117
Quid sit musculus ac de musculorum differentiis	
De faciei musculis	119
De musculis frontis	119
De duobus musculis nasi	120
De musculis latis in collo positis	121
De 4 musculis labiorum	121
De musculis supercilium trahentibus	122
De palpebrarum musculis	122
De oculorum musculis	123
De musculis aurium	124
De musculis maxilla inferioris	125
De musculis ossis hyoidis	126
De lingue musculis	127
De musculis laringis	128
De musculis scapulas mouentibus	131
De musculis humerum mouentibus	132
De musculis capitis	134
De musculis ceruicis	135
De musculis dorsi	136
De musculis thoracem mouentibus	137
De septo transuerso	140
De musculis abdominis	141
De musculis testicularum	144
De musculis penis	144
De musculis vteri	145
De vesicæ musculis	145
De musculis ani	146
De musculis femur mouentibus	146

De



De musculis tibiam mouentibus	148	nasum, palatum, os, oesophagum, ventriculum,	
De musculis in tibia extremo pedi deseruiantibus		intestina, & asperam arteriam	210
151		De Pulmone	222
De musculis in extremo pede	154	De pleura, & mediastino	224
De musculis qui cubito deseruiunt	155	De Oesophago, & ventriculo	225
De musculis summam manū mouentibus	156	De intestinis	227
De musculis externis, qui manus famulantur		De Mesenterio & omento	230
159		De liene	230
De musculis in extrema manu	161	De vesicula bilis	231
LIB. VI.		De Renibus	232
De iecore & venis	163	De vesica	233
LIB. VII.		De peritoneo	234
De corde & arterijs	175	De Abdomine	235
LIB. VIII.		De Vasis seminarijs	236
De cerebro	187	De testibus	238
De cerebro, eiusque membranis: De spinali medulla: Item de neruis	187	De pene	239
De organis odoratus, & neruis	193	De Vtero	240
De neruis in vniuersum	194	De Umbilico	244
De neruis medulle spinalis post caluariam	199	LIB. XII.	
De neruis manus	203	De Formatione Fetus, ac de situ infantis in utero	
De neruis thoracis	206	245	
De neruis lumborum	208	LIB. XIII.	
De neruis ossis sacri, & pedis	210	De Tegentibus fabricam humani corporis	253
LIB. IX.		De Cuticula, cute, pinguedine, membrana carnosa	255
De glandulis	213	De Pilis	255
LIB. X.		De Perioestio	255
De oculis	215	LIB. XIII.	
LIB. XI.		De Vinea sectione	256
De Visceribus	220	LIB. XV.	
De pnea, tonsillisq; nec non de tunica vesiente		De ijs que raro in Anatome conspiciuntur	252



# REALDI COLUMBI

Cremonensis

## DE OSSIBVS

LIBER PRIMVS.



IO



**V**MANI Corporis fabricam descripturi, primum ab ossibus incipiamus: ab ea nimirum parte, ad cuius imaginem cæteras omnes effingi merito conuenit. quandoquidem ossium structura eandem in corpore rationem obtinet, quam in ædificijs columnæ, trabes, ac fundamenta. vt enim rustici humiles sibi casas ædifi-

Cur ossium Anatomæ præcedat.

Gal. r. de Anato. admin. cap. 2.

caturi, inuicem primum ligna compacta intertexere solent, quæ deinde ramis, cæmentisq; opplent, atque oblinunt, lutoq; demum, ac palea incrustant, & obtegunt, quo se à cæli, ferarum, atque hominum iniurijs aliquo pacto tueantur: Sic propemodum se ossium strues habere videbitur, si carnem ab ossibus eximas, & denudata ossa eo modo componas, & colligas, quem nos infra edocturi sumus, vbi de componendi sceleti ratione ex professo agemus. Enascens etiam naus exordium si intueberis, carinam inquam, & costas, exemplum habebis huic eidem rei accommodatissimum. Ossa igitur fundamenta corporis optimo iure dixerimus, quæ fulciant, stabiliantq; partes alias: neutiquam enim per se consisterent, firmariue possent, nullamq; aut certe imperfectam functionem obtinerent, nisi solidis hisce partibus adnascerentur, atque adhærescerent. Quamobrem de ossibus agere primum expedit, vt cum alios anatomicos, tum Galenum ipsum ita iubentem sequamur. His addemus tractationem illam, quæ est de Cartilaginibus: tertio vero loco de ligamentis differemus, particulis admodum necessarijs ad ossa vnienda, compagemq; ipsam ossium continendam, vt ne à sua sede dimoueantur, aut huc vel illuc dilabi temere possint. Et hæc sane similia sunt vinculis, aut clauis, quibus trabes connectuntur turgurij, aut carinis exædificandis. Postremo tractatum hunc concludet ea pars, in qua sceleti faciendi artem quandam haud inutilem commonstrabimus.

Ordo in tractanda Anatomæ.

Ossium Anatomæ sequitur cartilaginum sectio.

Post Cartilagines ligamenta.

De sceleti structura post ligamēta.

A CA-



## CAP V T I.

Cur ab ossis nomi-  
ne nō exorditur.



Ossium substantia  
terrea.  
Corporū diuisc.

Ossa cur terrea.

Gale. in calce pri-  
mi de tempera-  
mentis.

Contra Gal.

Cur ossa non sen-  
tiant.

Natura est Deo vo-  
luntas.

Ossium munus.

Si ossa sentirent  
quæ inconueniē-  
tia sequerentur.

Contra credentes  
ossa sentire.

B ossibus itaq; cum sit exordendum, ordo ipse rerum tractandarum à veteribus nobis per manus traditus exigere videretur, vt primo explicaremus quid ossis nomine intelligi velimus, nisi omnibus ea res esset quā notissima. Præterea dum ossium substantiam enarra-  
bimus, id ipsum omnino docere videbimur. Nominis igitur ossium disquisitione prætermis-  
sa, quòd non ita in promptu sit cuius ossium natura, seu substantia, nomina, differentia, figura, & vsus; operæ-  
pretium fuerit de his accurate, quoad eius fieri potest, agere. Os-  
sium igitur substantia terrea quident est maxime: scire etenim licet corpora omnia aut esse simplicia, qualia sunt prima quatuor elemen-  
ta, aut ex ijs composita: Compositorum autem diuersam naturam esse pro uaria quam sumunt ab elementis portione; ea siquidem cor-  
pora ignea dicimus, in quibus ignei plus elementi uiget, aërea ue-  
ro, aut aquea, in quibus aër, uel aqua dominatur, sic alia grauiora, alia leuiora, cæterisq; qualitatum differentijs prædita magis nuncu-  
pamus eandem ob causam. Cum igitur plus terræ, quàm reliquo-  
rum elementorum in ossium natura deprehendatur, non ab re terre-  
stria illa, cum medici omnes, tum philosophi appellauerunt, ac præ-  
terea durissima, frigidissima, aridissimaq; partium omnium corpo-  
ris, qualis est ipsa terra; qua limitatione Galeno occurritur, qui pi-  
los ossibus sicciore dicit, ac etiam frigidiore in fine primi tempe-  
ramentorum, quoniam pili excrementa sunt, non partes corporis, si proprie loquamur, sunt etiam ossa immobilia suapte natura graui-  
a, alba, & sensus omnis expertia, quanquam non ea ratione dicendum mihi videtur ossa minime sentire, quòd plurimo abundant elemen-  
to terreo, sed quoniam per ipsorum substantiam nulla neruorum por-  
tio diffeminetur, quorum beneficio cætera omnia, quibus sensus in-  
est sentire pro comperto habemus. Id quod prudentissime Dei  
optimi maximi voluntate, quam naturam dicimus, factum fuisse in-  
telligemus, si animaduertamus ossa ea esse, quæ totam corpoream  
molem sustentent, quæ frequentibus, ac varijs motibus cieantur,  
quibus motis partes reliquas secum unà trahi, ac deferri necesse est,  
quæ si sensu prædita essent tantum non assiduos labores non sine do-  
lore persentirent; & ea tristis, (vt vocant) sensatio aut maximam  
actionum partem tolleretur, aut saltem frustraretur. Neque illi au-  
diendi sunt, qui obstinate asserunt insignem in ossibus sensum inesse,  
qui si adesset, cum vruntur, secantur, franguntur, ac grauiter per-  
cutiun-

cutiuntur, sæuissimis cruciatibus ægros angerent, quod tamen per raro accidit, tuncq; dolor ab ossibus minime proficitur, sed à membrana illa, quæ ossibus obducitur, atq; ideo à Græcis vocatur

*periosteos.*

Quòd autem ossa perioestij munere, non sponte sentiant, hinc patet; Hac etenim abrafa non modo sine dolore, verum etià sine vilo prorsus sensu ossa secabis, combures, & quo lubuerit modo tractabis. Quare cum Galeno, & alijs recte sentientibus concludamus ossa omni prorsus carere sensu, dentes tamen excipio, quos sentire omnium consensu, magistraque experientia compro-

Quòd ossa perioestij gratia sentiant.

Prima ossium differentia.  
Ossa nō sentiunt.  
Dentes sentiunt.

10 batum est. Cuius rei rationem, ne omnia ubique conculcentur, in suum locum reijcimus. Atque hæc prima sit ossium differentia ita obiter dicta, quæ non solum nominibus discrepant, cum singula suum sibi nomen vendicent siue proprium, siue tralatium; sed differunt etiam magnitudine, cum alia parua sint, magna alia; quin & forma, siquidem alia oblonga sunt, alia breuia, alia triangulum, alia quadrangulum referentia, uel alijs figuræ, hæc leuia, illa aspera, alia processibus munita, alia appendices habentia, alia commissuris distincta, alia non item. Vsu quoque distinguuntur, cum ad unam tantum functionem, aut opus commune omnia non sint de-

2. ossium differentia à magnitudine

3. Ossium differentia ab usu.

20 finata, quod etiam tam multiplex formarum diuersitas attestatur: uidere enim est nonnulla plane concaua, & ex his quædam cauitatem amplam habent, quædam angustam, neq; id pro magnitudine contingit ossium, quando aliqua sunt grandia, nec tamen manifestam cauitatem habent, vt sunt ossa, quæ cum sacro committuntur, & ipsum os sacrum, scapulæq; & alia, de quibus suo loco dicemus. Parua item sunt aliqua, & insigniter concaua, sicuti sunt ossa digitorum, quicquid de hac re Galenus senserit primo de partium usu. Ossa omnino solida non ego numerauerim ossa nasi, neq; sesamina, neque ossicula organum auditus constituentia, mihi enim

Ossa quæ cum sacro committuntur os sacrum & scapulæ insigni cauitate carent.

Contra Gal. r. de Vsu partium.

Ossa digitorū sunt insigniter concaua.

Ossa nasi, sesamina, & auditus instrumenti nō sunt solida.

Cōtra Vessalium.

30 prorsus non sunt solida, quanquam Vessalius aliter sentiat; nam si quis fracta hæc, vel recentia, neque dum exiccata diligenter inspiciat, in ijs apparebit spongiosa quædam substantia pumici denso permixta, sinus quosdam per exiguos præ se ferens: ad hæc ossa ipsa extrinsecus foraminibus referta sunt, sed alia magis, alia minus, licet omnino solida videantur esse. Huiusmodi foramina nō agnoscit Vessalius in brachiali, dentibus, ac permultis digitorum ossibus, qui tamen in hac parte parum oculatus fuit, vt infra ostendemus. hæc autem foramina ne inutilia duxeris, nam ideo à sapientissimo rerum opifice Deo facta sunt, vt per ea aditus pateret tum venis ad sanguinem crassiusculum pro nutrimento deferendum,

Brachiale, dentes & multa digitorū ossa sunt perforata contra Vess.

Cur foramina in ossibus.



tum etiam arterijs ad vitalem calorem commodendum. at illa, quæ nullis foraminibus donata sunt, cum neque venas, neque arterias admissura essent, ab adiacentibus partibus & fouentur, & nutriuntur. atque hæc in vniuersum, & quasi per transfennam de ossium differentijs dicta nunc sint. Reliquum esset, vt iam ad singulorum enarrationem ueniremus, vbi planius omnia dignoscuntur.

## CAPVT II.

Cur statim singula ossa non explicet.

**S**ED quoniam in singulorum ossium enarratione nonnulla occurrunt nomina, quibus in toto hoc tractatu de ossibus vtendū erit, quæ nisi prius cognita forent, dubio procul difficultatem aliquam, obscuritatemq; parerent, iccirco de his antea differendum mihi esse videtur, quæ, qualiaq; hæc sint, quoque significato accipi debeant; in hoc etenim præcipuos anatomicos imitari statui, qui & ipsi existimarunt horum nominum tractationem plurimum conferre ad ea percipienda quæ de ossium natura, deq; ipsorum compositione sunt dicenda.

Græci *ἐπίρριον* i. appendix quid sit.

Primum itaque videamus quid sit appendix, quam Græci *ἐπίρριον* vocant. ea nihil aliud est quàm ossi os adnatum, coagmentatumq; , quemadmodum linea quædam ossium capita circumscribens aperte indicat: scito autem hanc in iunioribus animalibus facillime deprehendi, in grandioribus vero, ac ætate prouectis vix discerni posse, nam si hædi, aut agni, vel alterius animalis nuper nati ossicula decoxeris, in eorum extremitatibus partes quasdam diuelli, ac concidere conspicias, siue id sponte, siue de industria fiat, & hæc particula superius, inferiusue appositæ adnæxæq; appendices dicuntur, quarum vtilitatem neque Galenus solertissimus alioqui naturæ inuestigator recte descripsit, vt Vessalius optime reprehendit: sed neque ipse, quod magis miraberis, nouisse videtur, vel si nouit, scribere neglexit, quippe qui arderet cupiditate incredibili in Galenum inuehendi & eius errores adnotandi. vt ad Galenum redeamus, is 1x. de partium vsu asserit, naturam appendicibus ossa donasse, vt operculi vicem gererent, ne s. medulla sinibus contenta efflueret: quam rationem satis infirmam esse, ne insulsam dicam, ex eo patet (inquit Vessalius) quoniam ossa huiusmodi sinibus carentia, tamen appendicibus nō sunt propterea destituta, quin & scapulæ, & vertebræ, & ossa nonnulla parua, quauis minime sint medullosa, suas tamen appendices habent. hæcenus ille; et si pluribus cum verbis, tum etiam exemplis Galenum oppugnet,

Appendix in grandioribus vix ceruitur.

Vessalius quādoq; errat nimio studio reprehendendi Galen.

Galenī ratio de appendicibus 9. de Vsu Part.

Vessaliij ratio contra Gal. de appendicibus.



oppugnet. quo loco animaduertere oportet ossa minime medullosa Vessalium intellexisse, nō quæ prorsus medulla careant, sed quæ cavitates, aut sinus insignes non habent, at solum cauernulas quasdam perexiguas, fungosam substantiam referentes, in quibus medulla delitescit, & propterea medullosa esse non videntur, si cum ijs conferantur, in quibus ampli sunt sinus, & manifesti, multa op-  
pleti medulla. Illud etiam nullo pacto omittendum est, quod Galenus eodem in loco addidit. Appendices s. multo esse duriores ossibus. quod quomodo concedi possit, nō equidem video: nam

Quid intelligat  
Vess. per ossa nō  
medullosa.

Appendices non  
esse duriores os-  
sibus contra Gal.

10 appendices ab ossibus auulsas sapius vnusquisq; nostrum denti-  
bus compressit, atq; attriuit, vt dulcem inde succum, & non iniu-  
cundum exprimeremus. quare tantum abest, vt appendices ossi-  
bus duriores sint, vt contra in his spongiosum corpus, & molle ex-  
periamur; nisi fortasse de parte illa sensisse Galenum opinemur,  
qua committuntur appendices cum ipsis ossibus. sed neque hac li-  
mitatione tueri Galenum possumus: etenim quod appendices fre-  
quenti, assiduōq; motu articulorum non atterantur, non est vni  
appendici acceptum ferendum, quod durissima sit, sed illud con-  
tingit propterea quod inuestiatur cartilagine densa, ac molli, quæ

Gal. defensio.

Defensionis Gal.  
oppugnatio.

Cur appēdices nō  
atterantur ex as-  
siduo motu arti-  
culorum.

20 sua durtie, atq; (vt ita dicam) vnctuositate articulationem ipsam  
conseruat, ne dum lubricam magis, & ad motum promptiorem  
facit. id quod perspicuum magis tibi fiet, si consideraueris, non  
omnia ossa, quæ per articulum committuntur appendicibus esse  
munita, tamen crustam hanc cartilagineam præ se ferre, quippe  
quæ necessarium præsidium afferat, ne longo attritu ossa disrum-  
pantur. Sed, his omisis, iam appendicum vsum dicamus nemini  
adhuc, quod sciam, cognitum, licet res sit cum scitu digna, tum  
vero pernecessaria. Ego cum scirem nihil frustra à natura factum,  
neq; adeo nullius pretij in corpore particulam dari, quæ alicui vsui

Appendicum vsus  
verus à nemine  
adhuc expressus.

30 non esset addicta, peruestigare non destiti, quæ nam foret appen-  
dicum vtilitas: & cum Galeni sententia mihi non probaretur, de-  
mum comperi appendices ossibus adnexas esse, vt ex ea coniun-  
ctione ligamenta prodire possent, quæ in articulis compositionem  
ipsam roborant, stabiliuntq; qualis est femoris superne cum osse  
coxendicis, inferne autem cum tibia, qualis etiam humeri cum sca-  
pula, & cum vlna, atque radio, qualis denique aliorum articulo-  
rum, quibus cum etiam illos numerari velim, qui, vt paulo supra  
diximus, appendicibus non sunt donati, quibus quomodo præstō  
sint ligamenta, per quæ vincti teneantur, infra proprio de ligamē-  
tis capite tractabimus. Neque vero id vnum tantum ligamenta  
præstant,

Quomodo articu-  
li carentes appē-  
dicibus detinean-  
tur à ligamentis  
dicitur in tracta-  
tu de ligamentis.

Ligamenta oriuntur etiam ex appendicibus ubi non est articulus.

Ex ligamentibus cartilaginibus musculi sepe oriuntur.

Ligamentales musculorum cartilagines denique desinunt in tendines.

Ligamenta oriuntur ex appendicibus.

Luxationum causa.

Luxatio manufacta.

Luxationis species quæ difficile curatur, & cur.

Ἀπόσπασις. i. processus quid sit.

Processus & appendicis differentia prima.

Differentia 2.

Differentia 3.

Processus Trochanteres videntur appendices.

præstant, cum ex his etiam appendicibus exoriantur, ubi nulla fit coarticulatio, ut in ossibus ilij, ut in scapulis, ac nonnullis vertebrarum processibus: Inde enim fluunt ligamenta, quæ ad musculorum constitutionem necessario concurrunt, sicuti proprio capite ostendemus. Quo fit, ut musculi inde plurimum ortum ducant: unde exeunt huiusmodi cartilaginee ligamentales, sic enim appellare nunc libet, quæ quidem per musculos disseminantur vim, ac robur illis subministrantes, ac demum in tendines ipsos desinunt. quæ duo ligamentorum munera, cum tantopere sint necessaria, necessariam quoque fuisse appendicum generationem quis non videt? 10 cum ea sublata vix reperias unde commodè prodire possint ligamenta. Quod autem ea sint, quæ articulationem ipsam colligent, atque ita contineant, ut ne huc, vel illuc dilabatur, præterquam quod per dissectionem constare liquido possit, animadvertere etiam licet in luxationibus, cum ob nimiam molliem, & humiditatem lenta fiant ligamenta, & protrahantur, aut aliquid glutinis calli cuiusdam instar interfideat, quo longius quàm necesse sit, ligamentum reddatur, aut tenella puerorum ossa validius imperiti medici manu fuerint attrita, quandoquidem eoque extenduntur, ut secum una appendices diuellant. quam luxationem nunquam, aut 20 summa quidem certe cum difficultate curari posse crediderim, propter sinuum, ac tuberculorum multitudinem, quibus utraq; pars, tam appendicis, quàm ossis cui adnascitur abundat, & eorundem mutuum ingressum postulat. sequitur ἀπόσπασις à Græcis dicta, quam Latini interpretes diuersis vocibus reddunt, nos autem ubique processum dicemus. Is autem est, cum os in aliqua parte prominet, quasi ramum, vel radicem iuxta trunci arboris ritum emissurum. Cum itaque pars aliqua gibbi aut tuberculi instar ex osse procedit rectissime processus nuncupatur, qui ab appendice differt, quoniam is vera pars est eius ossis, unde prominet, appendix vero os 30 sis, cui adnascitur nullo modo. Item appendices plerunque processus habent, ut in vna cernimus, & tibiæ parte inferiore, atque etiam in alijs quibusdam ossibus, de quibus infra. Rursus nonnullis processibus hærent appendices; nam interior scapulæ processus anchoræ imagine, & scapulæ spina, quæ itidem scapulæ processus est, appendices habent. Illud tamen adnotandum femoris processus, qui trochanteres, siue rotatores vocantur, appendices verius esse, quàm quod appendicibus muniti dici debeant: tota enim pars illa, quæ protuberat, & ideo processus dicitur, appendicis locum tenet, ut ibi idem sit processus, qui & appendix, licet Vessalius



lius discrimen posuisse videatur. Nam si rotatores in nuper editis animantibus auellantur, vt ea ratione appendices abeant, nihil loci processibus relinquetur. Cum itaq; ablatis appendicibus, processus vnà auferantur, merito partem vnā, atq; eandem processum, & appendicem eo in loco iudicabimus. Sed hæc parui sunt momenti. Præterea differunt processus, & appendix, quoniam pauca sunt admodum ossa, quibus aliquis non adsit processus, cum fieri vix possit, quin aliqua ex parte emineant. at multa tamen sunt ossa appendice destituta, vt ossa capitis, maxillæ superioris, brachialis, & quædam alia. Differuntq; processus inter sese, cum diuerfas figuras sortiantur, alij enim tenues sunt, & acuti styli formā referentes, propterea Styloides à Græcis vocati, alij acuti quidem sed non ita tenues, quales in cerui conspiciuntur & in arcus cornu, vbi neruus asidet. Huiusmodi processus in inferiore maxilla reperias, & hi sunt, quos coronas Galenus appellauit, quasi processus in acutum tendentes, alij anchoræ similitudinem præ se ferunt, vt interiores scapularum processus ancyroides, alij in caput definunt, idq; bifariam, nam quidam illud depressum habent, vt postbrachialis, vbi cum brachiali iungitur, & pedij ossa vbi cum ossibus tarsi, & fibulæ cum suprema parte tibiæ; quidam vero oblongum, & prominens, ut femoris caput superius, quo articulatur cum osse coxendicis, in aliquibus etiam caput rotundum est, quale est humeri cum scapula, & ossium postbrachialis, cum primis articulis digitorum: longi capitis processus ceruicem quoque habere dicuntur. Ceruicis autem nomine eam partem intelligimus, quæ in ipso processu tenuior est, & ab osse usq; ad ipsum caput pertinet, quod spatium collo quam simillimum apparet, sicuti perspicuum est in superiore femoris parte, quæ in coxendicem ingreditur. Et quoniam capitum facta mentio est, quæ ideo effecta sunt, ut aliorum sinus articulationis gratia subeant; sciendum est pro capitum uarietate sinus quoque uarios esse, siquidem illis ipsis proportionem respondent. Nam si oblongum fuerit caput, oblongum æque esse sinum oportet, in quem inferatur: sin autem depressum, humilem etiam, ac modicam cavitatem requirit. Sinum amplum profundum, & ualde perspicuum Latini acetabulum, Græci uero κοτύλην siue κοτυληδόνα dicunt, planum autem, & obscurum γλήνην, qui sinus adeo leuiter, superficieq; tenus cauatus est, ut uix primo aspectu comprehendi queat. At eorum sinuum, qui amplius caui sunt, profunditates augere solent processus quidam circulares, quos in superficie positos labra, siue supercilia uocamus.

augent

Vestalius male distinguit in rotatoribus processibus ab appendicibus.

Differ. 4.

Quæ ossa appendicibus careant.

Styloides processus qui.

Coronæ processus qui.

Anchyroides processus qui.

Processus capite depresso.  
Processus oblongi & prominentes.

Processus capite rotundo.

Ceruix in ossibus quid uocetur.

Caput in processibus cur factum fuerit.

Sinus proportionem respondent capitibus processuum.

κοτύλην vel κοτυληδόνα. i. acetabulum quid.

Γλήνη in sinibus ossium quid sit. Sinus ossis quanquam a processu & cartilagine augmentatur.

Quid femoris luxationem difficiliorem reddat.

Processuum differunt numero.

Processuum usus triplex.

augent etiam huiusmodi cavitates, cartilagines, quæ in aliquibus inueniuntur, quemadmodum in scapula, ubi cohæret cum humero, & in coxendicis articulatione cum femore: & hæc luxationem difficiliorem faciunt. Processus non figura modo, sed etiam numero distant, quædam enim ossa pluribus, quædam uero paucioribus sunt donata, quemadmodum ex uniuscuiusq; ossis descriptione patebit. Processuum uero utilitas non una est duntaxat. Nam facti sunt ab opifice Deo, tum ut commodam ossium articulationem, compositionemq; præbeant, tum ut inde quasi ex rupibus, aut collibus quibusdam musculi prodeant, uel in eos ipsos implantentur: tum demum ut propugnaculi munere fungantur, quales sunt scapularum, uertebRARUMq; processus. Quid uertebra sit, notum tibi fiet tractatu de uertebis, quid uero articulus, sequenti tabula intelliges.

### CAP. III.

Cur tabula de ossium diuisione hic posita sit.

Cur homo nõ cõstat ex ossẽ vno continuo & solido.

Ossium compositio qualis esse debuit in homine præsertim & cur.

Contra Aristot. 3. de natura Animal. Cap. vij.

Suturæ capitis ob transpirationem factæ sunt.

**Q**UECVNQVE superiore capite complexi sumus, dedimus operam, ut quam breuissime perstringeremus; quando eadem repetere continget, & fusius fortasse alibi pertractare. sed nullo modo prætermittenda erant, præsertim ut ossium structuræ diuisio facilius intelligatur: quæ nusquam aptius, quàm hic locari poterat; & ob declaratas iam uoces, & quia uniuersæ huic historiæ luminis multum afferet. Cum itaque constet sicuti initio dictum est, totam ossium molem esse ueluti fundamentum animati corporis, cuius proprium est, ut sentiat, & moueatur; inutilis ea constructio fuisset, quæ continua esset, ac solida. quid enim illius fabrica à lapidea uel ænea statua differret? sed ossa, etsi natura per se immobilia habeantur, moueri tamen eadem apprime necessarium fuit: ut ad ipsorum motum animalis motus consequeretur, ac præsertim hominis animantium omnium perfectissimi: cui ob infinitas propemodum artes, quas ipse tractat, innumerabilesq; actiones, quas edit, infinita pene motuum genera debebantur. Talem igitur compositionem ossa postularunt, ut neque omnino disiuncta, ac dissoluta, neq; prorsus continua essent modo uenarû, ut male Aristoteles putauit 3<sup>o</sup> de Natura Animalium Cap. vii. Ergo contigua ossa, coniunctaq; esse oportuit, ut super aliquo quiescente moueri possent, tametsi ossium unio, quæ ob motum præcipue facta est, ob transpirationem etiam, transitumq; corporum facta fuerit, ut futuræ in caluaria, quam & tutelæ causa ex pluribus ossibus efformatam esse suo loco audies, ac demum ob partium



tium diuersitatem, vbi dura mollibus committuntur. Cum autem in componendis ossibus sapiens natura non vnam rationem seruauerit, vt facile quisq; intelligat, quàm varie sint inuicem composita, sequentem tabulam subiecimus.

Craniū tutamentū gratia factum. Ossium compositio varia est.

## Tabula Compositionis Ossium.

## OSSA HVMANI CORPORIS

## INVICEM COMPOVNTVR

10

Per articulum, qui est ossium compositio cum motu. huius duæ sunt differentie.

Diarthrosis, quæ est dearticulatio ad motum manifestum. diuiditur autem in

Enarthrosim

Arthrodiam

20

Ginglymon

Enarthrosis fit, vbi rotundū aut oblongum caput in cauum aliquod inseritur: ut est articulatio femoris cū coxendice, Humeri cum scapula, primæ aciei digitorum cum ossibus post-brachialis.

Arthrodia est, quæ leniter cauum, & in superficie, & capitulum etiam depressum habet: vt prima cervicis vertebra cum secunda, & radius cum cubito.

30

Ginglymos ea est, in qua ossa sese inuicem ingrediuntur, & tum suscipiunt, tum suscipiuntur, vt vlnæ, siue cubitus cum humero, femur cum tibia, secunda, & tertia digitorum acies.

Synarthrosis, quæ est coarticulatio cum motu obscuro in easdem autem species diuiditur, in quas & Diarthrosis diuisa est videlicet in

Enarthrosim

Arthrodiam

Ginglymon

Eo vero inter se tantum differunt, quòd hæc obscurum, illa manifestū habet motū. Nec mirandum est easdem res diuersimode consideratas posse sub diuersis in eodem predicamento generibus collocari, nam id quòdque in diuersis prædicamentis contingit. Exempla in hoc genere sunt.

Enarthroses. Tali os cum osse cymba referente, et tertium os brachialis, cū primo & secundo eiusdem.

Arthrodie. Tarsi ossa inter se, cyboides cum calce, et quedam ossa brachialis inter se.

Ginglymi. Tali os cum calce, & nonnulla item brachialis ossa inter se.

Per Symphysin, quæ est ossium inter se coniunctio, siue vnio sine motu. hanc nobis visum est diuidere in

Suturam

Gomphosim

Harmoniam

Sutura ea compositio est, quæ in capite habetur in serræ modum, vt est sutura coronalis, sagittalis, & labiodoides.

Gomphosis est, cum ad instar clauī os ossi infigitur: vt sunt dentes in maxillis.

Harmonia est ossium structura per simplicem lineam: vt sunt commissuræ maxillæ superioris, & ea præcipue, quæ in naso habetur quæque secundum longitudinem palati fertur.

Omnia hæc inuicem committuntur.

*Synchondrosi,*  
quæ est ossium unio per car-  
tilaginem facta: ut vide-  
re est in osse pubis, pecto-  
ris, et ilei, quæ sacro con-  
nectitur.

*Syssarcosi,*  
quæ est ossium coniunctio ap-  
positione carnis resultans  
ut inter dentes, et maxillas  
cernitur, atq; etiâ in articu-  
lis, quos muscoli circundat.

*Syndesmosi,*  
quæ est eorundem per ligamē-  
tum compositio, ut in ar-  
ticulis patet.

Plura sequenti capite utriusq; generis exemplis adducemus, ubi explicanda nobis est huiusce  
nostre diuisionis ratio, quanquam illa passim occurrent in vniuersa ossium tractatione.

## CAPVT IIII.

10

Cur in ossium di-  
uisione neq; Gale-  
num in omnib.  
neque Vessalium  
sequatur.

Galenus error vel  
contradictio po-  
tius.

Galenus error alius

Gal. error tertius.

Galenus error quar-  
tus, vel contra-  
dictio potius.

Vessalij error.

Ex ossibus alia cū  
alijs cōnata, alia  
coniuncta viden-  
tur.

**N**E forte quispiam admiretur, quod in superiore diuisione neq;  
Galenum, neque Vessalium in omnibus sequuti sumus, ratio  
reddenda est, quamobrem ab illis dissentiamus. Nam licet Gale-  
num tanquam numen veneremur, Vessalioq; in dissectionis arte  
plurimum tribuamus; vbi cum rei natura consentiunt: tamen cum  
aliquando videamus rem aliter multo se habere, ac ipsi descripse-  
rint; veritas eadem, cui magis addicti sumus nos cogit ab illis in-  
terdum recedere. A Galeno itaq; nunc discedo, quoniam definiēs  
Synarthrosim, coarticulationem esse dixit ad motum quamuis ob-  
scurum, cuius deinde veluti species enumerat Suturam, gompho-  
sim, & harmoniam, quæ omni prorsus motu carent. Præterea Sym-  
physi tantum adscribit coniunctiones illas, quæ media cartilagine,  
aut ligamento, aut carne fiunt. Cum tamen articuli quoque om-  
nes ligamentorum ope vniantur, quos ad Symphysim referre non  
deceat, quando ille hæc sibi inuicem opponit, per articulum, ac per  
Symphysim. Postremo cum asserat fungosa, ac mollia ossa nullius  
rei interuentu connecti; & aperte videamus ossa pectoris præcipue  
& sacrum os constituentia fungosa, & mollia per cartilaginem vni-  
ri. Addo quod in introductorio, siue medico, maxillæ superioris  
unionem sub Symphysi ponit, quam in libello de ossibus ad har-  
moniam retulit. Dicendum itaq; aut harmoniam speciem esse non  
Synarthroseos, sed Symphyseos, sicuti nos fecimus, aut artem il-  
lum in hoc confudisse. Sed hætenus de Galeno: ad Vessalium trā-  
seo, qui symphysim cum gomphosi, futura, atq; harmonia con-  
numerat quatuor efficiens differentias eius structuræ, unde nullus  
omnino motus prouenire solet. At rectius poterat Symphyseos  
nomine genus intelligere innominatum, quod tres illas sub se dif-  
ferentias comprehenderet. Quod si diligentius structuram ipso-  
rum ossium consideremus, alia profecto videbimus ita coalescere,  
ut connata prorsus videantur, alia coniuncta, & colligata rectius  
appel-



lari. Quæ connata sunt, ea sub Symphyſi ponenda videntur, ſicuti etiam ipſius uis vocabuli præ ſe fert. Vbi autem oſium compositio ad aliquem motum facta eſt, ad articulum non referri non poteſt. Cum igitur quæ per gomphoſim, harmoniam, futuramq; vniuntur, eiufmodi ſint, cuiufmodi Symphyſim eſſe diximus, quid obſtat cur ſub ſymphyſi, veluti ſub natura quadã communi non reducantur? Iam vero cum Veſſalius ita diſtribuat oſium commiſſuras, vt alteram fieri dicat alicuius partis ope, alteram nullius (pace tanti viri dixerim) falſa, & rationi minime conſentanea pro-

Veſſalij error.

10 tulit. Nam ſi quid ego in cadauerum diſſectionibus diligenter obſeruauim, id vnum præcipue fuit, vt aliquando certo ſcirem, an vſquã reperiri poſſet oſium vnio, ſiue compositio nullius medijs beneficio: quod equidem (vt ingenue fatear) nuſquam inuenire potui. ſed mihi vel caro, vel ligamentum, vel chartilago ſemper occurrebat. Exemplum vero quod de appendicibus attulit, abſurdum mihi, ne dicam periculolum, videtur. Etenim vt appendices in natu grandioribus adeo coaleſcant, vt diſcernere nequeas, an partes ſint ipſorum oſium, quibus adnatæ ſunt; non ex eo tamen ſequi debet nullius partis ope fuiſſe coniunctas, cum per chartilaginem

Os quodcumq; cū alio vnitur media carne vel ligamento vel cartilagine,

Veſſalius male putat appendices nulla re media oſibus vni.

20 vnitæ fuerint: quanquã ea temporis progreſſu tandem exiccet, atque aboleatur. Quocirca aliam diuiſionis formam excogitauimus hoc pacto. Primum diuiſum genus. Humani ſcilicet corporis diuiſionem in articulum, ac Symphyſim. quid eſſet Symphyſis, ex ſuperioribus paruit. Articulus græcis *ἄρθρον* eſt oſium compositio alicui motui deſtinata, (quanquam Hippocrates artius articuli nomen acceperit, pro ea commiſſura, in qua pars aliqua oſis rotunda, caput inquam, in proximum oſis alterius ſinum committitur) nos articulum naturalem oſis compositiōem omnem vocabimus uoluntarij motus gratia factam, ſiue is motus euidenter fue-

Cartilagine ap- peditum tandem abolentur.

Proprie diuiſionis oſium; compositiōis cauſam reddit.

*ἄρθρον*. i. articulus quid ſit.

Articuli nomine quid intelligat Hippocratis.

30 rit, ut femoris ad os coxendicis, & capitis ſuper collum, ſiue obſcure, ut poſtbrachialis oſium ad oſſa brachialis: & calcis cum talo, atque aliorum id genus, de quibus alibi dicitur. Ergo pro duplici motu duas articulationis differentias conſtituimus, alteram, in qua neminem motus latere poteſt, Diarthroſim, alteram in qua difficilis eſt exploratu motus, Synarthroſim uocantes. Rurſus utrãq; ſpeciem ſubdiuiſimus tres differentias unicuiq; tribuentes, nomine eaſdem, illa tamen ratione diſiunctas, qua differunt ipſorum genera. licet enim enarthroſim tam ſub diarthroſi, quàm ſub Synarthroſi collocemus, non eſt tamen utrobiq; eadem: nam diarthroſis motũ perſpicuum includet, quæ uero incerti, obſcuri;

Motus perſpicui exempla.

Motus obſcuri exempla.

Diarthroſis quid.

Synarthroſis quid.

Nō eſt eadẽ Enarthroſis ſub diarthroſi quæ ſub Synarthroſi.

- motus fuerit, ea sub Synarthrosi ponetur. Id quod in cæteris duabus seruandum erit. Enarthrosim itaque esse dicimus, cum sinus altus, atq; profundus, quem acetabulum supra uocauimus, caput ossis longum, ac rotundum excipit, quæ articulationis species facile apparet in coxendice, & femore, in humero cum scapula, & postbrachialis, ac pedij cum primis digitorum ossibus. Atq; hæc exempla illam enarthrosim explicant, quæ diarthroseos species est: siquidem in his non modo manifesti motus, sed omnes etiam motuum differentię deprehenduntur: in talibus enim articulis planissime cernimus extensionis, ac contractionis motum ad latera, nec non etiam in circulum. multæ insuper aliæ dantur huiusmodi articulationes, de quibus cum usu uenerit, separatim agemus. Verum ut facilius intelligatur, quid intersit inter enarthrosim sub Diarthrosi positam, & eam, quæ ad Synarthrosim pertinet, intueamini articulationem tali ossis cum osse cymbam referente, & septimi ossis brachialis, cum primo, & secundo eiusdem: Hæ namq; articulationes, quamuis eo modo fiant, quem Enarthroseos definitio præscribit, non ad Diarthrosim tamen, sed ad Synarthrosim referendas iudicabitis: motus enim obscurissimus est, & nisi multa diligentia adhibeatur, vix animaduerti potest. Arthrodia ea est offi- 20  
um coniunctio, quorum alterum capite sit depresso, alterum finem habeat lenem, ac planum, quem glenem appellant, alterius, quod suscipiendum erat, capiti respondentem, in quo difficile est dignoscere caput ab ipso sinu, contra quàm accidit in enarthrosi: quo fit, vt non ita euidentis sit motus in Arthrodia, qualis in enarthrosi. Verum in ipsa Arthrodia motus datur alio euidentior, quàm omnes parum sint euidentes, vsq; adeo, vt qui minus euidentis sit, obscurus penitus esse videatur, si cum euidentiori comparaueris. Manifestioris motus Arthrodia, species erit Diarthroseos, obscurioris autem Synarthroseos. Prioris exempla sunt in ea coniun- 30  
ctione, quæ fit costarum cum vertebris, & earundem processibus. Sensui etenim patet costas cōstringi, ac dilatari, qui motus quemadmodum & quorsum fiat, non huius est loci explicare. Sed Arthrodiam paulo manifestiorem animaduertes in articulatione primæ vertebræ cum secunda, ac etiam radij cum cubito: obscurioris autem Arthrodiæ exempla sunt ossa postbrachialis cum brachiali, in quibus tamen motus quoquo modo obseruari potest: nam si ad pollicem minimum digitum sensim adduxeris manum ipsam inflectendo, plane conspicias postbrachialis ossa, quæ alioqui manu porrecta, atq; in planum extensa, planam, ac rectam figuram obtinebant,
- Enarthrosi quid.
- Enarthroseos sub diarthrosi exempla.
- Enarthroseos sub Synarthrosi exempla.
- Arthrodia quid.
- In Arthrodia differt motus a motu per magis & minus obscuri.
- Arthrodiæ sub diarthrosi exempla.
- Costæ cōstringuntur & dilatantur.
- Arthrodiæ sub Synarthrosi exemplum primum.
- Qui motus sit prius ossi postbrachialis.



tinebant, circumduci, atq; obliquari: qui motus proprius est ipso-  
rum postbrachialis ossium, at multo aptius obscuram arthrodiam,  
exprimunt tria ossa tarſi, quæ cum nauiformi committuntur: & cy-  
boides cum calce, ac etiam nonnulla alia, in quibus etsi motus ali-  
quis omnino sit, est tamen obseruatu valde difficilis. Ginglymos  
tertia articuli species est, vbi mutuus fit ossium congressus; ita  
quod in alterutro extant partes prominentes, quæ alterius sinum  
exposcant, partesq; illæ gibbæ, ac protuberantes vnius ossis in al-  
terius sinum immittuntur, & huius cauæ partes illius gibbas exci-  
piunt. Itaque fit vtriusq; partis mutuus ingressus. Hæc articula-  
tio in motu manifesto, & obscuro inuenitur: manifestus, & euident  
ginglymos erit femur cum tibia, cubitus cum humero, & alia, ob-  
scurus vero tali cum calce connexus, & ossium brachialis: in qui-  
bus, si recte animaduertes, articulationis formam offendes.

Ginglymos quid.

Ginglymi sub diarthrosi exempla.

Ginglymi sub Synarthrosi exempla.

Symphysis quid.

Symphyseos diuifio.

Causa erroris existimantium ossa cranei moueri.

Ad motum pinna-  
rum nasi eius  
sa non mouetur.Caluariæ Suture  
vix scalpello di-  
uelluntur.ῥαφῆ. i. Sutura vn-  
de dicta.Suture tres capi-  
tis, in valde seni-  
bus vix sunt con-  
spicue.

10

20

30

Atq; hæc hæcenus de articuli partibus, ac differentijs. Nunc sym-  
physim persequamur, quæ ossium structura omni penitus motu,  
cum obscuro, tum etiam manifesto caret. Huius tres differentias  
diximus. Sutam, Gomphosim, & Harmoniam: in his enim ne-  
mo vnquam motum deprehenderit, quanquam non defuerunt, qui  
ausi sunt affirmare cranij ossa, quæ per Sutam committuntur, mo-  
ueri motu, (si Dis placet) manifesto, inani specie meo iudicio de-  
lusi. Cum enim cernerent frontis, capitisq; cutim, quæ crassa est,  
& musculosa, alte, atq; insigniter in aliquibus moueri, motum il-  
lum ex ossium dimotione proficisci existimarunt: quemadmodum  
siquis nasi ossa, quæ per harmoniam vniuntur, motum edere, cum  
narium pinnaſ moueri viderit, arbitraretur. Neque enim creden-  
dum est futuras capitis laxari, atque ita mouendis ossibus ansam  
præbere, quæ alioqui adeo compacte inuicem inhærent, vt nulla  
vi laxari possint, nisi quis scalpello diuellere, aut frangere tentaue-  
rit, adeo vt in nulla Symphyseos specie motum inesse plane perspi-  
ciatur. Sed ad singulas ipsius species deueniamus. Sutura, quæ  
Græcis ῥαφῆ dicitur, consutarum rerum similitudinem præsefert, vel  
contrarij serrarum occurſus, quo mutuus ingressum faciunt, quã-  
do dentata vnius partes, alterius sinibus occurrant. quidam etiam  
vnguium commissurarum exemplum addunt, non quod mutuo se-  
se respiciant, sed interstitia illa occupent, ac stipent, quæ inter di-  
gitorum vngues resident. At propius ad rei naturam accedere vi-  
dentur, qui serrarum, quàm qui vnguium similitudinem in mediũ  
afferunt; quandoquidem illa rara admodum est, hæc autem fre-  
quentissima: cuiusmodi tres sunt in capite. Suture, quæ in senio-  
ribus

Sutura *σεραεία*  
quæ.  
Sutura *λαμβδου-  
δης* quæ.  
Sutura *δβαλαία*  
quæ.

Ossa squamosa cū  
vniuntur per Su-  
turam Sutura nō  
est profunda.  
Ossa squamosa vt  
in pluribus vniū-  
tur p harmoniā  
quā per Sutu-  
ram.  
Harmonia quid sit

Suture nomine ve-  
teres quandoque  
harmoniam com-  
prehenderunt.

Ossa fracta vniun-  
tur forma quadā  
harmoniz, & Su-  
turæ participe.

Harmoniz exem-  
pla.

Gomphoseos exē-  
plum.

Alueoli dentium.

Maxilla quandoq;  
instar ossis indu-  
rescit callo, itaq;  
dantis munere  
fungitur.

Synchondrosis qd  
significet.

Synneurosis quid.

Nerui nomine li-  
gamenta cōpre-  
henderunt vete-  
res.

Syndesmosis quid.

ribus appendicum more coalescunt, vt vix vestigia appareant: in iunioribus autem maxime sunt conspicuæ. Vna quidem in sincipite *σεραεία* dicta, altera vero in occipite dicta *λαμβδουδης*, tertia medio uertice recta, *δβαλεια*, quasi sagittalis, de quibus suo loco latius agetur. Non me latet apud aliquos plures tribus futuras dari, qui voluerunt squamosa temporum ossa per futuram copulari. Equidem non negarem in quibusdam caluarijs talia ossa dentatim esse resecta, ut facile conijcere possis instar ferrarum esse coniuncta, sed id in paucissimis, ac in superficie tātum ipsorum ossium obseruau.

Quamobrem uera talium ossium unio, ut in pluribus ad Harmoniā 10 potius, quā ad futuram referenda uidetur. est autem harmonia ossium structura per simplicem lineam, vbi s. neque adsunt sinus, neque tubera, & nonnunquam ne asperitates quidem reperiuntur: quod tamen non tollit, quin veteres futurarum voce harmoniam quandoque intellexerint: cum videlicet ossa rupta sibi mutuo per harmoniam occurrunt; quamquam hic occurfus non adamussim per simplicem sit lineam: Adsunt enim asperitates quædam sese mutuo ingredientibus: ideo mixta potius est vnionis forma harmoniæ, futuræq; particeps. Verum id obiter sit dictum, quando sermo institutus est, de naturalibus ossium compositionibus, non de 20 ijs, quæ casu, vel arte, licet natura præui sunt. Simplici ergo lineæ, atq; harmoniaca vniuntur nasi ossa, & illa, quæ palatum constituunt, ac secundum totam ipsius longitudinem feruntur. Huiusmodi etiam sunt reliquæ omnes maxillæ superioris commissuræ, cuius ossa sola linea distinguuntur. Porro Gomphosis in solis dentibus locum habet, ita enim illos infixos in maxillas videmus, quemadmodum clauis ligneis tabulis, quibus reuulsis inania foramina conspiciuntur: sic dentes suos habent alueolos, ex quibus extrahi solent, cum usu uenit. In uiuo capite non ita apparent, siquidem 30 carne obducuntur, aut gingiua contracta replentur, quæ subinde callosa fit, atq; ita indurescit, vt dentium munere plerumque fungatur. At inde mortui caluaria nuda, atq; exiccata conspiciuntur in maxillis alueoli, è quibus leui opera dentes educuntur. Iam uero cum ossa omnia alicuius rei beneficio componantur, licet alijs aliter uideatur, rursus affirmamus ossa inter se tribus medijs iungi: Aut enim intercedit cartilago, quā unionem græci Synchondrosin appellant, aut nerui, ligamentiuæ ope coniunguntur, Synneurosisq; dicitur (nerui enim nomine ligamenta quoq; veteres intellexerunt) sed tamen differunt, ac rectius dixeris ligamentum, quod Græcis Syndesmos est, & propterea Syndesmosis: aut carnis ap-  
positione



positione vnio ipsa fit, & Græco nomine Syffarcosis nuncupatur. Syffarcosis quid. Synchronoseos exempla.  
 Synchronoseos copulantur pubis, ac pectoris ossa, vertebræ ipsæ, & partes sacrum os constituentes, & quæ cum sacro committuntur, ac demum appendices suis ossibus per cartilaginem, iunguntur. Synneuroseos componuntur omnia illa ossa, in quibus cernere est ligamenta, quæ per eam partem prodeunt, qua solent appendices suis ossibus adhærescere. Talibus enim ligamentis inuestiuntur ossa ad articulos colligandos. Prominent quoq; atque enasci quodam modo videntur valida ligamēta in medijs quorundam ossium capitibus, per quæ suis sinibus vinciuntur, vt tenacius inhæreant, qualia extant in articulatione femoris cum coxendice, atq; etiam inter femur, & tibiam, neq; alibi reperire licebit: nisi addideris ligamentum, quo dens secundæ ceruicis vertebræ occipiti necitur. Carne autem veluti glutine quodam firmantur dentes in suis alueolis, idq; per Syffarcosin fieri dicitur, femotaq; carne neq; coherere, neq; stare vllō modo possunt. Aristoteles existimauit articulos quoque per carnem vniri, vbi scilicet asideant muscoli circumdantes, & valli instar illos munientes: cuius sententia, si cui forte arrideat, non multum laboro. Sed hæc de diuisione compositionis ossium sat sunt, ad singula describenda accedamus.

## De Capitis ossibus, siue Caluaria. Cap. V.

**A** CAPITIS Ossibus exordiemur, quoniam caput in corpore principem locum tenet, quod in eo residet cerebrum, cui principatus iure optimo debetur: quamquam Arist. multo aliter senserit: & quod hinc humanæ fabricæ describendæ initium recte sumi possit, vt à nomine ipse capitis, quasi principij cuiusdam admonemur. A capite igitur exorsi, illud primum pro virili discutiamus, quod diu præclara ingenia fatigauit, oculorumne, an cerebri causa caput natura construxerit? Oculorum gratia factum sensit Galenus, postquam scarabeorum, cancrorum, ac quorundam aliorum id genus animalium oculos est contemplatus, quibus cum nullum adesset caput, in quo tanquam in arce summa oculi collocarentur, vnde longius prospicerent, processus quosdam natura largita est, qui capitis vicem gererent. Veruntamen capitis figuram recte considerantes secus iudicabunt. licet enim Galeno concedatur necessarium fuisse in suprema parte corporis, ceu in altissima specula oculos constituere, atq; illos ideo, capitis sedem sibi tanquam propriam asciscere, in cuius sinibus manerent vndiq; tecti,

Cur ossium anatumen à capitis ossibus incipiat.

Cerebrū est princeps membrum totius corporis contra Aristot.

Quæstio vtrum caput sit gratia oculorū vel cerebri.

Gal. opinio oculorum gratia cōditum caput.

Galeni impugnatio.

- tecti, ac muniti: ne ab externis iniurijs læderentur; non propterea tamé fatendum fuerit ad hos tantum vsus caput ipsum ea magnitudine, ea figura, totque osibus fuisse constructum. quam formam quis non videt cerebri etiam gratia fuisse conditam? Immo vero cerebri potius quàm oculorum? quid enim obstabat cur summus opifex caput in duos duntaxat prominentes processus diduceret, in quibus oculi tanquam speculatores insiderent, atque hos ipsos quemadmodum in cancris duriores efficeret? vel si molliores omnino futuri erant, quales humani, alia præsidia, ac munimenta pararet, per quæ tutissimi ab externis incommodis redderentur. 10
- Mihi igitur nūquam fiet verisimile oculorum causa caput fuisse conditum. ad cerebrum potius talem formam spectasse crediderim, nempe ad illud, quod futurum erat domicilium rationis, qua ratione homo diuinum propemodum animal iudicatur. est enim virtutum omnium, animaliumq; facultatum regina, cui ut præsto esse possent sensus omnes veluti satellites, ac ministri: in ipso capite, suas singuli sedes obtinuerunt. quod quàm apposite factum fuerit, suo loco explicabitur. Cumq; sentiendi vis per neruos deferatur; quorum fontem, atq; originem esse cerebrum cum Galeno opinamur; quis non videt maiorem inesse cerebro quàm sensibus digni- 20
- tatem, cum à cerebro sensus dependeant, non à sensibus cerebrum? Cerebro vero caluarię formam inferuire ex eo maxime patet, quòd pro eius figuræ diuersitate cerebri constitutionem physici perspectam, atque exploratam habent. Sed ad alia vtiliora properamus.
- Capitis ossa neque prorsus sunt solida, neq; omni ex parte fungosa, rara, ac pumici similia; ex hoc enim fragilem naturam, & leuissimę cuiq; iniurię obnoxiam sortita essent: ex illo vero onere satis molesto premerentur. Præterea huiusmodi substantia minime transpirabilis esset, sicuti expediebat. caput nanque futurum erat veluti operculum quoddam ebullienti vasi superpositum, non secus atq; 30
- calidæ domus tectum. Multis itaq; vaporibus, atque excrementis continenter ad cerebrum ascendentibus, nisi exitus pateret, ut reliqua omittam incommoda, nemo diuturnam sibi vitam polliceri posset. Iccirco prouida natura perforatam esse voluit caluariam, varijsq; futuris distinctam; ut purgando à recrementis cerebri nusquam occasio deesset. Quòd autem futura hunc vsum inter cætera præstent, præter authorum probatissimorum, ac præcipue Galeni testimonium, nos etiam ipsa experientia docuit, ut mox audietis. Patavij superioribus annis iuuenem quendam propinquo- rum voluntate ad me delatum domi in magna amicorum corona
- seculi,

Historia iuuenis  
mortui ob do-  
lorem capitis, in



*Historiam notato pro capitis ingenti dolore  
ob suturarum confectum*



secui, qui diutino capitis dolore vexatus nullis remedijs sanari poterat: in cuius caluaria vix futurarum vestigia apparebant adeo compacta, vt in unum coacta capitis ossa viderentur. Quamobrem pro comperto omnes, qui tum aderant habuerunt, non aliunde ingentem ac fere continuum capitis dolorem profectum esse, quàm ex arctissima illa ossium compositione, ex qua nullus exitus patebat fumidis illis, crasisq; vaporibus, qui & perpetuo doloris causa fuerant, & tandem mortem intulerant. Sed neq; semel id mihi contigit experiri: complures etenim secui, qui dum viuerent, in frequentem capitis dolorem incidere solebāt; in quorum caluarijs exiguas futuras, & eas coagmentatas inuenimus; neq; in viris modo; sed etiam in muliere: quod mirum fuit, vt vix credibile. nudatum enim, ac decoctū illius caput fere sine futuris offendimus. et hæc pariter multo, magnoq; capitis dolore quàm diutissime affecta, atq; afflicta, postremo phrenesi laborauit, & mortua est. Certissimum ergo argumentum nobis erit capitis futuras non modo conferre ad salutem corporis tuendam, verum eo plus conferre, quo maiores, laxioresq; fuerint. Quare Cornelij Celsi sententiam ego nunquam approbare potui asferentis capita sine futuris non modo validissima esse, ac firmissima: sed etiam ab omni penitus dolore immunia; eaq; reperiri in calidis, & æstuosis regionibus. Nam ille extrinsecas tantum causas caput lædentes animaduertit. Quod si Celsi uera esset sententia, imbecilliora essent capita, & ad patiendum promptiora, quæ insignes futuras haberent, quàm quæ aut exiguis essent prædita, aut eisdem prorsus carerent. Cum uero contra res habeat, maiusq; impendeat damnum ipsi cerebro ab internis fuliginosis recrementis, quàm ab externis noxis, concludendum est à dolore longe tutiora esse capita futuris amplioribus, quàm ijs ipsis destituta, aut exilibus admodum, arctissimisq; interfecta. Præterea cum cranium sit veluti galea quædam, ac propugnaculum cerebro, primo illud considera carne, ac cute quàm parum munitum fuisset, nisi obducto etiam osse, quod durissimum, ac densissimum esset. Deinde cum caput alioqui offeum graui aliquo ictu percussum labefactari, frangiq; posset, ideo multiplex fieri oportuit, ut si quando pars aliqua frangeretur, aliæ partes integræ seruariantur; cum ictus ille longius protendi nequeat, quàm quò fines percussæ partis pertinent; quod secus eueniret, si ex vnico osse caluaria constaret. id quod exemplo facili perspicuum fiet, si lapide, aut ligno fictile vas, vitreumue feriat: sæpe enim contingit, vt vna parte contusa, scissura ad alteram vsq; permeet: vt pene totum ipsum vas abrumpatur. Ossa igitur capitis futuris non

C iniuria

quo futuræ non erant cõspiciunt.

In viris & mulieribus capite mire dolentibus futuras augmentatas inueni.

*Sine futuris caput.*

Capitis Suture quo maiores eo meliores.

Cornelij Celsi opinio de bonitate capitis absq; futuris reprobatur.

*Cornelius cel-  
satus*

Caput amplioribus futuris est dolori minus obnoxium.

Cur cranium offeum.

Cur os capitis multiplex.

Cur futuras habeat caput.

Prima ratio.

2

*si id fuisse grauiſſimum eſſe calua-  
ria oppoſita probat. ſemper poteſt  
a mat. legit. ſum. dilu. ſue ob  
reſpo.*

*περιπαύων* gigni-  
tur à dura mem-  
brana.

Aristot. opinio de  
canum caluaria  
abſq; futuris re-  
ſellitur.

In Perſide calua-  
rias futuris care-  
re falſum eſt.

Appendices in val-  
de ſenibus non  
poſſunt ab oſſib.  
ſeparari.

Suturæ in valde ſe-  
nibus aliquando  
deperduntur.

Oſſium partes ali-  
quæ in pueris ob  
mollitiem carti-  
lagines videtur.

Caput quid ſigni-  
ficet.

Capitis vſus.

Capitis figura.

*caput ob cerebri Gra-  
tiam præcipue, deinde ob  
oculorum ſum. ſaſtina-  
re eſſe intendit auctor.*

Caluarie ſubſtan-  
tia cur non ſit a-  
ſpera.

Cur media pars  
oſſium caluarie  
fungoſa eſt.

Cur oſſa capitis  
ſunt crebris fora-  
minibus prædita

iniuria diſtincta ſunt, vt illud iniurijs minus pateret: Suturæ autem non illud ſolum præſtant, ut per ipſas trãſmitti poſſint ſumida recre-  
menta, ſed etiam ut prohibeant, ne vnico ictu niſi illud grauiſſimum  
fit: petita caluaria vndiq; confringatur. Ad has vtilitates accedit  
tertia, vt ſcilicet inde pendeat interna membrana, quæ durior eſt:  
ac rursus per eaſdem futuras effuſa, membranã alteram ex ſe gignat,  
quæ conuexam caluarie partem circundat, & ideo, à Græcis *περιπαύ-  
ων* dicitur. Sed de hac poſterius. Illud interim non omittendum

Ariſtotelem falſo tradidiſſe canum capita continua, ac ſine futuris  
exiſtere, cum vel lippi ipſi cernant in canum caluarijs inſigniores, 10  
atq; elegantiores futuras, quàm in humanis apparere. Conſimile  
illud eſt, quod quidam litterarum monumentis tradidere, homines  
caluarijs continuis, nullisq; futuris diſtinctis in Perſide reperiri. At  
nos eandem in eadem ſpecie naturam ſemper eſſe exiſtimamus: neq;  
magnæſtimamus, ſi in aliquibus indiuiduis aliquid euariet. Ete-  
nim quamuis conſpicabimur eorum, qui diutiſſime uiixerunt, appen-  
dices; atq; illas in oſſium, quibus adnatæ fuerant, portionem abiſſe  
plane perſpiciamus, adeo vt neq; ſeparari, neq; dignoſci queant: fu-  
turas itidem in ſenum capitibus plærung; abolitas, ac deperditas: ta- 20  
men negandum nullo pacto eſt appendices dari, vel ſine futuris cal-  
uarias eſſe: quemadmodum in infantibus partes aliqua tenerrimæ  
cartilaginis naturam ſapiunt, neque dum oſſeæ, niſi aliquot poſt mē-  
ſibus fiunt. Ecquis autem dicere audeat partes eaſdem, non oſſa  
verum cartilagines eſſe? Sed ad rem redeamus. Caput cum dici-  
mus: partem ſupremam noſtri corporis intelligimus oculorum, ce-  
rebriq; gratia factam, cuius figura naturalis rotunda, oblongaq; eſſe  
debet, nempe ad oblongæ ſphæræ vtrinq; depreſſæ ſimilitudinem;  
eam ab ytraq; maxilla diſtinguimus, & modo caluariam, modo cra-  
nium appellamus ex pluribus oſſibus, vt ſupra attigimus, merito  
conſtructum, atq; ex ijs, quæ interius, atq; exterius denſam, & le- 30  
nem ſuperficiem haberent, cum meditullium fungoſum ſit, ac pu-  
mici perſimile. Nam ſi ſubſtantiam vndiq; aſperam adepta eſſent,  
nihil impedimento futurum erat, quo minus adhærentes membra-  
nas læderent, atque eroderent: cauernoſa vero inter vtranc; ſqua-  
mam oſſa capitis extiterunt: non modo vt leuiora forent, ſed etiam  
vt medullam continere poſſent, ſuum ipſorum pabulum, ac nutrime-  
tum. Perforata uero ſunt crebris foraminibus exiguis illis, nullumq;  
ordinem ſeruantibus, ut per ea pateat aditus uenulis, atque arterio-  
lis, quæ ſanguinem pro alimento, ſpiritumq; pro calore fouendo, ac  
uita conſeruanda deferunt. Hoc autem interſtitium pumicoſum cau-  
ſa fuit



- fa fuit, vt non nulli dixerint ex duobus parietibus caluariam conditam esse, quas tabulas vocant, duas illas crustas, seu squamas intelligentes, quæ duræ sunt, & aliquantulum crassæ, atq; vndiq; spongiosam, ac medullosam illam substantiam claudunt. Ossa vero ipsa suis vndique seiuncta sunt terminis, quos fere omnes lato vocabulo Sutas nominarunt. de quibus hic nobis agendum est, cum plurimum conferant ad capitis ossa explicanda. Sutarum aliæ sunt legitimæ, aliæ nothæ, quæ cum potius commissuræ quædam sint, ad harmoniam magis, quam ad futuram referendæ videntur. Oÿto itaq;
- 10 omnes sunt, quinque spuria, propria, ac veræ suturæ tres, ex quibus vna est, quæ in occipitio, & in eius basi, qua vergit ad vtranq; aurem, diuellitur, lateq; disiuncta in ipso ascensu sensim angustior redditur, atq; in cuneum coit græcæ literæ  $\Lambda$  formam constituens, itaq; lambdoidis nomen adhuc retinet: dirimit ossa sincipitis, & temporum ab osse occipitis. Altera in sincipite posita, è regione lambdoidis, anteriorem supra frontem circuli speciem ambit; & quia vel similis est corollæ, vel quia coronæ ibi potissimum locari solent: Ideo coronalem omnes vocant, & stephania à Græcis nominatur dirimens ossa sincipitis ab osse frontis. Tertia per verticem recta
- 20 incedit, & quodammodo partem caluariæ dextram à sinistra seiungit. Hanc *ôberian* Græci, nos sagittalem, & rectam appellamus. *paldoes* quoque vocant, cum virgæ similitudinem referat. Et ea est quam Galenus in libello de ossibus seruari semper affirmat: vbi ex professo agit de varijs capitum figuris. Reliquas vero duas testatur deleri, aliquando ambas, aliquando alterutram tantum. Ego vero (pace tanti uiri dixerim) vtrumq; falsum esse affirmare ausim, sexcenta millia capitum inspicere manibusq; atrectare mihi per otium licuit multis in locis, ac præsertim Florentiæ in Diuæ Mariæ Nouæ amplissimo Xenodochio, ubi per innumera propemodum secula
- 30 demortuorum ossa in elegantissimas strues digesta seruantur: necnô Romæ in communi gentium omnium cœmeterio, quem Campum Sanctum nominant; & tamen ne vnum quidem cranium cernere potui, quod figura non naturali constaret, aut cui Sutura illa deesset. Sciendum autem, ut supra attigimus, caput eam figuram à natura obtinere: ut spheram utrinq; leuiter compressam referat: ita ut in longum aliquo pacto protuberet. ab hac autem forma nonnullas euariare comperies, ut modo uertice sint acutiore, ac magis fastigiato, modo fronte prominentiore, modo pressius contracta, quod pari etiam ratione de occipitio dici potest. Lateribus item constat modo magis, modo minus compressis, quæ tamen formæ omnes

Duo caluariæ parietes.  
Tabulæ ossium capit.  
Duz crustæ & squamæ caluariæ quæ Sutaræ quæ dicant

Sutarum cognitio in ossium capit. explicatio ne necessaria est. Sutarum diuisio.

Sutaræ nō leuiter sunt harmoniz.

Sutarum numerus.  
Lambdoidis Sutaræ descriptio & v. sus.

Coronalis Sutaræ descriptio & v. sus.

Sagittalis Sutaræ nomina, descriptio, & v. sus.

Galen. lib. de ossibus seruari sagittalem in omni capitis figura.

Gal. opinio de capiti diuersitate in futuris experientia ducere probatur.

Sanctæ Mariæ Nouæ hospitalis Florentiæ.

Campus Sanctus Romæ.

Capitis figura naturalis quæ.

Capitis figura varia suturarum nō variat numerum.

Suturarum differētia.

Sagittalis in viris & mulieribus quāque ad nares usque descendit.

Aristotelem irridet qui mulierū Suturam circula-rem posuit.

Squamofarum Suturarum descriptio.

Ossa squamofa cur dicta sint, & qualia.

Squamoforū ossiū figuram alijs exemplis illustrat.

Ex ossibus squamofis cur superius est durius.

Suturæ sextæ descriptio.

Additamenta labdoidis quid sint Galen.

Vbi sexta Sutura communis est cap. & maxillæ superiori.

Septimæ Suturæ descriptio.

Octavæ Suturæ descriptio.

naturales sunt, neque adeo differunt, ut has naturales, illas non naturales appellauerit, feruarique in his semper cognoscas futuras omnes, licet hæc quoque nonnihil discrepent. Atque ut prætermittamus, quod in aliquibus grandiores, ac laxiores appareant, in aliquibus exiles, & compactæ magis: quemadmodum supra diximus: illud est tamen adnotandum, in quibusdam caluarijs tum uirorum, tum mulierum quicquid alij dixerint, sagittalem ipsam per mediam frontem, usque ad nasi summum descendere: sed hoc raro admodum accidit. Quamobrem uix satis mirari possum Aristotelis diligentiam, qui differentiam in uiris, & mulieribus quo ad futuras, quæ nulla est, obserua- 10  
uit. Sequuntur duæ suturæ in decliui capitis longitudine sitæ, à sagittali æque distantes, quæ ab extremitate descendentis coronalis circulari quodam ductu supra aures feruntur, & in quibusdam humil limam labdoidis sedem pertingunt, in nonnullis uero os mammillare non transeunt, à qua non magni refert, si alios anatomicos sequentes principium sumamus harum suturarum. Sat enim esse debet, si cum rei ueritate descriptio consentiat. Hæc duæ suturæ utrinque scilicet una, cum squamosa ossa constituent, atque conglutinent, squamosæ & ipsæ dicuntur, ossa uero hæc squamosa merito nuncupantur, quoniam inftar squamarum componuntur. Quod enim ex- 20  
terius ab aure ascendit, paulatim attenuatur; quod uero subest, descendendo fit tenuius, ut alterius pars tenuior parti alterius crassiori incumbat, & æquali proportionem hinc inde agglutinetur. Hæc forma tibi facile occurret: Si piscium squamas, aut ferreas lorice laminas alijs alias incumbentes & inhærentes intueberis. Verum prius quàm ab his ossibus discedas, illud adnotabis, quod extrinsecus as- fidet, illo durius esse multo, quod est suppositum, cum illi natura hoc ipsum tanquam propugnaculum constituerit. Quinque suturæ iam explicatæ ipsius capitis sunt propriæ: Sexta futura illa erit, quæ ab extremitate labdoidis deducta per medium lapidosorum ossium fer- 30  
tur tendens ad capitis basim, ubi caput prima cum uertebra iungitur, quam partem Galenus additamenta labdoidis suturæ nuncupat. Inde itaque incipiens sexta futura sursum utrinque repetit ad caua temporum, usque ad fines coronalis, ac reflexa deorsum ad extremos dentes, atque ad palatum: & ibi capiti, ac maxillæ superiori communis est, uniuersumque os cuneale in se comprehendit. Septima propria os capitis, quod octauum numerabitur: ab osse frontis distinguit, ab omni parte illud separans. Octaua, & ultima futura nobis fuerit, quæ à cauis temporum ortum habet, ubi sexta, quæ reflectitur: recta incipit descendere, ac per mediam minoris canthi regionem, mediamque;



diamq; oculi orbitam serpit: & ad summum nasum transuersim delata maxillam superiorem à fronte diuidit: at in interna caluaria iuxta basim os cuneale ab osse frontis disiungit. Et hæc de futuris breuiter dicta sint. in quo vnum illud animaduertendum est futuras omnes extrinsecus magis apparentes esse. Intrinsecus enim futurarum imaginem non referunt, sed in harmoniam potius degenerant. Reliquum est, ut tandem capitis ossa explicemus. Ossium caluariarum constituentium numerus non est idem ubiq; apud Galenum. Nam in libro de ossibus sex enumerat, & hoc ei cum Aristotele conuenit:

- 10 at in xi. de Partium utilitatibus septem esse dixit. Ego uero octo unà cum Vessalio numeraui. Duo sincipitis siue bregmatis. bregma enim dicitur pars superior cranij iuxta futuram coronalem, quæ infantibus, ac nuper natis tenerima est, paulatim autem durefcit, ita ut temporis progressu ossa fiat: Aristoteles obseruauit, pueros non prius uocem dearticulare posse, quàm uniuersa caluaria in os concreuerit. In bregmate, cum adhuc molle est: Sistolē, ac Diastolē plane perspicimus: Id quod nobis optime cōfirmat perpetuo constrictionis, ac dilatationis motu cerebrum donari. Præterea sciendum est uulnera in bregmate accepta lethalia esse solere: ossa autem hæc illa sunt, quæ inter labdoidem, coronalemq; futuram clauduntur, quæ sagittalis dirimit, atq; interfecat; itaq; utrinq; alterum constituitur, ambo uero descendunt in unionem squamosorum ossium, & quadrilateram ferme formam habent, atq; hoc modo circumscribuntur, superiore parte per rectam pene lineam à sagittali, anteriore à coronali, posteriore à labdoide, inferiore autem à squamosis conglutinationibus. Tertium os, quod occiput uocamus, à futura labdali fines habet, præterquam quod in basi per sextam futuram transuersim incidentem ab osse sphenoide disiungitur. Hoc os partibus constat inæqualibus, alijs quidem crassioribus, alijs uero
- 30 tenuioribus: in media enim basi crassissimum est, nec non etiam ab eo foramine, per quod in spinalem medullam cerebrum deriuatur, insurgit prominentia quædam, quæ sursum ad summum usq; ascendit: ut ubi os ualidius fieret. Ergo si quando in supinum quis laberetur, minus ex eo casu pateretur ossis huius robore munitus. semper enim natura conseruandi operis sui studiosa ubi maius periculum impendit, ibi quoq; maiora struit præsidia. Cum itaq; ictus occipitis neq; propulsari possent, neq; oculis præcaueri, ossis crassitiem munimenti instar esse uoluit: Vt uideatis quàm longe erret Aristot. qui primo de Animalium Hist. infirmissimum, tenuissimūq; ossium omnium occiput esse dixit. reliquæ partes ab eo, quod diximus, tuberculo

Suturæ extra conspicuæ sunt, intra uix apparent.

De ossium capitis numero.

Gal. lib. de ossibus Arist. de Part. Animalis.

Galeni xi. de Vsu Partium.

Vess. opinio de numero ossium capitis laudatur. Bregma quid sit.

Aristotelis opinio de bregmate.

In Bregmate pueri dialloles & sistoles conspicua est.

Cerebrum mouetur motu dilatationis & constrictionis.

Bregmatis uulnera lethalia.

Bregmatis ossium descriptio.

Occipitis circumscripito.

Cur in occipite prominentia sit.

Cur occipitis os crassissimum.

Arist. opinio 3. de hist. Animal. qd occiput sit tenuissimū reprobatur.

Aristoteles falso  
putauit occiput  
esse inane.  
Vesalius falso Ga-  
len. citat in lib.  
de ossibus.

Occiput constat  
quinque lateribus  
non tribus ut Gal.  
Occipitis laterum  
descriptio.

Occiput in infan-  
tibus nunc quinque  
nunc septem os-  
sibus constare vi-  
detur.

Occipitis multifi-  
di in pueris vi-  
litas.

Gal. XII. de Vsu  
Part. capiti cum  
prima & secunda  
vertebra articula-  
tionem effert.  
Tubera duo in oc-  
cipite qualia &  
cur talia.  
Tubera duo occi-  
pitis non sunt ut  
coronæ contra  
Galen.  
Os frontis sim-  
plex.  
Quibus os frontis  
duplex est.  
Ossis frontis cir-  
cumscriptio.

tuberculo tenuissimæ quidem sunt: sed admodum densæ, ac solidæ, neque excarnes, siquidem à musculis teguntur posteriorem colli sedē occupantibus. In hoc ipso osse cerebellum residet, neque villo pacto est inane: sicuti falso asseruit Aristoteles. Vesalius Galenum inquit in calce libelli de ossibus temere scripsisse in cerebro quoddam os dari, idque esse processum illum in canibus conspicuū, qui inter cerebellum, ac cerebrum iacet. Sed falso Galenum citat hoc loco Vesalius, nusquam enim, quod ego viderim, huius ossis mentionem Galenus fecit. Occipitium iam à nobis descriptum non tribus late-  
ribus, ut Galeno placuit, sed quinque mihi constare videtur; quorum 10  
duo prima incipiunt ab infima parte futuræ labdoidis iuxta tempo-  
rum ossa, & sursum à futura nunquam declinantes ascendunt, donec  
ad mucronem eiusdem futuræ coeant. duo vero alia ab eiusdem fu-  
turæ calce secundum os mamillare, ac deorsum tendunt usque ad  
eam lineam, seu futuram, quæ dirimit occiput à sphenoide, cuius  
futuræ transuersim deductæ beneficio quintum occipitis latus neces-  
sario conficitur. Scire insuper licet occiput in adultis vnicum esse: at  
in pueris ex quatuor, quinque, & septem ossibus constructum videri.  
Ad amplum enim foramen, per quod medulla dorsī egreditur, qua-  
tuor discrimina apparent, quibus in quatuor partes os ipsum disiun- 20  
ctum dixeris. Ex his autem interstitijs effluit cartilago, quæ liga-  
menti vice caput primæ, ac secundæ vertebræ connectit, ut moles  
tanta capitis paruis ossibus firmitus hæere posset: de qua articula-  
tione miranda multa refert Gal. lib. de Part. Vsu XII. Sed de his liga-  
mentis plura suo loco dicemus. Illud postremo animaduertendum  
est ab ipso sinu dorsalis medullæ iuxta occipitis basim prominere duo  
tubera, longa illa quidem, & cartilagine in crustæ modum obtecta,  
verum minus acuta, quàm censuit Galenus, qui illa coronæ assigna-  
uit, quæ ideo facta sunt, ut immittantur in sinus primæ vertebræ ad  
capitis articulationem constituendam. Quartum est os frontis, 30  
quod simplex atque vnicum est, exceptis caluarijs quibus recta futu-  
ra, siue sagittalis usque ad summum nasi pertingit, quod tamen raro  
inueniri diximus. Proinde vnicum os frontis, quale in omnibus fe-  
re comprehenditur, circumscribemus. Illud quidem primum co-  
ronali futura à sincipitis ossibus disjungitur, à cuneali autem disidet  
ea futura, quam sextam fecimus, præcipue quæ per temporum ca-  
ua subiugalibus transiens, & coronalis finibus accedens ad interna  
penetrat; ubi perspicuum est, quod ponimus discrimen. Tercio se-  
iungitur per septimam futuram ab osse capitis octauo. Vltimo à cu-  
neali, ac etiam à maxilla superiore, cuius interuentu futuræ, quæ à  
cauis



- cauis temporum orta per medias oculorum sedes perrepat vsq; ad summū nasum peruenit, ubi supercilia definūt. os frontis crassum est, sed non æq; ac ipsum occipitiū, tenuius tamen se ipso redditur, vt in oculorum regione, atq; vbi cum octauo osse committitur, ac tandem supra supercilia, vbi veluti duas in partes diducitur: vt sinum amplum ibi conficiat ad aerem continēdum; qui sinus fere semper duplex reperitur; tam ad dextram quā ad sinistram vergens: quod ita esse in publicis, priuatisq; dissectionibus obseruaui. hanc cavitatem Galenū ignorauit. Frontis ossis figura rotunda est, qualis sphæra compressæ portio esse debet. os istud qua committitur cum verticis ossibus, & sagittali futuræ occurrit, tenuius est, & infirmius, neq; mirum est, cum in nuper natis pars illa membranea sit, qualem paulo supra diximus esse sincipitis portionem coronali futuræ finitimam. Sequuntur ossa temporum, quæ superiore parte, quam sagittalem spectant. Squamosis agglutinationibus circumscribuntur. Posteriore autem ab additamentis futuræ labdoidis, & à sexta futura, quæ infimam quoq; eorundem ossium partem à Sphenoide, anteriorem vero à maxilla superiore disiungit: ossa hæc ad triangularum figuram Galenus reuocauit: Sed ego cum Vessalio potius circularia dicerem: cum talia maxime videātur superiore sui parte, nisi hanc formam multi processus obscurarent, & primum mammillaris, de quo etiam supra meminimus, rupis similitudinem referēs: Mammillaris ideo nuncupatus, quod vaccini vberis formam imitetur; græcis *μαστοειδής* vocatur, qui processus non solum musculorum insertioni deseruit, de quibus postea dicitur, sed etiam vt intus excavatus amplam sedem relinquat auditus organis apprime necessariam. Ideo vacuum illud intus reperias, ac diuersis veluti speluncis excavatum. Deinde non procul hinc erumpit processus alter in eiusdem ossis basim implantatus, pertenuis, longus, ac durus, qui diuersis nominibus donatus est pro diuersarum figurarum ratione, quibus comparatur. Ab acus enim imagine *βελουειδής*, à styli scriptorij similitudine *γραφοειδής* vel *συλκοειδής* ac demum à galli calcaris specie *πληκτρον* appellatur, nos vbiq; styloidem dicemus. cuius nomine, quidam perperam intellexit totam eam partem per quam meatus auditorius in cerebrum ducitur, & hunc Galeni testimonio *βελουειδής* seu *γραφοειδής* nuncupari asserit. Adest quidem processus alius iuxta hunc ipsum in longum protuberans interiore caluariæ parte, in quo effingitur labyrinthus, reflectendis aeris ictibus quā appositissimus, auditorium sinum excipiens: sed non is est, quem acui, aut stylo similem esse diximus. Ad hos processus accedit quartus, qui portio est iugalis

Ossis frontis substantia qualis.

Sinus amplus in osse frontis supra supercilia.

Gal. ignorauit cavitatem in osse frontis.

Ossis frontis vbi tenuius & cur.

Ossa temporum.

Temporalium ossium figura.

Mammillaris processus etymologia.

Mammillaris processus vñs.

Idem est *βελουειδής* processus. *γραφοειδής* *συλκοειδής* & *πληκτρον*. Error cuiusdā de processu styloide.

Processus tertius ossis temporalis descriptio.

Processus quartus

ossis temporalis  
descriptio.

Gal. error.

Ossa λιβιδειά que.

Naturæ providen-  
tia in ossibus pe-  
trofis.

Lonigus præce-  
ptor meus.

Historia pueri cui  
os petrosum fra-  
ctum erat.

Historia alia simi-  
lis.

Tertium os πωλύ-  
μορφον & σφη-  
νοειδές.

Os cuneale.

Os basilare.

Sphenoidis ossis  
descriptio.

Sphenoidis antrū

Nova opinio de  
spiritibus anima-  
libus.

Galenii error.

galis ossis, de quo sequenti capite agemus: & ab auris meatu inci-  
pit, in primumq; maxillæ superioris definit, quo cum per obliquam  
futuram coniungitur, & pontis quodammodo formam constituit  
superequantis caua temporum. Ab ortu eiusdem processus iuxta  
meatum auditorium sinus est altus cartilagine in crustatus, non osci-  
tanter omittendus, in quem inferi, atq; articulari solet processus al-  
ter maxillæ inferioris, qui longior est: quem sinum non recte Gale-  
nus descripsit libro de ossibus. ponitur namq; inter aurem, & pro-  
cessum constituentem iugalem. Iam vero temporum ossa infra ad  
basim anfractuosa sunt, & aspera rupes ceu lapideas imitantia, unde  
græci λιβιδειά quasi petrosa, vel lapidosa vocarunt, supra autem leui-  
gata, & quamvis tenuissima sunt, ac præcipue vbi assident muscoli,  
durissima tamen existunt mirabili naturæ providentia, cum vix fran-  
gi sine certo vitæ dispendio possint. locus admonet ne silentio præ-  
teream, quod felicissime celsit prudentissimo, ac doctissimo ætatis  
nostræ chirurgus Ioanni Antonio Plato cognomento Lonigo, quo  
præceptore septennium usus sum, adeo vt quantum in hac medendi  
arte profecerim: me nunquā poenitere possit. Hic Patauij puerum  
in Diui Antonij collegio, qui ex alto cadens temporis os ad ocula-  
ris formæ magnitudinem fregerat: miro ingenio, atq; arte sanauit,  
quamvis certa mortis signa omnia adessent. Eundem ego fortunę,  
curationisq; exitum in Romano puero sum assecutus. Os capitis se-  
ptimum varias formas præsefert. propterea græci πωλύμορφον id voca-  
uere, quod etiam σφηνοειδές alio nomine dicunt, hoc est cuneiforme,  
quandoquidem inter ossa capitis, superiorisq; maxillæ veluti cuneus  
quidam immittitur. barbari os basilare vocāt, quod non secus ac ba-  
sis quædam cerebro substernatur: nam in media capitis basi sedet cir-  
cumscriptum vndiq; à sexta futura, quam diximus totum hoc os in  
se comprehendere: præter quàm in anteriori parte, vbi terminum  
ab octaua etiam futura capit. In ipsa basi crassum est, atq; intus an-  
trum habet, quod continuum est cum cavitae ossis frontis, in qua  
diximus aerem sursum per nares attractum seruari, vsquequo in hoc  
ipsum antrum delabatur. Ex quo fortasse materia cerebro suppedita-  
tur ad animales spiritus gignendos, quidquid alij de hac re senser-  
int, vt infra ostendemus. Huiusmodi antrum in omnibus fere am-  
plum est, & vacuum, in aliquibus tamen spongiosæ cuiusdam sub-  
stantiæ plenum. Squama itidem tectum est dura, & densa, nec ul-  
lis foraminibus peruiua, quanquam Galenus foraminibus refertum  
esse uoluit cribri speciem referentibus, per quæ cerebri pituita per-  
colaretur. In internæ caluariæ medio hoc os sinum quandam habet  
perle-

10

20

30



perelegantem, equi sellæ simillimum, in quo sita esse solet glandula quædam pituitam suscipiens, unde postea defluit in palatum, ac nares per meatus ad palatum ea in regione utrinq; tendentes, de quibus agemus tractatu proprio de capitis foraminibus. Ad latera, quæ temporum caua respiciunt, duæ sunt partes intrinsecus concavæ, extrinsecus uero conuexæ. Item ea parte, quæ cohæret cum extrema maxilla superiore, ubi molares infixi sunt ad caluariæ basim geminos utrinq; processus inuenies alarum uespertilionum effigiem exprimentes, propterea à Græcis dicti *ωπεριγοειδής*. in horum processuum medio sinus est profundus, unde exoriuntur musculi in ore delitescētes, ut illud claudant. Octauum os capitis in media frontis basi positum à sphenoide per septimam futuram, interna caluariæ sede seiungitur, extra uero ad secundum, tertiumq; os maxillæ superioris terminatur. Tenuissimum id est, crebrisq; foraminulis distinctum. quamobrem Græcæ *ἰσχυροειδής* dicitur, quòd imaginem cribri referat, per quæ foramina patere solet ascensus odoribus cerebrum petentibus: cuius rei argumentum inde sumimus, quòd coriza, uel graui destillatione laborantes odorandi facultatem interim amittunt. opplentur enim foraminula hæc pituita spirituum grauitate detenta, atq; olfactitia organa ita impediuntur, ut ne ullum quidem odorem sentire queant, aut sensili uirtuti suggerere. Media huius ossis regione prominet altus, subtilisq; processus sedem utranq; interfecās, qua olfactus instrumenta sunt sita, qui etiam in nares descendens nasi septum constituit. Hoc os Galenus missum fecit in libello de ossibus, de quo tamen IX. de Partium Vsu meminit.

Sella in Sphenoidē.  
Glandula suscipiēs  
pituitam.



Sphenoidis processus *ωπεριγοειδής*.

Octauū ossis capitis delineatio.

*ἰσχυροειδής* os cur  
ita dicitur.

Cur laborans coriza odorem non percipiat.

Gal. non meminit  
de itimoide in  
lib. de ossibus.

### De Osse Iugali. Cap. VI.

30 **O**S Iugale græcis *ζυγωμα* describi solet separatim ab ossibus capitis, ac maxillæ superioris, quamuis utriusq; portio existat: nam ex duobus processibus constitutum est, quorum alter à maxilla superiore sub paruo oculi angulo enascitur, alter uero ab ea parte ossium temporum, quæ auditorio foramini superposita est. Hi duo processus committuntur per futuram, quam in medio obliquam habent, atque ita os vnum efformant, quod iugo simile est: ac etiam pontis cuiusdam instar esse videtur, quod sit propositum temporis musculo, ceu propugnaculum quoddam à natura paratum, propterea foris gibbum est, intus autem cauum, & vt extrinsecus occurrentibus pertinacius resistat, durissimum est ac pene solidum. Non enim omni prorsus cauitate destituitur, aut omnino expers est medullæ

*ζυγωμα.*

Iugale est portio  
ossium capiti &  
maxillæ superioris.  
Iugalis descriptio.

Iugale instar pontis.  
Vfus Iugalis primus.

D quemad-

Iugale non caret quemadmodum Vessalius existimauit. Id namque effractum cauer-  
medulla contra nosum protinus apparebit, ac intus nutrimentum continens. Factū  
Vessalium. præterea fuit iugale os, vt ab eo manforius musculus principium du-  
Secūda vtilitas Iu ceret, sicuti ostendetur vbi de musculis agemus.  
galis.

## De ossiculis organi Auditorij. Cap. VII.

**A**NTEA QVAM maxillæ superioris ossa pertracto: operæpre-  
Gal. ignorauit of- tium est explicare nonnulla ossicula, quorum cum apud Gale-  
ficula organi au- num mentio nusquam fiat: coniiciendum est veteribus anatomicis  
ditus. ignota fuisse, atq; à recentioribus tandem inuenta. quis tamen in- 10  
Vessalij laus. uentor fuerit, me plane latet. Equidem Vessalium horum inuento-  
rem libenter agnoscerem, cum Anatomicæ artis studiosissimus sit,  
Carpus ante Vess. & de illa optime meritis: nisi Carpus de his ante illum suis scriptis  
meminisset. Auditus organi constructionem ingrediuntur, de quo  
mementur ossicu- hic non est scribendi locus, sed infra cum reliquorum sensuum instru-  
lorum meatus au mentis. Ex his ossiculis recentiores duo duntaxat nouerunt, quæ  
ditorij. etiam descripserunt. At ego cum hæc accurate peruestigare, ter-  
tium præterea inueni, quod describam post aliorum duorum descri-  
Inuenit tertiu of- ptionem: Vt videas nemini præclusam esse philosophandi viam. 20  
ficulum. Inter ossa temporum, vt supra attigi, adest processus ad cerebri bas-  
Nemini præclusa sim, qui in iugi modum extenditur, in acutum desinens, cauernâq;  
est philosophan- di via. intus habet instar labyrinthi, in cuius prope media regione adstant  
ossicula suis membranis adnexa. Ideo per auditorium meatum iter  
Officula organi est ad horum ossiculorum inuentionem, quorum primum propin-  
auditus mebra- quius est foramini interiori, longiusculum, ac femoris figuræ quā  
nis inuoluuntur. Quomodo inue- simillimum, à quo tamen aliquantulum euariat: siquidem parte in-  
niantur ossicula feriore non depressis est capitibus, vt femur, sed mucronis ritu in  
hæc. acutum tendit: parte vero altera capite est oblongo, rotundoq;  
Figura primi ossi- Præterea duobus processibus donatur similibus ijs, quos rotatores 30  
culi. in femore vocabimus. Parte sui acuta, ac tenui in membranulam  
inferitur, quæ intenditur ipsi, ac illi, quod succedit, ad quam pari-  
ter extenditur, & adhæret veluti ad eam stratum: parte altera, quæ  
Cur primum ossi- crassior est, & capite insignita, illam ipsam membranam tympani  
culum dicat mal- modo quatit. Iccirco ab usu magis, quàm à forma malleum hunc di-  
leus. xerunt: quemadmodum alterum, quod immediate sequitur, incudi  
Cur secundū ossi- simile esse voluerunt, quòd incudis vices gerat, excipiens quodam-  
culū dicatur in- modo ietus permoti, ac percutientis malleoli iam descripti. Id secun-  
cus. dum ossiculum, quod incudis nomine donarunt, parte superiore  
Incudis ossiculi crassiusculum est, qua planā incudis partem refert: & in duos tenues,  
descriptio. acutosq;



acutosq; processus tanquam crura definit: quorum alterum immit-  
titur in tertium ofsiculum, de quo mox dicam & in membranula ibi  
assistente detinetur, ac stabilitur. Ofsiculum hoc me iudice molari  
denti aptius comparaueris, qui duas radices habeat, alteram lon-  
giorem, ac tenuiorem, altera vero crassiore, ac breuiorem. Cæ-  
terum vsus gratia, vt dicebam, incudis nomine dictum est. Natura  
non temere duo hæc ofsicula ita construxit, vt crassiore parte mu-  
tuo se respicerent, ac pene contingerent. Nam cum ex aeris motu  
auditis fiat: ictus aeris in meatum ad hæc ofsicula deferitur; fitq; ibi

Secundū ofsiculū  
simile est denti  
molari.

Vsus duorum of-  
sium organici au-  
ditus.

10 quædam repercussio ad eum ciendum sonitum, qui sentitur. Hæc  
igitur ofsicula cedente membrana moueri, atq; inuicem confricari  
necesse est: vt cum primum os aeris ictu percussum in alterum im-  
pingat, illudq; feriat, merito malleoli, secundum vero incudis offi-  
cio pariter, & vocabulo donatum est; vbi ista articulata sunt, carti-  
lagine incrustantur. His tertium accedit nemini, quod sciam, ante  
nos cognitum. Iacet hoc, vel latitat potius in cauernula quadam  
ferme rotunda intra sinum auditorium exculpta, quo fit, vt ad orga-  
ni auditus fabricam non pertinere non possit: cauum est, & perfo-  
ratum egregie. ferrei instrumenti naturam imitatur, quod stapham

Situs tertij ofsicu-  
li.

Staphæ comparæ  
figura tertij ofsi-  
culi.

20 nouo vocabulo nuncupamus, in quo equorum sellis insidentes pe-  
des sistunt. Vna re tamen à stapede differt, quod caret eo forami-  
ne, in quod lora immittuntur ad stapedem sella vtrinq; alligandam.  
At huius loco capitulum quoddam extat rotundum, quo ad incudis  
processum accedit. Quocirca cum ofsicula hæc inter se coniuncta  
sint, & colligata: ex eo coniectare haud dubie possumus auditus or-  
gano simul omnia deferuire. Ofsicula hæc cum minima sint; ideo  
Vessalius illa more suo solida esse affirmauit: attamen in ijs cauernu-  
lis quamuis exiguas reperimus: intus enim spongiosa sunt, & medul-  
lam pro magnitudinis proportionem continent: præsertim illa duo,

Ofsicula tria audi-  
tus organo fer-  
uiunt.

Ofsicula organi  
auditus non sunt  
solida cõtra Ves-  
sal. tertio exce-  
pto.

30 quæ ab alijs descripta fuere. Etenim tertium propter nimiam sui te-  
nuitatem solidum omnino esse crediderim. Si quis hæc ofsicula in-  
uenire cupiat; leuiter, paulatimq; incidat, quæ circa meatum audi-  
torium consistunt; & sensim meatum aperiat, donec cauitatem illam  
detectam, patentemq; videat: & vbi deuentum fuerit ad mediam fe-  
re ipsius sinus regionem iuxta membranam, que ibi obducitur, ac  
implet cauernulas in eo sinu existentes, statim perquirenti occurrêt  
forma à nobis descripta. Quæ administratio cum est iucunda visu,  
tum etiam admirabilis, & quæ nos in sapientissimi opificis amo-  
rem volentes, nolentesq; trahit, rapitq;.

Administratio of-  
ficulorum.

Ofsiculorum orga-  
ni auditus ad op-  
timū & maximū  
Dei amorem in-  
uitat.

## De Maxilla superiore. Cap. VIII.

**Q**UAE nam sit maxilla superior, facillime quidem vel digito demonstratur: at nihil fortasse difficilius est quàm verbis explicare, qualem figuram habeat, quot, quibusq; ossibus constet, quomodò à cæteris capitis partibus distinguatur. Maxilla superior animantibus omnibus motu caret Crocodilo excepto, cui mobilis existit inferiore quiescente, & Plitaco, qui vtrang; eodem tempore mouet, separatimq; alterutram; quod ego primus, quod sciam, obseruau. Ex penitissimis naturæ arcanis perquirendum esset, cur hoc solum animantium genus ab alijs euariet: satis tamen interim nobis esse debet effectum nosse: etiam si causa ignoretur. Verum in hominibus venustati est, ne dum commodo inferioris maxillæ motus: nam maxillam superiorem hominibus, æque ac Crocodilo moueri, quid ridiculum magis, ac deformius humana facie fiat? totam siquidem contrahi, rugariq; oporteret; vnde ea vultus forma, atq; indoles corrumpetur, qua nihil intuentibus gratius, nihil iucundius offerri potest. In humana autem fabrica decus, & ornamentum considerari quis admiretur, cum illa Deus Opt. Max. nihil absolutius creauerit, perfectius nihil? Adde quòd breuior facta est superior maxilla, vt rotundior, atq; elegantior esset facies, nec promineret quemadmodum in brutis. Ex pluribus etiam ossibus constructa fuit, non ob eam causam tantum, quam Anatomici tradunt, ne si partes illius omnes in vnum coactæ vnicum os efficerent, parte vna laborante labor in vniuersam maxillam diffundi posset: verum etiam ut ex eis futuris prodirent ligamēta musculorum constructionem ingredientia, per quæ illi firmitus principijs suis inhærent. Neque id obseruatum est difficile, quando ex ipsa sectione, si musculos ita persequare, ut eorum ortum inuenias: cum ad principium uentum fuerit, nō obscuræ tibi erunt ligamentorum propagines ex medijs futuris prodeuntes, in musculorum substantiam dispergendæ, quarum beneficio cum muscoli tenacius ossæ parti, unde ortum ducunt, alligantur; tum etiam validiores fiunt, vt supra dictum est in appendicum vñ. Cum igitur ex pluribus ossibus construi maxillam superiorem necesse fuerit, videndum est, quot ea sint, & quibus finita terminis. In varijs Galeni locis varius horum numerus traditur; nam libello de ossibus quindecim enumerat: xi. de Partium Vñ nouem: in Introductorio, siue medico Galeno adscripto duodecim; cui numero Vessalius subscribit: At ego tredecim semper esse obseruau. Nam quinq; in vtraq; parte perspectis vnum sine pari adinueni, quod vltimo loco

Difficilis est explicatio maxillæ superioris.

Crocodilus mouet maxillam superiorem.  
Plitacus mouet maxillā vtrang;.

Cur homo maxillam superiorem non moueat.

In hominis fabrica ornamentum ratio habetur.

Cur maxilla superior sit inferiore breuior.

Cur maxilla superior constet ex pluribus ossibus.

Causa secunda.

De numero ossium maxillæ superioris.

Gal. nō cōstat sibi in numero ossium maxillæ superioris.

Gal. lib. de ossib. Galen. xi. de Vñ Part.

Gal. in Introduct. Contra Vessal. Ossa maxillæ supe



mo loco explicabitur. Ossa igitur hæc tribus futuris à capitis ossibus separantur; sexta, quæ ab extremitate coronalis deorsum subiugali ad dentes extremos delata ad palatum terminatur: Octaua, quæ à cauis temporum principium sumens sursum repit transuersim faciem in summo naso interfecans; demum ea futura breui, atque obliqua, per quam duo processus committuntur temporali musculo superpositum os, quod ubiq; iugale dicimus, constituentes. Hæc itidem ossa priuatim suis terminis ad hunc modum circumscribuntur. Primum, cuius figura varia est, quatuor habet ossa contigua, quibus

10 committitur: nam posteriore parte processum emittit alteram iugalis portionem efformantem; atq; ibi cum altera eiusdem portione, hoc est cum temporis processu per obliquam futuram coniungitur; deinde in cauis temporum cuneiformi committitur sextæ future beneficio, ubi sese illa reflectit, vt deorsum ad postremos dentes feratur. Siquidem descriptione nostra sexta futura totum illud os ambit, quod est veluti cuneiformis brachium in vtrinq; latus subiugali extensum, per quod ipsum cuneiforme temporali musculo in medijs cauis subsidet, ac fere ad coronalem vsq; protenditur. Huius igitur particula ad oculum vergens tantum cum primo maxillæ superioris

20 osse continetur, quantum futura ipsa recta descendit. Parte autem superiore iuxta supercilij extremitatē idem os cum frontis osse coalescit per octauam futuram, quæ per mediam oculi cavitatem ducta trāsuersum summum nasum ab ima fronte secat: inferius à tertio maxillæ ossis disiungitur quadam futura, quæ sub temporis catio à sexta recedens sursum ad faciem repit: ac per mediam ipsam ductu sinuoso lata in oculi orbitam intrat: per quam ascendit, donec octauum attingat, ibiq; definēs exteriorem oculi angulum circumscribit; quem totum os istud in se comprehendit. Secundum omnium minimum in magno oculi sedis angulo iuxta nasum assidet, ac statim eiusdem

30 anguli initio sese offert, ubi foramen est in nares peruium, cui præfidet caruncula glandulæ vice pituitam à cerebro manantem ad oculos excipiens, vt illa ad ipsas nares exprimat. Quam rem vt apertius comprobaret Galenus, addidit medicamenta in oculos immissa per nares effluere solere. Id quod hætenus mihi experiri minime licuit. Et mirum profecto est quomodo membranam, quæ ibi assistit, ocularia hæc medicamenta penetrare possint. Animaduertendum tamen est hoc loco abscessus illos fieri, quos Græci *αἰγίλωπας* nominant: qui si negligantur, in fistulas lachrimales abeunt ad os vsq; penetrantes. Ossiculum id superiore parte octaua futura terminatur, quia sæpe iam dictum est os frontis à superiore maxilla diuide-

re. Idem

rioris sunt tredecim.  
Ossium maxillæ superioris defectio in vniuersum.

Primum os maxillæ superioris.

Sexta futura quid sit.

Secundi ossis maxillæ superioris descriptio.

Gal. opinio de medicamentis in oculos immixtis ad nares refluentibus. reprobatio. Vbi sunt *αἰγίλωπες*.

*Αἰγίλωπες* si negliguntur transeunt in fistulas.

Os malæ est tertium os maxillæ superioris.

Galenii error in offe malæ.

Gal. dictum verum est in simijs & canibus.

Fines ossis malæ.

Sutura transversa sub palato in pueris.

Ossis malæ substantia qualis.

Sedes oculi ex quibus ossibus constitat.

Orbita cur dicitur oculi sedes.  
Orbitæ diuisio.

re: Idem quoque ab illo diuidit, & simul etiam à tertio, quibus par ratione commissum est. Tertium, quod à Galeno os malæ dicitur cæteris longe maius, varium est, ac varijs futuris definitur: illud autem est, quod omnes sui lateris dentes continet; quanquam Galenus incisivos excipiat: cum futuram ponat inter caninum, incisivosque dentes; quæ licet in hominibus nusquam reperta sit, in simiarum tamen, canumque maxillis conspicua est. distinguitur autem id os tertium à primo maxillæ osse communi futura per mediam faciem sub genis in oculi orbitam repente, qua itidem diximus primum os huic ipsi tertio committi; superius per octauam futuram ab osse frontis terminatur. In interno oculi angulo à secundo dissidet linea totum id ossiculum ambiente. Quæ vero nasum spectat, ab eius ossibus per futuram ab octaua descendentem disiungitur sub palato ab eo osse, quod quintum numerabimus, insigni futura, quæ transversim per palatum incedit: vbi quoque lineam reperias per palati longitudinem deductam, sursumque inter incisivos dentes usque ad imum nasum assurgentem, cuius opera tertium os in dextrum, sinistrumque diuiditur. Illud præterea notare libet, aliam sub palato ipso futuram dari transversim, & ad utrumque caninum dentem terminatam, quæ in pueris conspicua est, in adultis autem sic aboletur, ut nullum sui vestigium relinquat. Postremo sphenoidi finitimum est os istud, vbi sexta futura, postea quam diremit primum à temporum ossibus; in amplam cauitatem discedit, ibique disperditur, usque dum extremis dentibus appropinquat. hoc insuper de tertio hoc osse adnotate, illud præterquam quod multis partibus perforatum est, ac etiam spongiosum, amplam in se cauitatem continere intus, extraque ab osse veluti ampuloso, attenuatoque obtectam; quod fortassis à natura leuitatis gratia factum fuit. Ex his ossibus, quæ hæcenus descripta sunt, omnia colligere potes, quæ ad oculi sedem constituendam necessario concurrunt. Nam partem superiorem, atque etiam interni anguli dimidium os frontis; reliquum tertij ossis portio, quæ cum nasi ossibus committitur; inferiorem, ac simul externum angulum totum primum os struit. Quod autem ad interiorem ipsius sedis partem attinet: secundum os ithmoides, & demum cuneiforme suam operam, materiamque subministrant, quam oculi sedem, quod in orbem exculptam cernerent: ideo posteriores orbitam nuncuparunt, eaque ab omnibus in magnum angulum interiorem nimirum, & in paruum, qui exterior est angulus, nec non etiam in superiorem partem, quæ supercilij subiacet, atque inferiorem diuisa est, quæ genis supereminet. Verum ad reliqua maxillæ superioris ossa, vnde digressa



gressa est oratio, reuertatur. Quartum itaq; sequitur os, quod alterum ex duobus nasi ossibus Vessalio est. Nos vero nostrum ordinem sequentes quartum illud esse dicimus, quod ille pro sexto, atq; vltimo accipit. Idq; repositum est iuxta palati extremum, cuius nō minimam portionem occupat, distinctum ea futura, quam dictum est transuersum palatum secare, terminatur quā nares in fauces pertinent. Dirimitur præterea sphenoidis processibus, quos alis Vespertilionum comparauimus, sextę futurę beneficio ad intimos dentes decurrentis. Quintum os partem nasi superiorem, quæ vere  
 10 ossæ est, geminum existens constituit. Inferior vero nasi pars cartilaginea est, vt cum ictibus, casibusq; maxime exposita foret, non ita facile frangi posset; quemadmodum assidue contingeret, si ossæ facta esset. Quod igitur osseum est nasi, cum duplex sit, communi futura in dextrum, ac sinistrum distinguitur, ac frontis ossi inter supercilia committitur per octauam futuram, de quâ sæpe meminimus. In descensu autem ab vtraq; parte cum ossæ tertio per futuram communem vtriusque coniungitur. At in interna parte, vbi ambo hæc ossicula communi linea iunguntur; adhærent septo illi, quod ossis cribri speciem referentis partem esse diximus. & hæc dicta sint de  
 20 maxillæ superioris ossibus: quæ cum in vtroque latere quina sint, omnia simul erunt decem. Cæterum his vnum mihi addere libet vndecimum, quod supra medium, intimumq; palatum, intra nasi fauces positum est: atque ab ea parte, qua caput pertingit à lata rimula secundum totam longitudinem diffecatur; cuius bifurcata basis, quæ crassior est, in cuneiforme incumbit, extenditurq; per nares septi partem imam constituens, quod tamen ab altera parte leui momento diuellitur. huius formam aratri vomer imitatur, quod imaginem cultri seruat, præter quàm quòd & manubrio caret, & scinnuosa, atque inæquali existit acie. Præter vndecimum addi potest  
 30 duodecimum, & tertiumdecimum. Duo scilicet ossa spongiosa in interno naso sita, satis inæqualia, vbi mucus retinetur. quæ ossa gallica lue laborantibus facile eroduntur, vt praxim exercentibus videre facile est.

Quartū os maxillæ superioris qd sit Vessalio.

Quid sit quartum os maxillæ superioris & eius termini.

Sphenoidis processus similes alis vespertilionum.

Quintum os maxillæ superioris.

Cur nares sint cartilagineæ.

Terminus ossis quinti.

Vndecimi ossis descriptio.

Vndecimū os aratro simile.

Ossa spongiosa in naso facile eroduntur in morbo gallico.

### De Inferiore maxilla. Cap. IX.

**P**RÆCEDENTI capite maxillam superiorem in animantibus omnibus crocodilo excepto immobilem esse dicebamus; addimusq; inferiorem in homine solam moueri; in Plitaco vtranque. Causa vero, quamobrem hominis, ac brutorum maxillæ figura non eadem sint, ea esse potest: quòd animalia cætera manibus destituta  
 incli-

Epilogus præcedētis capituli.

- Cur brutis fiat ma- inclinari oportebat ad cibum ab humo capiendum: proinde sapien-  
xillæ oblongæ. tiffimus rerum opifex Deus maxillis oblongis, ac prominentibus il-  
la muniuit, quibus manuum vice vterentur. Cæterum homo cum  
manus obtinuerit, quarum opera ori cibum admouere poteſt; bre-  
uiorem, ac pene orbicularem maxillam eſt adeptus; itaq; elegan-  
tiorẽ, venuſtiorẽq;: cui maxillarum figuræ, & elegantię ſimilia  
proxime accedit, quippe quæ non multum ab humana facie recedat,  
cum manibus & ipſa quodam modo vtatur. Verum inferior maxil-  
la ex duriffimo oſſe, magnaq; ex parte pene ſolido conſtare debuit,  
vt validior eſſet, ac varijs, fortiffimisq; motibus in mādendo, mor-  
dendoq; ſufficeret; & in arcum veluti obducta amplum ſinum reli-  
quit, vt leuior fieret, minusq; incommodi mouētibus muſculis præ-  
beret: In hominibus ſimplex, atq; ex vnico oſſe conſtructa, quam-  
uis duplicem eſſe Galenus ſcripſerit, eamq; in ſummo mento laxari.  
Talem fane reperias in canibus, equis, bobus, atque id genus ani-  
malibus, quando longo ductu adhærere poſſunt: Hominis vero ma-  
xillam bipartitam nuſquam reperias. At Galenus hoc, vt alia etiam  
multa, ex ſimilæ ſimulachro in hominem non tranſtulit. Etenim nul-  
lum inuenias diſcrimen inter humanam, ſimilæq; maxillam inferior-  
rem. Verum fane oportet in pueris lineam à ſummo mento proten-  
di, ac mediam quodammodo maxillam ſuperficietenus peruadere,  
quæ non multo poſt tempore cum prorfus aboleatur: Ideo huic ge-  
minum eſſe maxillæ os conijci non poteſt. Hæc autem linea futuræ  
rationem interim habet, dum ex ea producuntur, atque exeunt liga-  
menta, quæ muſculos ibi exiſtentes ingrediuntur. Inferior maxilla  
in duos proceſſus vtrinque deſinit, quorum prior in mucronem ten-  
dit, poſterior vero capitulum, ceruicemq; habet. Acutus proceſ-  
ſus factus eſt, vt excipiat temporalis muſculi tendinem, qui in illum  
validiſſime implantatur. Alter autem, qui oblongo tranſuerſim ca-  
pite donatur, in ſinum ſibi proportionẽ reſpōdentem inferitur: atq;  
ita cum temporum oſſe inter iugalis radicem, auditoriumq; foramen  
articulatur. Hunc ſinum, & capitulum maxillæ proceſſus cartilago  
cruſtæ modo obducit: ſed inter ſinum, ac proceſſus caput interce-  
dit quædam cartilago mollis, & mobilis, quæ non modo ligamēti  
munere fungitur, ad continendum in ſuo ſinu proceſſum: verum  
etiam lubricum magis eius articulationis motum reddit, ac ſimul ef-  
ficat, ne aſiduo motu confricata oſſa vel rumpantur, vel ſaltem atter-  
rantur. hunc ſinum Galenus poſuit ſub mammillari proceſſu, cum  
tamen à mammillari diſtet. Maxilla inferior parte anteriore aſpera  
eſt, atque inæqualis, vt ibi inſerti muſculi tenacius hæreant: ſuaq;  
habet

Cur brutis fiat ma-  
xillæ oblongæ.

Cur homini ſit ro-  
tunda facies.

Similæ facies ſimi-  
lis humanæ.  
Similia manibus v-  
titur.

Maxilla inferior  
cur ex oſſe duro  
conſtat.

Sinus maxillæ in-  
ferioris cur.

Os maxillæ infe-  
rioris nõ eſt duo  
decimum contra  
Galen.

Similæ maxilla in-  
ferior vnico oſſe  
conſtat.

Ex quo cõſecerint  
maxillæ inferioris  
os eſſe biſidũ.

Lineæ in mento  
puerorum vſus.

Proceſſus duo infe-  
rioris maxillæ.

Acuti proceſſus  
vſus.

Alterius proceſ-  
ſus maxillæ infe-  
rioris deſcriptio.

Cartilagine in ſi-  
nu & proceſſu  
ſecundo maxillæ  
inferioris vſus.

Galen. error in ſinu  
maxillæ inf.  
Cur maxilla infe-  
rior ſit aſpera añ



habet foramina, per quæ arteriæ, venæ, ac nervi transmittuntur. de quibus in capite de foraminibus capitis agemus. Præter hæc foramina sunt quamplurimi sinus tanquam alveoli, in quibus dentes infident: ita in maxilla inferiore infixi, quemadmodum in superiore, quos aliquâdo cernimus in seniorum maxillis pene deperditos: cum scilicet erutis, aut delapsis dentibus maxilla ea parte comprimitur, usque adeo ut os ipsum undique cohæreat, constipetur, ac tandem uniatur. Id quod præter cætera mihi obseruare contigit in Vetulæ cuiusdam caluaria, in cuius maxillis vix bini, aut terni dentes prodijisse videbantur: adeo erant oppleta alueolorum vestigia, & in vnum solide coiuerant. Quot autem esse debeant alveoli in vtraque maxilla, sequenti capite de dentibus planum fiet.

Foraminum vsus.

Alueoli dentium.

Quando alueoli dentium in senibus obscurantur.

## De Dentibus, Cap. X.

QUEMADMODUM reliqua ossa omnia minime sentire, ita dentes ipsos sensus participes esse rerum magistra experientia docuit. Vtriusque autem causam perquirentibus facillime constare potest, ex neruorum id propagatione euenire. Etenim molles quosdam, at tenues neruulos à tertia neruorum cerebri coniugatione ad dentes deriuari, ac per ipsorum radices ingredi, liquido apparet, qui cum per interna dentium disseminentur, ita eorum substantiam efficiunt, ut notatu dignam sentiendi facultatem inuehant. Verum ad cætera ossa nulla neruorum portio pertingit per eorum substantiam transfundenda, quanquam per illa nonnunquam, quemadmodum per capitis, ac vertebrarum ossa nervi transeunt, sed aliorum tamen sensum laturi. Quamobrem sensus omnino expertia esse fatendum est. In quo familiaris meus, ac cuius Io. Baptista Mazzolarius, egregius sane iuuenis; moribus ac literis perornatus, vix satis mirari poterat illorum amentiam, qui aut ossa cuncta sentire aiebant, aut ne in dentibus quidem sensum inesse oportere; quos aut sensum negantes indignos penitus iudicabat, qui audirentur: atque ipsis precabatur, quod ipse per multos annos summo cum suo malo expertus fuerat, quâdo à septimo ætatis suæ anno ad vigesimum sextum usque dentium dolore adeo grauiter laborauit, ut cum frustra reliqua medicamenta adhibuisset, ad ignem sæpe confugere sit coactus: addebatq; quod pars illa dentis, quæ extra gingiuas extaret, nihil pene sentiret: pars vero, quæ in alueolis delitesceret, atque à gingiuis tegeretur: acerrimi esset sensus, cum scilicet neruus, neruiq; virtus ad eam usque regionem extenderetur, vbi cavitatis dentis

Dentes sentiunt.

Cur dentes sentiant. Tertiæ coniugationis nervi ad dentes.

Cur ossa non sentiant.

Nervi transeuntes per caluariæ ac vertebrarum ossa aliò sensum deferunt.

Io. Baptistæ Mazzolarij. Cremoenensis opinio quod dentes sentiant experientia confirmata.

Dentis quæ prominet pars non sentit; Sed quæ iacet in alueolis, &amp; cur.

E interna

Probatio quoddē  
tis pars denuda-  
ta gingiuis non  
sentiat.

Gal. dentium do-  
lore laborauit.

Dētium dolorem  
pulsatilem senti-  
ri posse cum Ga-  
leno probatur.

Per arteriam den-  
tes pulsant.  
Dētes semper cre-  
scunt, ossa non  
semper.

Cur exempto dē-  
te, qui illi à re-  
gione respondet  
alios sui ordinis  
excedat.

Dētium numerus  
variat.  
Dentes plurimum  
triginta duo.

Dentium diuiso.

Incisorij dentes, q  
& cur ita dicti.

Canini dētes qui  
& eorum vsus &  
etymologia.

Dentes molares  
quot.

Molarium vsus.

interna desinit, & gingiuarum terminus est. Quod autem pars den-  
tis, quæ nuda cernitur, atque à gingiuis prominet, insensibilis exi-  
stat, ex eo probari potest: quod dentes in ea parte secantur, limis  
atteruntur, æuari, decurtari, ac læuigari solent: nec nō etiam can-  
dentibus ferris vri, & tamen vix sensus indicia deprehenduntur: quā-  
quam ab ijs animus abhorreere videatur, qui aliquam inde læsio-  
nem non potest prima facie non pertimescere. Dentium dolore  
Galenus & ipse vexatus diligentius inuestigās num dentes dolerent:  
non modo eos ipsos dolere, verum etiam pulsare deprehendit: nec  
mehercule iniuria, quando certum est, sicuti ego in publicis disse-  
ctionibus ostendere solitus sum, vnā cum neruo venam, atque arte-  
riam valde exiguas ad singulos dentes perferri: quo factum est, vt  
quemadmodum per neruos sentire dentes cognoscimus: ita quoque  
credamus per arteriam pulsare, & per venam nutriri, vnde alterum  
inter ossa, & dentes non leue descremen habetur, quod scilicet den-  
tes perpetuo aluntur, & augentur; ossa vero alia non secus ac aliq̃  
corporis partes ad statum vsq; annorum numero augentur, ad quem  
vbi deuentum fuerit, protinus consistunt, atq; ab auctione ipsa ces-  
sant. Quamobrem videas dentes exemptis oppositos crescere, &  
alijs, qui in eadem sunt serie, prominentiores, exertosq; magis fieri, 10  
ceteri nanque oppositorum ē regione mutuo congressu, atque at-  
ritu, quantum augentur, tantum pariter imminuuntur, id quod læ-  
uigandis cibis potissimum euenit. Dentes, & si numero euariant,  
cum modo plures, modo pauciores reperiantur: attamen triginta  
duo plurimum sunt, nam sexdecim in vtraque maxilla continentur.  
Atque hi tres in partes diuidi solent, in molares, seu maxillares, ca-  
ninos, atque incisorios; quatuor primi anteriores incisorij dicuntur,  
propterea quod ea figura præditi sunt, vt incidendi munere fungi  
possint: lati enim sunt, & acutam aciem præ se ferunt, vt cibum ob-  
latum cultri modo secant, quod facillime præstant, cum in totidem 30  
sibi aduersos, & ad eundem vsum fabricatos impinguntur, ac com-  
primuntur. iuxta hos molares versus tendentibus canini occurrunt,  
qui vtrinque singuli pares sibi, ac respondentes habēt, ampli ea par-  
te, quæ gingiuis proxima est, in apice vero acuti sunt; vt ad fran-  
gendum quàm maxime idonei reddantur. itaque fit, vt cum inciso-  
rijs aliquid offertur, quod præ eius duritie ab ijs diuidi nequeat: tunc  
caninis traditur ita dictis, quoniam exertis canum dentibus quàm si-  
millimi existunt. Postremo succedunt maxillares quini ab vtroque  
latere tam superioris, quàm inferioris maxillæ, qui & molares nun-  
cupantur, quoniam facti sunt ad terendos, læuigandosq; cibos mo-  
larum



larum exemplo, quibus cereales fruges moluntur. Itaq; ampli duri, magni, atque asperi constructi sunt, alioqui comminuendis cibis ineptiores futuri. Cur enim asperi esse debeant molæ ipsæ satis demonstrant, quæ cum diu molendo asperitatem deposuerint: rursus arte solent exasperari. Iam vero durissimos fore dentes necesse fuit: vt cibis conficiendis sufficerent: neque ab ijs contererentur. ampli quoque, & magni facti sunt: vt diutius, & commodius munus suum obirent. Dentes in maxillis per Gomphosim veluti clauī infixi in-hærent, dentiumq; sinus in maxillis tanquam alueoli interstitijs suis distincti sunt, atque ita præsepiola quædam esse videntur. Ideo Græci *παρνα* dixere. Sciendum insuper est non paribus omnes radicibus implantari: siquidem aliqui vna tantum, aliqui duabus, non nulli tribus, quidam etiam quatuor radicibus inseruntur. Anteriores dentes vt canini, atq; incisorijs vna tantum radice donantur, molares autem pluribus. Verum ex ijs, qui inferioris maxillæ sinibus continentur, binas, qui in superioris ternas radices, possident. Nonnunquam etiam videre est & inferiores, tribus, & superiores quatuor radicibus donatos: sed id rarissimum est. Ad hæc quandoque inuenias molares duos superiores canino denti proximos ex binis radicibus constare: Inferiores autem illis vtique ipsis respondentibus singulis. Ex quibus varietatum formis in vniuersum percipito molares inferiores vna semper radice à superioribus sibi oppositis superari; radicesq; ipsas inferioribus breuiores esse: superioribus autem longiores, neque id sine consilio. Quædo quæ pendent, cum facilius labi, ac discuti possint, quàm quæ in imo quasi solo insident: iccirco illa tenacius, atque altius infigi debent, vt firmitus, validiusq; hæreant. Obseruatu quoque dignum est, intimos, atque omnium postremos maxillares breuissimas radices obtinere, tum quia minimum cæterorum in læuigandis cibis exerceantur. Adde etiam quoniam illa maxillæ portio profundiorē insertionem non admittit. Hos genuinos appellari libuit, qui plerunque in causa sunt, cur varius dentium numerus habeatur: modo enim vno super addito triginta tres constituuntur: sicuti mihi sæpe videre contigit in viro quodam nobilissimo; modo duobus detractis, aut vno, numerum decrescere, in aliquibus etiam viginti octo, quod minimum est, inuenti sunt. licet ego obseruauerim Nicolaum Ardinghellum Cardinalem, quem honoris causa nomino, in ore sex tantum supra viginti dentes habere, neque tamen vllus desiderabatur. Præterea animaduertendum est dentium radices omnes esse perforatas, quæ foramina deducuntur ad ipsorum cavitates, quas intus habent; exi-

Cur molares asperi.

Cur dentes durissimi.

Cur molares magni.  
Dentes articulantur maxillis per Gomphosim.

*παρνα* quid græci vocent.  
De dentium radicibus.

Caninis & incisorijs radix vna.  
Molares dentes maxillæ inferioris habent plures radices quàm superiores.

Dentes superiores quatuor radicibus præditos videre rarum est.

Cur radices dentium maxillæ superioris sint longiores.

Molaribus postremis breuissima radix & cur.

Molares postremi à pubertate enasci solent.

Molares postremi genuini dicuntur

Dentes quandoq; triginta tres.

Dentes viginti octo.  
Cardinalis Ardinghelli dentes viginti sex.

Radices dentium perforatæ.

Vfus foraminis ra-  
dicis dentium.

Membranula ex  
vafis in radicem  
dentium.

Cur dolores vehe-  
mentiffimi fint  
quandoq; in den-  
tibus.

Dentes in matris  
aluo gigni, licet  
non prodeant.

Dentes in vtero  
matris gigni.

Dentes habent ap-  
pendices quæ de-  
cidunt.

Molarium appen-  
dix non decidit  
frequenter.

Radix dentium in  
pueris nõ exime-  
da.

Radice dentium  
euulfa raro emer-  
gunt denuo.

Phœbus filius ha-  
bet triplicem or-  
dinem dentium.  
Phœbus puer rar.

guas quidem, verum notatu dignas, vt fcilicet leuiores fint, & com-  
modius nutrimentum fumant. Admittunt autem foramina hæc ve-  
nam arteriam, & neruum, de quibus fupra dictum eft. Quæ tria  
vafa ad cauitatem illam, vfque ad dentis bafim penetrant, ibi com-  
plicantur, & ex fe membranulam quandam gignunt, quæ imbibi  
nonnunquam folet materia à cerebro defluente, vnde pariuntur do-  
lores illi ingentiffimi, qui perfeuerant, quoufq; humor in membra-  
nula detinetur, vel purgato cerebro fluxionis caufa tollatur. Quod  
autem ad dentium generationem attinet: fcito non paucos putare  
eos tunc gigni, cum ex gingiuis prodeunt, qui manifefte errant. 10  
Nam dentes in ipfo matris vtero efformari certo comperi, fi cuti ego  
perfpæce oftendi magna astantium admiratione, dum ex demortuo-  
rum infantium in matris aluo gingiuis ex fuis alueolis perexiguos  
dentes eruere. Idem in nuper natis, quod in extractis ex vtero,  
atque etiam in abortibus feptem & octo menfium explorare mihi li-  
cuit. Ea autem diligentia rem hanc perquifui, quod de his pleriq;  
ne verbum quidem; re nondum illis fortaffe cognita, aut perquifita.  
Puerorum dentes appendices habet, quæ temporis proceffu, quan-  
quam non omnes, laxari, ac vacillare folent: itaque vel fponte deci-  
dunt, vel vnguibus, aut filo non difficili negotio eximuntur. quæ 20  
autem manent, vt in molaribus frequenter accidit, ita cum dentibus  
committuntur, atque coherent; vt ipforum partes efle videantur,  
nec ita facile demi poffint. Demptra itaque appendice cum feruata  
fit radix: non mirum eft, fi non multo poft tempore dens denuo cre-  
fcit, & deperditæ appendicis locum occupat. Quamobrem cauend-  
um eft, ne cum pueris dentes cafu, aut aliquo icu effranguntur,  
quæ reliqua fit portio eruatur. Sed accuratiffime radix ipfa, quoad  
eius fieri poteft, feruari debet. In ea enim veluti in femine quodam,  
ipfius dentis regenerandi fpes refidet, eaque radicitus euulfa dentes  
non amplius vel rariffime renafcuntur. Dentes humani ordinem 30  
vnicum feruant, etfi aliquando duplex ordo inueniatur. licet raro in  
hominibus, triplex tamen in puero meo Phœbo confpiciuus, qui  
rarus eft, quemadmodum & ipfe rarus eft ordo.

### De Capitis Foraminibus.

### Cap. XI.

Gal. non fcripfit  
quod extet de fo-  
raminibus cap.

**D**E foraminibus capitis acturi Galeno duce vti non poffumus:  
Nam cum in libello de ofibus tractationem hanc confulto præ-  
termiffet: deq; huiusmodi foraminibus in libro de neruorum, ac  
reliquorum vaforum diffectione acturum polliceatur: in libello de  
neruorum



neruorum anatome, qui Galeni nomine circumfertur, nihil de his scriptum reperitur. Quamobrem hic foraminum descriptionem cum Vessalio instituemus, vt cum hæc ipsa fuerint explicata, faciliorem nobis viam relinquant ad ea scribenda, quæ tradere opus fuerit de venis scilicet & arterijs, ac neruis per caput ipsum meantibus. Cum igitur natura reliquarum corporis partium gratia ossa construxerit, sicuti primo capite adnotatum fuit: ita illa efformauit, vt non modo illis adhærescere partes aliæ, verum etiam per eadem sine læsione transire possent. Iccirco ossa tanquam infimas nostri corporis partes alijs cedere necesse fuit, alioqui sua duritie multa incommoda allatura. & quod proposito nostro nunc deseruit, vasis transmittendis perforata sunt, ac præcipue ossa, quæ vndique foraminibus scatent: per quæ tum nerui à cerebro demittuntur, tum venæ, atque arteriæ fursum feruntur ad cerebrum, partesq; alias in capite positas. ea primum commemorabimus, quæ septem neruorum coniugationibus famulantur: quarum coniugationum cum nobilissima illa sit, quæ optios constituit: nõ immerito ab eius foraminibus exordiemur. In interna itaque caluariæ sede, quæ cerebri est basis, vbi exculptum est os cuneale in sellæ modum iuxta processus ipsi sellæ supereminentes: adsunt duo foramina in eodem cuneali, dextrum scilicet ac sinistrum, rotunda, & in oculorum sedem tendentia, quæ ad ipsorum radicem iuxta latus interni anguli penetrant: ibiq; oculi orbitam introspectanti primo occurrent. Per hoc foramen à cerebro neruus insignis emanat, & in medium oculum radices instar implantatur opticus, & visorius appellatus: siquidem ad oculum ipsum virtutem visilem deferit. Post hæc ad fines dictorum sinus est semicircularis perfectum aliquando orbem efficiens, per quem fertur secunda neruorum coniugatio. Atque inde per magnam rimam, quæ mox describetur: in oculos deducitur ad motum ipsorum musculus largiendum. Rima vero hæc ea est, quæ in ima oculi orbita aperte perspicitur: ac versus externi anguli regionem inferne foraminis rotundi formam imitatur, quod tamen superiore parte effractum in longam, amplamq; cavitatem extenditur, vt non solum aditum præbeat secundæ neruorum coniugationi, quæ per oculorum musculos dispergitur ad ciendum motum: sed etiam alijs neruorum ramulis, qui à tertia proueniunt, & ad faciem per id foramen exeunt, quod est in supercilijs supra internum oculi angulum. Itemq; rima hæc musculis oculorum cedit, qui inde ortum ducunt, ac demum admittit & venas, & arterias transmissas ad oculos, oculorumq; musculos enutriendos, & fouendos. In hac itidem ampla rima parte inferiore,

vbioro-

Ex hoc posset aliquis conijcere de neruorum dissectione librũ nõ esse Gal.

Vess. scripsit de foraminib. capitis. Tractatio de foraminibus capitis quàm sit utilis. Ossa sunt facta gratia aliarum partium.

Ossa sunt partes ignobiliores.

Ossa cur perforata. Foraminum ossũ vñus.

Prima neruorum coniugatio oculis deseruit.

De foraminibus seruientibus primæ coniugationi neruorum. Sphenoides instar sellæ in basi capitis exculptum.

Foramen neruorũ opticorum.

Opticus neruus cur dicatur.

De foraminibus deseruientibus secundæ coniugationi neruorum. Secunda coniugatio neruorũ mouet musculos oculorum.

Rimæ magnæ in ima orbita descriptio & vñus.

Ramuli à tertia coniugatione.

Foram. quod est in supercilijs vñus. Oculorũ musculi vnde ortũ ducũt

vbi rotunda est: versus internū angulum latitat foramen, quod cæco quasi ductu ad palatum, naresq; tendit, per idq; à cerebro per glandem suscepta pituita naturaliter ad ipsas nares, atque ad palatum descendit. Et quoniam pituita hæc in rimam illam prius decidit, quæ ad oculos pertinet: hinc fortassis via est gignendis lachrymis, cum scilicet fluidus ille humor excernitur in oculos emanans, & ab oculis post modum in genas delabitur. sub eadem rima in decliuore sphenoide regione modico interuallo discernitur foramen in vtraq; parte, vbi à sella declius fit recessus, quod orbiculare est, ac longiusculum, idq; in oculi sedem recta tendere videtur: sed tamen flectitur 10  
ad latera, vbi temporalis est musculus, ac masseteris ortus, quando per hoc foramen ramus octauæ neruorum coniugationis ad hos ipsos musculos transit: quem pariter comitatur tertiæ coniugationis ramus, qui & ad faciem per oculos parte inferiore fertur, & cum musculus temporum, atque etiam cum massetere permiscetur. In ipso met sphenoide aliud est foramen, quod ad extremitatem alarum vesperilionis pertinet, pene ouale: per id portio tertij neruorum paris ad dentes transmittitur: atque etiam cum temporali musculo miscetur; per idem foramen, vna cum illa portione quarta neruorum coniugatio cum ad palati tunicam, tum etiam ad superiorem linguæ partem gustus gratia demittitur. Iuxta foramen iam commemoratum 20  
ad radicem temporis osis, quod iugi modo eminere diximus auricularis labyrinthi efformandi gratia, aliud residet maius quidem, sed perfractum, atque inæquale recta deorsum tendens, per quod tertie neruorum coniugationis portio permeat, quodq; non minus patet iugularis venæ ramulo ad partes anteriores repenti. At vbi à superiore foramine paululum versus temporis os recesseris, tibi occurret foraminulum, quod propter sui paruitatem in nonnullis caluarijs, vel altera saltem parte deficit, peruium exiguæ arteriolæ, & venulæ per crassam menyngem disseminandæ. verum vbi obturatum est, ac 30  
prorsus deletum, arteriola hæc, & vena viam sibi struit per foramen amplum, & inæquale, quod paulo ante descriptum est. Non procul ab amplo illo foramine aliud videre est interna caluariæ parte vix conspicuum, ac rotunda tamen cavitare, oblongaq; in supra dictum foramen desinente notatur, & sub interiore styloidis radice insigniter apparet: obliquum versus anteriora ductum præ se ferens, qualis debebat esse soporalis arteriolæ progressus, cui foramen id natura parauerat. In eodem temporis offe, quia occipitium versus declinat, foramen inest; quod in superficie oblongum, ac veluti ouale visitur cæco ductu in labyrinthum: ac demum ad extremam auris regionem

Quomodo gignatur lachryma.

Foramen in sphenoide.

Masseteris ortus vbi.

Ramus octauæ coniugationis ad musculos masseteras.

Ramus tertiæ coniugationis ad faciem per oculos.

Foramen aliud in sphenoide.

Ramus tertiæ coniugationis ad dentes & musc. temp.

Quarta coniugatio neruorum ad palati tunicam & supremam partem linguæ.

Foramen tertiæ neruorum coniugationis & iugularis arterie anterioris ramo seruatis.

Foramen paruum quod quadoque deletur.

Vide Naturæ industriam.

Foramen soporalis arterie.

Foramen cæcum.



regionem finitur, iccirco cæcum appellatum, aditum præstat quinto nervorum pari facultatem sensificam auditus organo suggerenti: sub quo foramine inter os temporis, atq; occipitium abrupta sedes conspicitur magnum item, & inæquale foramen constituens, per quod deducitur sextum nervorum coniugium, qui ad viscera tendunt, atque interim recurrentes cognominatos efficiunt, vnde formandæ vocis virtus pene omnis depromitur. hoc itidem foramen internæ iugulari venæ famulantur, dum per idem ingressa ad vniuersam cerebri molem enutricandam cōscendit, simulq; menyngi crassæ infidet gemino sinu euecta, ac deniq; in partem posteriorem delabitur, osse illi plurimum cedente, in eo siquidem profunda est cavi-  
 10 tas in hanc formam  $\cup$  curuata versus labdalem occipitis futuram. In occipitis osse prope foramen omnium internorum capitis maximum vnum adest, haud amplum oblique ad interiora vergens, per quod defertur septima nervorum coniugatio, quorum partem laryngis, & linguæ, parte temporum muscoli sibi vendicant. In eodem occipitis osse inest foramen illud, quod paulo ante diximus interna omnia capitis foramina magnitudine superare, cum tamen externa oculorum orbita sit minus capax, quod cum sit sine pari mediâ  
 20 occipitis regionem occupauit: spinaliq; medullæ à cerebro defluenti destinatum fuit. Ex reliquis foraminibus in anterioribus spatijs primum illud est, quod cum vnicum, paruumq; sit neque admodum penetrans, sinus fortasse potiusquam foramen dici debet: inter os frontis, ac medium ithmoidis interuallum iacet, quo terminatur, ac pertinacius incumbit tertius duræ cerebri membranæ sinus, de quo alias dicetur. In ithmoide ad vtrumq; dicti interualliatus iuxta frontis os assident duo longiuscula foramina rimulæ speciem referentia, quæ odoratus organorum terminis opplentur. Cæterum ithmoides quamplurimis foraminulis in cribri morem effingitur, quæ odorum  
 30 ne, an aeris, an superfluitatum causa facta sint, non est nostri instituti disputare. sed vbi opus fuerit, non prætermitemus. In osse frontis in regione superciliorum duo foramina vtriq; vnum, per quod tertiæ portio nervorum coniugationis ad musculos frontis, & palpebrarum disseminatur. Foramina hæc tamen semper sunt orbicularia, sed aliquando sunt media, ac si quis vngues in ceram immitteret, detraheretq;. Media fronte supra nasi summitatem eo nempe spatio, vbi spongiosum interstitium gemina caluariæ tabula disiungitur, cavitates reperiuntur, quæ in nares penetrât antiquis (vt opinor) prorsus ignoratæ, illæq; nunc binæ, nunc ternæ, in quibus cum nihil vnquam præter membranam repperim, licet aliquândo & muc-

Quinta nervorum coniugatio sensum auditus organo deferuit.

Sexta coniugatio ad viscera. Quintum par nervorum efficit nervos recurrentes. Nervi reuerſui formant vocem. Iugularis interna vniuersum cerebrum enutrit. Vbi cedat os cranei crassæ menyngi.

Septima coniugatio nervorum per quod foramen feratur. Septimæ coniugationis nervorum Foraminis in occipite max. vsus.

Vsus foraminis inter os frontis & ithmoidis.

Ithmoidis foramina.

Ithmoidis figura.

Tertiæ coniugationis portio ad musculos frontis & palpebrarum.

Cavitates in fronte a veteribus ignoratæ.

In cavitatibus me-

CUS RE-

diæ frõctis pluri-  
mū aer solus quā  
doq; mucus repe-  
ritur.  
Foramina ossis  
malæ.

Tertiæ coniuga-  
tionis portio ad  
nafi musculos &  
labri.

Vnde humiditas  
ad nares & oculo-  
los descendit.  
Glandula excipiens  
humiditatē oculo-  
lorum.  
Gal. error.

Locus in quo ægi-  
lops nascitur.

Cur oculo labo-  
rante afficiatur  
musculus tempo-  
ralis.

Orbita oculorum  
sedes.

Nafi foramina.  
Iugale instar pōtis

Temporis muscu-  
lorum sedes.  
Palati foramina.

Quā descēdat pi-  
tuita ad humectā-  
dam membranā  
palati.

Quartæ coniuga-  
tionis portio tuni-  
cā palatigustā-  
di sensu donat.  
Foramen maxillæ

cus reperiatur, aerem tantum per nares attractum detineri existima-  
ui, de cuius usu quid sentiamus alibi planum fiet. Os malæ,

quod tertium diximus, sub regione inferiorum palpebrarum, qua-  
tenus in genas delabitur, foramen habet rotundum, quod ab inter-  
na, inferioreq; parte orbitæ oculorum principium sumit ex rima lon-  
ga, profundaq; in foramen ipsum desinente è regione primi molaris  
dentis. per id transmittitur tertiæ neruorum coniugationis portio,

quæ ad nafi musculos, & ad eos pariter, qui labrum constituunt de-  
fertur. In oculorum angulo maiore parte inferiore, quæ inter tertiū  
foramen, cui sinum facit secundum os, vt illi quodammodo cedere

videatur. hinc descendit ad nares humida materia internam oculo-  
rum partem obsidens, cui excipiendæ præsto est glandula quædam  
instar spongiæ ad ipsum foramen assidens. Vnde Galenus falso ar-  
bitratus est medicamenta oculis apposita, tum in nares, tum in pa-  
latum defluere, vt supra attigimus, vbi de maxillæ superioris ossi-

bus loqueremur. Hoc loco ægilops gigni solet, quam lachrymalem  
fistulam Latini vocarunt. Verum in exteriore angulo, qui minor di-  
citur, parte item inferiore ampla rima sita est, quæ partem ossis tem-

porum, partem etiam maxillæ superioris perforat, cui adfigitur tem-  
poralis musculus, qui cum maximam cum oculo affinitatem habeat, 20  
non mirum est, si laborante oculo temporalis iste musculus sæpe af-  
ficiatur, quemadmodum crebro experti sumus, cum ratione expe-  
rientiam coniungentes. Faciei foraminibus si oculorum sedes, orbi-

tas dictas annumerare libeat, scito illas temporum, frontis, maxil-  
læq; superioris osse conflatas. Inter eas si descenderis, duo reperies  
nafi foramina ad palati fines, & ad fauces penetrantia. Iugale etiam  
os ex duobus veluti ossium processibus pontis instar constitutum,

magnum foramen, oblongumq; efficit, in quo temporalis ipse mu-  
sculus residet. In anteriore palati regione inter incisivos dentes 30

medium est foramen, per quod vena, arteriaq; pertransit: & descē-  
dit pituita ad humectandam palati membranam, quæ in eo ipso fo-  
ramine illigatur, non secusq; duram cerebri membranam paulo su-  
pra ithmoidis interstitium foramini modico innecti dixerimus. In  
extremo palato non procul à postremis dentibus vtrinque foramen  
videre est in eo quinto osse, quod quartum maxillæ superioris feci-

mus. Id autem foramen in geminos, acutosq; angulos producitur:  
admittit cum venulam, atque arteriolam, tum vero quartæ neruo-  
rum coniugationis portionem, qua palati tunica gustandi sensu  
particeps redditur. Inferior maxilla binis vtrinque foraminibus  
donatur



donatur, totidem intus, quot extra: verum interna foramina maiora multo sunt externis, per quæ vena, arteria, nervus demittuntur ad singulas dentium radices nutrimentum, vitam, sensumq; illis adferentes, vt supra Cap. De Dentibus memorauimus. Nervi tamen eiusdem portio extra mentum egreditur, & ad musculos inferioris labri permeat, cui aditum præbent bina illa foramina externa iuxta circularia. In capitis basi, in ea temporum ossis parte, quæ cuneiformi proxima est, datur geminum foramen, vnde quintæ nervorum coniugationis portio ad temporalem musculum transmittitur. ad posteriorem styloidis processus radicem, quæ os mammillare respicit, foramen intueberis, per quod vena, & arteria antrum ingreditur ad auditus organum enutriendum. Iuxta processum mammillarem parte posteriore aliud foramen est aditum venæ, & arteriæ præbens ossa nutriendi gratia. Tam superiori, quàm inferiori maxillæ insunt foramina multa, quæ præsepulchris alias comparamus, in quibus dentes fixi sunt, quæ non solum dentium numero respondent, verum etiam pro eorundem radicum diuersitate variant. Ideo certus eorum numerus vix assignari potest. Habes insigniora foramina capitis: alia vero per quæ venulæ, atque arteriæ ad internam ossium capacitatem, & ad membranâ crassam pertranseunt: quoniam neque firmam sedem habent, neque ordinem vllum obseruant: minime digna nobis visa sunt, quæ describerentur. aliquando nonnulla reperies, quæ à latere ad latus perforant ossa sincipitis.

inferioris.

Ad. singulas radices dentium fertur vena, arteria & nervus.

Quintæ nervorum coniugationis portio ad musculum temporalem.

Alueoli dentium respondent numero radicum numero.

Quæ foramina neque sedem neque numerum seruent.

Quædam foramina os sincipitis penetrant.

## De Osse Hyoide. Cap. XII.

SATIS constare arbitror ob hanc præcipue causam genita fuisse ossa, vt super his muscoli consistere possent. Quamobrem cum in ore linguam natura formasset organum apprimè necessarium tum voci articulandæ, tum alijs quoque functionibus, opus erat os aliquod parare, in quod ea commode infereretur. nam cum sit corpus molle, facile concideret, nisi ab aliquo duro, stabiliq; sustineretur. Proinde os conditum est, quod linguæ peculiare esset, illiq; vni deferuiet, quando non potuit neque in occiput, neq; ad dorsum, neque ad latera vtriusq; maxillæ implantari, quin aut fauces tegetet, impediretq;: aut certe magnam suarum utilitatum partem amitteret. Hyoides id Latini cum Græcis appellant: idq; voce contractiore, *ὑποειδὲς* siquidem dicendum esset, quod *ὑλον* literæ formam exprimat. à nonnullis quoque vocatum est *λαβδονειδὲς*, sed

Ossium vsus.

Lingua voci articulandæ præcipue utilis.

Hyoides os linguæ peculiare. Causa situs hyoidis.

Hyoides os & hypsiloides & labdotides idem.

*ὑποειδὲς* rectius

F quo-

dicitur os linguæ  
quàm labdoides.  
Offis hyoidis cum  
maxillæ inferioris.  
figura collatio.

Cur ea contigerit  
figura offi hyoidi.

Hyoidis offis descriptio.

Epiglottis cur ita  
dicitur.

Musculi linguam  
mouentes vnde  
orientantur.

Cur hyoides habeat  
plures processus.

Quomodo hyoides  
ligetur styloidi.

Hyoides ex quinque  
processibus.  
Sagacitas Naturæ  
deficientibus processibus  
hyoidis.

Gal. in lib. de offibus  
non describit os hyoides.

quoniam vbi conuinctum est, ac finem facit, non ita acuto angulo terminatur, rectius illud v figura quàm x simile dicemus. quòd si quis os istud maxillæ inferioris imagini comparare velit, non male fortasse fecerit, cum non modo in arcum eiusdem maxillæ more curuetur, verum etiam in duos, sicuti illa, processus desinat: quàmquam hi non omnino eandem cum illis speciem seruent. Hyoides os ita hac figura fuit à natura exculptum, vt quamuis faucibus, ac laryngi præpositum esset, liberum tamen cum inspirationi, tum etiam cibo, potuiq; transitum relinqueret. Quocirca medium ipsius ossiculum aliud maius anteriore parte, quàm os respicit connexum est: & in valde obtusum angulum coit: posteriore autem, quæ interna magis, & ad fauces vergit, concavum, superiore item gibbum, inferiore vero finem. pars anterior, ac superior linguæ insertionem suscipit ex duobus musculis constructam, quorum discrimen exiguum quodam processu terminatur, qui in superiore huius ossis regione ad flexionis medium eminet: at posterior inferiorq; eiusdem ossiculi portio caua, & in finem adducta fuit, vt cederet aperiendi, ac sese attollenti linguæ, quæ tanquam claustrum laryngi supereminet, atq; ob id Epiglottis græce est appellata. ad laterum fines huius medij ossiculi duo alia committuntur in duos longiusculos processus diducta, qui extremas appendices habent, atque ij cum superioribus laryngis lateribus suis ligamentis innectuntur. ab horum processuum appendicibus nasci solent musculi, qui linguæ motibus deseruiunt, quemadmodum in libro de muscui lis dicitur. Iam vero cum os istud veluti pensile existat, satis firmitudinis, ac roboris habiturum non erat, si vnâ tantum, quam diximus, in ipsam laryngem insertionem habuisset. Ideo natura duos alios eidem ossi processus addidit: non ita prolixos tamen, vt qui iam descripti sunt: iuxta quos hi pariter exurgunt: at superiore parte, qua maius ossiculum, quod in medio situm est, hinc inde terminatur, nam per hos processus os hyoides processui stylium referenti, qui temporum ossi vtrinq; affigitur, insigni ligamento connectitur, atque ita firmat vt in medio facile consistat, ac neutram in partem distrahatur. ad hunc itaq; modum ex quinque ossibus hyoides constructum habes, quod tamen aliquando priuatum inuenies processibus: nunc vero altero tantum, quorum locum tunc subeunt ligamenta longius à medij ossiculi finibus ad processus styliformes prætensa. & hæc de Hyoide sat sint, quod in libello de ossibus missum fecit Galenus, forte eius descriptionem parùm necessariam arbitratus. Nihil igitur mirum est, si quidam de hoc ipso



ipſo nihil meminerit, quem ſicuti certo affirmare auſim cuncta, quæ de Anatome ſcripſit, ex Galeno tranſtuliffe : ita dubito nunquam humanum corpus ſecuiſſe, aut aliorum ſectionibus minime interfuiſſe. Galenus tamen de Hyoide lib. xi. de Partium Uſu nõ nihil meminit. huius dicta excipiens Oribafius ſuo de oſibus libello in proprium caput redegit.

Gal. xi. de Uſu  
Part. meminit de  
hyoide.  
Oribafius caput  
habet de hyoide.

## De Larynge. Cap. XIII.

- 10 **S**CIO non paucos admiraturos, quòd in hoc libro, ubi de oſibus duntaxat agere inſtituimus, laryngis explicationem interſeramus : de qua in tractatu de cartilaginibus cæteri Anatomici meminere, à quibus veluti cartilagineum corpus deſcribi ſolet. Ego vero cum in his anatomicis nomen meum profitear, qui in nullius placitum iurauerunt, licere mihi arbitror, meam, quæcunque fuerit, ſententiam in medium proferre ; vt vobis cum re ipſa licebit cõferre. Cũ igitur ex innumeris propemodum ſectionibus obſeruauerim humanam laryngem in prouectioris ætatis corporibus oſſeam eſſe, non cartilagineam : Quanquam à teneris annis cum nõdum ad ſuam duritiem, ſoliditatemq; redacta eſt, ex cartilaginea ſubſtantia conſtructa eſſe videatur ; non poſſum non opinari eam magis ex oſſea natura, quàm ex cartilaginea conſtare. Hoc igitur in cauſa fuit, quamobrem in oſſium numero laryngem adiudicantes de illa in oſſium tractatu agamus. Vt igitur alios nunc omittam anatomicos, ac de Galeno, & Veſſalio tantum dicam, ambo ſunt accuſandi : Galenus quidem primo : quòd neglecto humano corpore ſimias diſſecandas curauerit : Deinde quòd vel in ſimijs ipſis laryngis ſubſtantiam oſſeam prorfus non animaduernerit. Veſſalius autem, quòd in humanorum corporum ſectionem proſiteretur, non humanam tamen laryngem, ſed bruti ſecare ſemper ſolitus eſt. idq; publicis theatris, quibus ego perſæpe interfui. Nos igitur laryngem inter oſſa connumerantes dicimus eam eſſe aſperæ arteriæ caput, quod ad os, atq; ad fauces pertingit, in cuius poſtremam ſuperficiem præcedenti capite diximus Hyoides os duobus proceſſibus oblongis implantari, atque ita cum larynge ipſa committi. organum eſt, per quod ſpiritum admittimus, ac eundem reddimus, nec non etiam vocis formandæ, quemadmodum ex eius deſcriptione pateſcet, quam licet oſſeam dixerimus, ad eius tamen compoſitionem concurrunt non oſſa tantum, verum etiam cartilagines, ligamenta, muſculi, ac membranæ : vt interim miſſas
- F 2 faciam

Cur in Tractatu  
de oſſibus tractetur  
de larynge.  
Anatomici complures  
deſcribunt laryngem  
tãquam corpus cartilagi-  
neum.

Larynx hominis  
ſenis oſſea eſt.

Larynx in tenella  
ætate cartilago  
videtur.

Gal. reprehendiſt.

Gal. ſimias ſecuit  
non homines.  
Larynx ſimiaz oſſea  
eſt.

Veſſalius ſecabat  
laryngem bruti  
non hominis.

Laryngis deſcriptio.  
Larynx oſſea eſt.  
Larynx eſt caput  
tracheæ.  
Laryngis ſitus.

Laryngis uſus.

Quot cõcurrant ad  
laryngem cõponendam.

faciam veñas, arterias, & nervos. Caterum ossa, ex quibus larynx præcipue conficitur, quinque sunt, ex quibus duo maxima corpus fere ipsius laryngis constituunt. Parte posteriore late disiuncta sunt, anteriore vero testudinis ritu per acutum angulum uniuntur, cuius imaginem scuto, quod fortasse veteres in prælijs gestabant, assimilantes anatomici scutiformen cartilaginem, siue scutalem, siue peltalem, Græce *Δυπεροειδῆ* vocarunt. Eius posterior pars supra, infraq; processus habet, quos ex suis vtrinque lateribus singulos educit superioribus processibus, qui inferioribus longiores esse solent. Primi committuntur hyoidis processus, ac membraneis vinculis inuicem firmantur. Inferiores autem scutiformis processus posterioribus lateribus eius nempe partis, quam reliqui secundam cartilaginem innominatam appellant, nos vero tertium os innominatum facimus, cuius forma circularis est similitudine referens illos Parthorum anulos, quibus pollicem muniunt, vt validius sagittas eiaculentur. nam parte posteriore gulam, seu stomachum spectante latius est, & in acutum spinæ modo extenditur. Deinde quo magis ad anteriora pergit, magis extenuatur, donec quam diximus figuram effingat. Vndequa; teres est, nec vllam asperitatem præfert, præterquam quod posteriorius nonnihil eminet: vt duorum ibi existentium musculorum insertioni subseruiat, qui ab hoc tertio osse in quartum, ac quintum recto ductu feruntur, vt in libro de Musculis docebimus. Id autem os perfecte circulare natura fabricauit: vt esset basis, ac firmamentum laryngis, nec nõ etiam quoddam asperæ arteriæ propugnaculum, cuius est initium: nam nisi interna parte coalesceret, neque ea duritie præditum foret, periculum immineret, ne deglutiendo re aliqua crassa, vel dura, arctius respirationis via comprimeretur, vnde fieret suffocatio. Vndiq; igitur continuum os istud factum est: vt asperam arteriam validius tueretur. Quartum, quintumq; os laryngis nobis erit, quod alij vnam, ac tertiam cartilaginem numerarunt: nam si partem hanc membranis, quibus obtegatur, liberatam sedulo intueberis: & laxari deprehendes, & in duo diductâ cognosces. Quamobrem visum est nobis in duo partem hanc ossa distinguere, quæ ab apice tertij ossis intro spectantis exurgunt. Huic enim tuberculo inarticulantur, atque inde à sua basi duas veluti pinnas emittunt, quæ ad imam scutiformis regionem parte anteriore copulantur, ac rimam constituunt modulandæ voci quam maxime accommodatam; sursum vero in duos processus tendunt, qui mutuo dexter cum sinistro uniuntur, & vasis cuiusdâ imaginem præ se ferunt, quo

Ossa laryngis quæque.

Scutalis cartilago ab Anatomicis dicta quæ pars sit laryngis.

Quomodo processus hyoidis & laryngis committantur.

Tertium os innominatum quod alij secundam cartilaginem innominatam appellant. Tertij ossis innominati figura.

Asperitas in osse pro infertione musculorum.

Cur tertij os circulare.

Quartum & quintum os laryngis appellatur tertia cartilago ab alijs & cur.

Rima qua vox modulatur.



- quo abluendis manibus aquam affundimus. Iccirco græci partem hanc laryngis *ἀρύταινον*, & *ἀρυταινοειδῆ* vocarunt. Hæc duo ossicula inæqualia sunt, atque inuicem per ligamentum, ac per cartilaginem vniuntur: & supernæ membranæ ibi copiosissime assidentis beneficio molliuscula esse videtur, vbi in duos processus definunt, quibus scilicet natura veluti lingulis quibusdam vti voluit non modo ad claudendum laryngis amplitudinem, & asperæ arteriæ meatum, ne quid, ex vomitu præsertim, quod lædat in internam illius capacitatem decidat, atque ad pulmones deferatur: sed etiā vt rimam illam moderetur variarum vocum efformandarum gratia, non secus atque in fistulis, aut tibijs lingulæ quædam imponi solent, ex duabus arundinum laminis compactæ. Propterea istorum processuum id genus lingulam constituentium vno *Γλωττίς* nuncupatur. Quod autem ossa hæc sint, quæ hætenus exposuimus, non diu anceps ille fuerit, qui eorum ipsorum colorem, duritiemq; considerat: ac præterea medullosam substantiam conspexerit, qualem ego sæpenumero deprehendi, quo vno potissimum cartilagine ab ossibus differunt. Siquidem cartilago omnis ex omnium sententia medulla penitus caret. Ad hæc succedit cartilago vna, propterea illa quoq; explicabitur. Hanc *ἐπιγλωττίδα* græci vocāt, quod lingulæ modo enarratæ superemineat, atque operculi vicem gerat, ne quid cibi, potiusue in laryngem defluat, nec non etiam vicissim clauditur, ac reseratur ob mutuam inspirationis, & expirationis operam. Hæc modice curuati scuticuli formam imitatur, superiore parte ampla est, ac sensim arcatur in mucronem definens, quo anteriori, ac superiori scutiformis parti, vnde ortum habet, inferi videtur. Reliquum esset, vt describerem, quibus membranis, & quomodo larynx intus, forisq; inuestiatur: ac præterea quot, quæue sint musculi motum hisce ossibus largientes: verum ne doctrinæ ordo inturbetur, congrue magis alibi hæc declarabuntur.

Quid significet  
*ἀρυταινοειδῆ*.

Duorū processuū  
quarti & quinti  
ossis laryngis v-  
sus.

*Γλωττίς* qd vocet.

Quomodo ossa es-  
se nō cartilaginea  
Quæ laryngem cō-  
stituunt cogno-  
scat.

Differentia præci-  
pua ossis & car-  
tilaginis.

*ἐπιγλωττίς* quid si-  
gnificet.  
Epiglottidis vsus.

Epiglottidis figu-  
ra.

Cur de membra-  
nis & musculis la-  
ringis nunc non  
doceatur.

De Dorso in vniuersum.

Cap. XIIII.

**N**IHIL in vniuersi corporis humani fabrica, quo ad ossa pertinet, magis quàm dorsi contextus admirabilis parentis nostræ industriam attestatur, in quo vix satis mirari possumus quàm incredibili vsa sit artificio, vbi tot vertebrarum situm, varietatem, ordinemq; intuemur, quarum compositio instar carinæ cuiusdam esse videtur. Etenim si oculos in nascentis navis exordium conieceris, facillime percipies, cum navis fundo recte dorsum comparari posse, ad

Dorsi structura ad  
miratu digna.

Vertebrarum com-  
positio instar ca-  
rinæ.

- Dorsum dat robur corpori. se, ad quod ipsæ costæ veluti curuatæ trabes affixæ adhærescant : atque ita corpus efficiant . quo fit, vt dorso corporis ipsius stabilitum, & robur non immerito tribuatur. Dorsum autem totâ regionem interim nobis significet, quæ à basi occipitis vîq; ad extremum coccygem pertingit, quæque triginta quatuor vertebriis perficitur. Vertebrae vero siue spondyli nobis erunt ossa quædam egregia, formæ varietate distincta, ex quibus tanquam partibus dorsum conflatur, quemadmodum infra plenius demonstrabitur.
- Dorsum hominis describitur. Dorsus vîsus. Dorsus 34. vertebriis. Vertebra quid. Dorsus beneficio præsertim humani (hoc enim duntaxat describendum suscepimus) recti stare, rectiq; ambulare possumus, qui legitimus est hominis motus, ac præterea ante, retro, ad latera, & in gyrum quoquo modo flectere corpus valemus. Quamobrem ex vnico, integroq; osse constare minime debet : quamvis enim ita promptius dorsalem medullam ab externis iniurijs vindicasset : Homo alioqui diuinum animal quoddam veluti lapideum, ligneû ue animal, neque sese erigere, inclinareq; potuisset, neq; tam varios motus edere, qui ad multos vitæ vsus maxime sunt necessarii. 10
- Cur dorsum ex paucioribus ossibus non constet. Dorsus vertebrarû luxatio quam p- tinescenda. Nam vero minus debuit ex paucioribus, vt quatuor, aut quinque ossibus constare. Nam licet motus ijdem fierent, difficilius tamen fierent, ac deinde dorso luxando occasio preberetur, id quod citra vitæ periculum vix vnquam euenire posset : quod luxationis genus animaduertens diuinus Hippocrates lib. de Articulis inquit. 20
- Hippocratis locus lib. de Art. Si plures vertebrae, quæ ordine se consequerentur luxari contingat, graue quidem, sin vero vnâ aliquam exilire, & à reliquarum compage dimoueri perniciosum fore. neque id iniuria : nam si una vertebra luxetur, spinalem medullam ita secum diuellit, vt in acutum pene angulum illam cogat. iccirco vel frangatur ipsa, vel comminatur necesse est : id quod lethale est ; siquidem medulla hæc cerebri natura prædita est. sin autem plures vertebrae simul luxentur ; in angulum obtusum, vel magis in semicirculum diduci eandem oportet, ex qua distractione patitur quidem, verum non adeo, ut mors necessario consequatur. ergo ex pluribus ossibus veluti crebris, breuibusq; intermedijs constructum est dorsum : vt, quoad eius fieri posset, immune redderetur ab eiusmodi luxatione : necnon etiam vt vertebrarum corpora sic affabre facta in quemcûque motum procliuiora forent. Ad hæc vertebrae spinalem medullam, quam intus habent, mirum in modum tuentur. hinc non spinam modo tot processibus conspicuam habuere, qui mediam dorsus regionem extrinsecus occupant, quod præcipuum est medullæ propugnaculum, vnde à potissima dorsus parte totum græci *σπονδυλὴ* hoc est 30
- Luxata vna vertebra spinalis medulla redigit in acutum angulû. Spinalis medulla sapit naturam cerebri. Pluribus vertebriis luxatis spinalis medulla redigit in semicirculum. Cur dorsum cõstat ex tot vertebriis. Vertebrae tuentur medullam. Spina sita & causæ. Cur spina ita dicta.



est spinam vocarunt: verum etiam ex lateribus hinc vide processum alios producant promptioris, maiorisq; tutamenti gratia. quos interim tamen musculorum implantationibus subseruire natura voluit: quæ æque sollicita fuit de spinali medulla, ac de cerebro muniendo: quoniam huic ex cerebri substantia productæ, & oblongo tãquam cerebro gignendi erant nervi. in medijs vertebri foramen extat, in quo dorsalis medulla sedet. ipsæ vertebre quo magis à ceruice recedunt, eo magis augetur, & processus longiores, ac robustiores habent. sustinent enim superiores. quæ igitur in imo posita sunt: aliarum maximæ corpore constiterunt: vt vniuerso oneri ferendo sufficerent. Nam rationi consentaneum est, vt quod gerit, re lata maius existat. Præterea vertebrarum, processuumq; magnitudo conferre plurimum videtur ad tuenda maxima vasa, venam scilicet concauam, arteriamq; magnam, quæ sub ea regione residet. Dorsum quinq; in partes diuiditur in ceruicem, collumue, thoracem, lumbos, sacrum os, & coccygem. Quinque hæc suis vertebri constituntur, quæ in vniuersum triginta quatuor numerantur. Nam collo septem tribuuntur, thoraci duodecim, quinq; lumbis, sex sacro ossi, postremæ quatuor coccygi. Caterum ex his viginti quatuor iure optimo vertebre nuncupantur: quippe quarum munere corpus in varias partes vertatur; & hæc ad sacrum terminantur. quæ autem ad os sacrum cum coccyge attinent: potius à similitudine, quam cum superioribus aliqua ex parte obtinent, quàm quòd vertebrarum munere fungantur: vertebre sunt appellatæ: quæ pariter alio articulationis genere à superioribus inuicem componuntur. illæ namq; Arthrodia articulantur, hæc vero postremæ per Symphysim vniuntur. Sed clarius hæc in priuata singularum tractatione sequentur quatuor capitibus.

30

De vertebri ceruicis, &amp; capitis motibus.

CAP. XV.

**A**C PRIMVM ab illis vertebri supremis dorfi exordientes illud disputare omittemus, cur omnibus animalibus ceruix non cõueniat: & an illam pulmonum, vocisue gratia natura finxerit; quando hæc, atque id genus problemata ex Aristotelis, aliorumq; rationibus abunde discussa sunt. Quòd autem ceruix ex vertebri cõstare debuerit: rei natura nobis apertissime demonstrat: nam cum emanet à cerebro spinalis medulla, in vertebriq; contineatur, capiti vertebra contiguas esse oportuit, totum id spatij occupantes, quod à capite ad summum Thoracem interest colli, siue ceruicis nomine donatum.

Cur vertebre dorfi habent processum in spina & lateribus.

Processus laterales vertebrarum muscularis etiã seruunt.

Natura est sollicita de spinali medulla vt de cerebro & cur.

Spinalis medulla è cerebro productum.

Locus medullæ spinalis.

Cur vertebre inferiores habeant corpora maxima

Vertebre corpora & processib. magnæ melius tuetur venâ cauâ & arteriam magnâ. Dorfi diuisio.

Colli vertebre 7. Thoracis vertebre 12.

Lumborum vert. 5. Ossis sacri vert. 6. Coccygis vert. 4. Vertebre propriæ quæ & quot.

Differentia vertebrarum ab ijs quæ per similitudinem ita dicuntur.

Quæstiones quas omittit dedita opera.

Cur ceruix cõstet ex vertebri.

Septem vertebræ  
colli a seipsis dif-  
ferūt & quomo-  
do.

Cervicis vsus.

Gal. erravit in ca-  
pitis motibus.

Vess. in describen-  
dis capitis moti-  
bus Gal. diligen-  
tior.

Gal. errores de ca-  
pitis motibus nō  
possunt excusari.

Gal. est sibi similis  
in doctrina de  
motib. capitis li-  
bro de Vsu Part.  
de ofs. et quarto  
de Anat. Aggref.  
De motib. capitis.  
Gal. 12. de Vsu part.  
Diuisio motuum  
capitis.

Proprij motus ca-  
pitis qui.

Quod motus Gal.  
siant manēte cer-  
uice.

Motus capitis &  
cervicis commu-  
nis.

Quomodo motus  
cervicis proprius  
fiat capiti comu-  
nis.

Motus proprij ca-  
pitis sunt super  
primam, & secun-  
dam vertebra.

Prima & secunda  
vertebra cap. alli-  
gantur.

Cur occiput i pue-  
ris sit ex pluribus  
ofsibus.

Caput cervici fir-  
missime iungitur.

Articulatio occi-  
pitis cum primis  
duabus vertebra  
colli quō habeat.

donatum. Cæterum hæ vertebræ septem numero sunt, non solum à cæteris, verum etiam à se inuicem differentes. prima namq; à secunda, & hæ rursus à subsequētib; diuersæ sunt. At quatuor à secunda ad septimam vsq; sibi similes in figura conspiciuntur. verum septima ab omnibus distincta est, sicuti ex singularum descriptione patefiet. Cervix autem non modo hunc vsū præstat, vt caput fulciat, sed etiam vt eius motibus potissimum conferat. Quamobrem operæpretium est cognoscere, quoniam sint capitis motus, quoq; illi ipsi modo fiant. Nam quod Galenus de ijs scripsit: prorsus à veritate alienum existimatur; quemadmodum summus Anatomicus 10  
Vessalius longe hac in parte Galeno diligentior ex rei natura deprehendit. neque vero Galeni error librariorum incuriæ, aut incitiæ adscribi potest, cum pluribus in locis idem repetat. vt in XII. de Part. Vsu. in lib. de ofsibus. & IIII. de Aggrefibus Anatomicis, quos mira diligentia se conscripsisse profiteatur. Cum itaq; caput pluribus motibus moueatur: cum illud Galeno teste XII. de Vsu Part. nullo motu careat, scire oportet illud partim suos, ac proprios motus edere, partim ad alienos motus consequi. Peculiares capitis motus duos esse non semel eodem lib. Gal. asseruit, vnum, cum caput ante, retroq; flectitur annuendo, renuendoq; alterum cum 20  
ad latera circumducitur, hosq; fieri manente ceruice; cum autem caput valde in primum, ac supinum demittitur, atque etiam ad humeros vehementer adducitur, tales motus non sunt ipsius capitis proprii. siquidem cum tota ceruice fiunt, neque vllō modo ea quiescente cieri possunt, & ceruix moueri nequit, quin simul etiam caput ipsum moueatur, nimirum qui est proprius cervicis motus, hūc pariter capitis communem iudicamus. Iam vero proprios motus super primam, secundamq; vertebra tantum fieri certum est, cum hæ duæ cum capite potissimum colliguntur. Ab occipitio enim multis partibus ligamenta fluunt, propterea distinctum est in rimas 30  
ab initio, adeo vt puerorum occiput ex pluribus ofsibus constructum sit, quæ postmodum ætatis processu ita coalescunt, vt ne vlla quidem diuisionis nota appareat, atque ideo vnicum ab omnibus censeatur. His ligamentis vndique annectuntur occipitio primæ duæ vertebræ, ne caput huc, atque illuc temere delabi possit, quo fit, vt firmissime cum ceruice cohæreat. At suos vt motus commo-  
dius efficere queat pereleganti artificio cum primis duabus vertebra occiput articulatū fuit, quæ articulatio ad hunc habet modum. Ad eam occipitij partem, vbi amplum est foramen, per quod in dorsum spinalis medulla descendit, anteriora versus duo asfident promi-



prominentes, & in longum diducti processus, vtrique videlicet vnus, qui primæ vertebræ sinus subeunt, quos in superiore sui parte ascendentium processuum media sede exculptos cernimus. Huius articulationis ope Galenus falso putauit caput in gyrum verti posse. Nam huic sententiæ aduersatur eiusdem articulationis forma, quandoquidem illa, quæ verti, ac circumagi debent, rei vni veluti axi inniti solent, non autem duabus oppositis partibus infigi. Nam si caput moueretur, vt censuit Gal. circumduci non posset, nisi alteruter processus semper è sua sede exiliret: vnde luxari caput

- 10 perpetuo necessum esset, quod nunquam sine vitæ dispendio accidit. Ergo solum ex hac articulatione colligere possumus eum motum, quo caput modo inclinatur, modo reclinatur. circumducitur autem ad latus altera articulatione, quæ in secundæ vertebræ cum prima compositione miro modo celebratur. Exurgit enim è medio corpore vertebræ secundæ processus quidam rotundus, ac longus crassitie mediocri, quem non inuenisse Græci *ὁ δ' ὀστέου* & *ὁ δ' ὀστέου* nuncuparunt, quoniam canini hominis dentem quodammodo referat. Propterea Hippocrates huius partis gratia totam secundam vertebram dentem nominauit. quod perperam intelligens quidam
- 20 processus posteriorem huius dētis loco accepit. Huiusmodi itaq; dens primæ vertebræ sinu suscipitur, qui eo exculptus est loco, qui vertebræ corpori destinatus fuisset: nisi eius ipsius sinus gratia corpore priuatum iri oportuisset. quò itidem loco teres, ac solidum hinc atque hinc ligamentum ducitur, dentem adeo claudens, vt ne ibi dorsalem medullam appositam conuulneret, aut certe comprimat, & tamen laxam articulationem illam relinquat, cuius beneficio circumagi vertebra superior possit, in quam infixum, ac persistens eo quo diximus modo caput simul ad latera circumuertatur. qua in re Gal. quoque reprehensione non vacat: quippe qui non
- 30 animaduertit eiusmodi esse hanc articulationem, qualem in valuarum, hostiorumq; cardinibus intuemur, quibus ostia ipsa, valuæq; sustinentur, & tamen non sursum, neque deorsum mouentur, sed solummodo circumaguntur. Ex his iam tandem conflare puto quifint proprii, quæ communes capitis motus; & quomodo cum hi, tum illi fiant: Quanquam ad hos ciendos necessaria sit vertebrarum cum capite coniunctio. ac demum veritatis cultoribus cū Galeno errandi occasionem sustulimus. nunc reliquum est, vt ad vertebrarum colli descriptionem redeamus. Prima ceruicis vertebra alijs quidem tenuior, verum densior, ac solidior existit corpore: processuq; superiore caret. Etenim sciendum est verte-

G bram

Gal.error.

Quæ circumaguntur axi inniuntur.

Caput sine vitæ discrimine non luxatur.

Caput inclinatur & reclinatur ope articulationis eius cū prima vertebra.

Caput circumducitur articulatione secundæ vertebræ cum prima.

Quid sit processus odontoides.

Cur Hippocr. vocat secundam vertebram dentem.

Error cuiusdam.

Describitur articulatio secundæ vertebræ cū prima.

Ligamentū processus dentis dicti.

Gal.error.

Valuarum cardinibus articulationem comparat.

Epilogus.

Primæ vertebræ cū alijs cōparatio.

Vertebra diuidi-

tur in corpus & processus.  
Corpus in vertebra quid.

Processus in vertebra quid.

Primæ vertebræ anterioris figura.

Tuberis primæ vertebræ vñs.

Sinus primæ vertebræ vñs.  
Cartilaginis i primæ vertebræ articulum secundæ vñs.

Observatio in omnibus vertebrarum articulationibus. Omnes vertebræ habent processus ascendentes & descendentes.

Cur primæ vertebræ processus sint vtrinque excavati.

Prima vertebra vtrinque suscipit non suscipitur.

Processus laterales primæ vertebræ quales.

Examinis processum lateralem vñs.

Processus superior & ascendens idem, & processus inferior descendens.

Vertebræ pene omnes dorsum incisæ sunt ubi committuntur.

Sinus inter primam & secundam vertebram ab alijs differentia.

Thoracis vertebrarum ubi committuntur

bram in corpus, ac processus multiunges diuidi solere. corporis nomine partem magnam, ac veluti corpulentam intelligimus. reliquum vero, quod à corpore superat, partim foramen dorsali medullæ paratum constituit: partim in processus absumitur. Processus autem cum dicimus, eas vertebræ partes intelligimus, quæ ex ijs qualibet sede protuberant. Parte igitur anteriore primæ vertebræ, ubi corpus esse debuit, adest portio quædam pertenuis, quæ intrinsecus, quæ respicit foramen, per quod spinalis medulla pertransit, in sinum excauatur: extrinsecus vero in œsophagum pertinens tuber quoddam emittit, quo tanto crassior, firmiorq; redditur, quanto ob posteriorem dictam cauitatem gracilior, ac imbecillior facta fuerat. Hoc sinu (sicuti paulo supra dictum est) dentem à secundæ vertebræ corpore productum excipit, cui crustæ modo cartilago innititur, cuius beneficio & lubrica magis in edendo motu fit articulatio, & cauetur ne nimio motu atterantur ossa: Id quod in omnibus alijs vertebrarum articulationibus obseruatum cernimus. Præterea operæpretium est, vt diligenter adnotes ascendentes, ac descendentes processus, quibus æque omnes vertebræ donatæ sunt. Nam in alijs altera tantum parte sinus habentur, quemadmodum suo loco dicam. In prima vero vtrinque sunt 20 excavati: vt superne quidem admittant occipitij processus, inferne autem superiores secundæ vertebræ. vnde colligere potes primam vertebram nulla ex parte suscipi: sed vtrinque tam superiorum, quàm inferiorum ossium insertionem suscipere. Item è lateribus eiusdem primæ vertebræ versus anteriora erumpunt duo alij processus prælongi, ac perforati, qui & maiores sunt, quàm in cæteris vertebris; & foramen quoq; maius habent, per quod vena, arteriaq; transeunt ad caluariam, & ex se propagines aliquas ad medullam dorsalem transmittunt. Ad processus superiores & inferiores, quos ascendentes & descendentes nominauimus: versus 30 posteriores, si primam spectes, sin autem reliquis anteriora versus sinus vtrobiq; singuli iacent, quibus effingendis non modo vertebræ os, quod ambit foramen dorsali medullæ paratum, sed postrema quoq; processuum portio cessit: Id quod commune est omnibus fere dorsum vertebris, quas incisæ esse comperies, ubi inuicem committuntur, ita vt tam superioris, quàm inferioris vertebræ substantia participant. Hi sinus in prima, & secunda vertebra oblongæ rimæ speciem seruant, in reliquis orbiculari sunt figura, præterquam in Thoracis vertebris, ubi in longum excauantur. Per hos sinus effluunt neruorum coniugia numero distincta, quemadmodum





modum & ipsæ vertebræ distinguuntur. Quamobrem è sinibus superioribus primæ vertebræ producitur primum neruorum coniugium: ab inferioribus autem, qui nihilominus sunt secundæ vertebræ communes, exeunt secundæ coniugationis nerui; ex alijs vero alia paria pro vertebrarum situ, ac numero. Hi vero sinus, quos diximus, non modo neruis, verum etiam venarum, atque arteriarum ramis aditum præbent; vnde nutrimentum tam dorsali medullæ, quàm vertebrarum ossibus suppeditetur. Secunda vertebra præter cæteras dotes, quæ primæ tribuuntur; & corpus, & processum posteriorem habet. Ex summo corpore dentem illum promittit, de quo satis supra dictum est, cuius superficiem asperam quoquomodo, acutamq; natura construxit, vt inde commodius vinculum prodiret, quo occipiti alligaretur ea parte, quæ ab vtroque occipitij processu memorato æque distat, vbi adnatum est exiguum, asperumq; tuberculum, cui tenacius adhærescat. Processu item posteriore insignita est: vt inde enasci possint muscoli duo in occiput inserendi, quibus musculis fursum petentibus ne quicquam posterior primæ vertebræ processus officeret, illum prorsus natura ademptum voluit: posterior autem secundæ processus in extremitate scinditur, ac vt ita dicam, bifurcatur: vt commodiorem musculorum nexum efficeret. quam bifurcationem in reliquis etiam colli vertebris obseruabis. Hanc Galenus ignorauit suis delusus simijs, in quibus integri sunt: & si postrema nonnunquam illum integrum, nec bifidum gerat. Præterea secunda vertebra laterales processus longe breuiores obtinuit, quàm prima, in quibus peculiare illud est, quòd foramen oblique, non autem recte vt in alijs exculptum est. Dantur item huic & ascēdentes, & descēdētes processus: sed ascēdentes leuiter extuberant, ideo in humiles inferiorum primæ vertebræ processuum sinus immittuntur; ac descendentes exilibus pariter sinibus præditi sunt, vt sequentium processuum insertionem admittant. Iuxta hos processus adstant illi sinus, siue illa foramina, de quibus antea dictum est, qua transmittitur secundum neruorum coniugium à spinali medulla descendentium. Iam vero scire oportet ceruicis vertebrarum corpora, prima tamē excepta, quam corpore destitutam esse diximus, in longum aliquo modo extendi, ac partem anteriorem planam exigere: cum illi substratus sit oesophagus in ventriculum definens, ac simul asidet aspera arteria ad pulmones tendens. Harum itaque committēdis corporibus aliam à cæteris rationem natura excogitauit: nam præcedentis pars inferior decliue sensim exciditur, superior vero

tur sinus qualis. Sinuum vertebrarum vbi committuntur vñs.

Coniugia neruorum tot sunt quot vertebræ.

Primi neruorum coniugij & vertebræ ortus.

Secundi coniugij neruorum ortus.

Venæ & arteriarum ortus in sinibus neruorum coniugij communibus.

Secundæ vertebræ descriptio.

Dens oritur in secunda vertebra ex corpore ipsius.

Dentis superficies cur aspera & acuta.

Tuberculi asperi in secunda vertebra vñs.

Cur secunda vertebra habet processum posteriorem.

Cur prima vertebra reat processu posteriore.

Cur posterior processus secundæ vertebræ sit bifidus.

Processus posteriores vertebrae colli omnes sunt bifurcati contra Gal.

Processus laterales secundæ vertebrae sunt breuiores, & foraminis obliqui.

Processus ascendentes.

Processus descendentes.

Sinus per quos exeunt nerui: vena & arteria sunt iuxta processum.

Corpora vertebrarum colli qualia

Cur anteriora corpora vertebrae colli sunt plana.

Oesophagus definit in ventriculū Aspera arteria tendit ad pulmones.

Cōmittuntur cor-  
pora vertebrarū  
colli pene vt ossa  
temporum.

Prima vertebra ca-  
ret appendice.

Oēs vert.colli præ-  
ter primā habent  
appendices.

Cartilago crassa &  
mollis cur sit in-  
ter appendices  
vertebrarum.

Cur processus la-  
terales vertebra-  
rum colli post se-  
cundū sint bifidi.

Septima vertebra  
colli qualis.

Posterior p̄cessus  
septimæ vertebrae  
nō est semper bi-  
fidus.

Cur plana sit infe-  
rior pars poste-  
rioris processus  
septimæ vertebrae.

sequentis modice quoque declius est, vt huius portio illius por-  
tionem excipiat modo haud absimili à temporum ossium commis-  
sura. Colli vertebrarum corpora, prima tamen excepta, appendi-  
cibus vtrunque decorantur: inter quæ locum habent cartilagine  
crassæ, ac molles, vt flectendi munere in quamcunq; partem libe-  
rius fungantur. Cæterum vertebrae, quæ secundæ succedunt: pro-  
prium id habent, quòd earum laterales processus bifidi sunt, quod  
ob muscutorum implantationem factum fuit, vt etiam in postero-  
re processu supra adnotatum est. Septima vertebra, cum finiti-  
ma sit thoracis vertebra: nō nihil est earum naturæ particeps: itaq;  
à superioribus distinguitur: Aliquando enim illius posterior pro-  
cessus integer est, non bifidus. Præterea inferior eius corporis  
pars, qua spectat primam thoracis vertebra, non oblique, nec  
decliue extenditur, sed plana est aliquantulum: quo sequentis cor-  
poris parti æqualiter cohareat.

10

## De Vertebis Thoracis.

## Cap. XVI.

Thoracis vert. 12.

**T**HORACI deferuientes vertebrae duodecim numero sunt,  
quibus singulis binæ costæ articulantur, ita vt numero sint vi-  
ginti quatuor. Tametsi quandoq; superesse vna, quandoque de-  
esse inueniatur. rarissimum quidem vtrunq; est, verum rarius mul-  
to est, vt desit. Variant hæ à cervicis vertebra; si quidem maiore  
sunt corpore, quamquam ab illis densitate, ac soliditate substantiæ  
superantur. & profecto maius corpus sortiri debebāt, quando ma-  
iores non esse non poterant superioribus sustinendis addictæ. ve-  
rum obseruabis ea, quo magis mole augentur, eo rariore, ac fun-  
gosiore substantia prædita esse, ac præterea foraminibus quamli-  
bet exiguis referta vasorum nutrimentum deferentium excipien-  
dorum gratia. At corpora hæc, præterquam quòd & rariora, &  
fungosiora sunt: figura, & situ à cervicis vertebrarum corporibus

20

30

Costæ quō. 24.

Costæ quæq; etiam  
23. vel 25.

Rarius est vt ex co-  
stis vna desit quā  
superfit.

Differentia verte-  
brarū thoracis à  
vertebris colli.

Cur corpus verte-  
brarū thoracis sit  
maius corpore  
vert. colli.

Corpora vertebra-  
rum quāto maio-  
ra eo fungosiora.

Foram.in corpore  
vert. vsus.

Figura corporum  
vertebrarum tho-  
racis lata.

Plana.

Processus vertebra-  
rum thoracis  
quales.

non parum discrepant. Etenim minime lata sunt, nec depressa,  
qualia illa esse dicebamus. Sed in medio protuberant, & in rotun-  
dum adducuntur: præter duas primas, quæ ob colli vicinitatem  
quoquomodo corpore sunt depresso, ac lato. Horum itidem cor-  
pora supra, infraq; plana existunt, & multam cartilaginem interie-  
ctam possident. In eo præterea ab iisdem cervicis vertebra diuer-  
sæ sunt, quoniam posteriores processus nec bifidos, nec rursus la-  
tos, atque in extremitate rotundos gerunt: sed oblongos, & acu-  
tos quadrangularis pyramidis ritu, ac deorsum decliues; neque  
transuer-



transuerfis sunt proceſſibus bifurcatis, ſed longis & magnis, nec non in rotundum, & craſſiuſculum caput deſinentibus, qui primo exortu ſurſum feruntur, inde vero ſeſtuntur deorſum tendentes; parteq; interna excauati coſtarum tuberibus commodam articulationem præbent. quæ cavitates in tribus primis inferiorem regionem, in tribus autem poſtremis ſuperiorem occupant, adeo vt illæ deorſum, hæ vero ſurſum reſpicere videantur. at quatuor mediæ medio ſe habent modo. Cæterum tranſuerſi vndecimæ, ac duodecimæ proceſſus non ſunt eiufmodi. namq; ijs nothas coſtas veluti breuiores atque intumeſcentibus inteſtinis prærunq; ceſſuras, tam  
10 valide alligari minus expediebat. Quamobrem vnica illa, & mediocri articulatione vertebrarum corporibus duntaxat committuntur. Reliquæ omnes validiſſimis ligamentiſ neſtuntur, atque vt firmior ſit huiufmodi nexus: ad latera corporum vertebrarum ſſinus adſunt coſtarum capitula excipientes, qui tamen non in omnibus eundem ſeruant ſitum. Nam præter primam, vndecimam, ac duodecimam ſinus iſti communes ſunt, ſiquidem ad corporum extremitates, quæ vertebræ mutuo vniuntur, iacent iuxta foramina tranſmittendis neruis parata: ſed prima, vndecima, & duodecima  
20 hos ſinus in ſuis ipſarum corporibus exculptos habent, quos omnes cartilaginea cruſta oblitos licet animaduertere. Iam vero thoracis vertebræ alijs quoque nominibus inuicem diſtinguuntur. Etenim poſteriores proceſſus, qui ſpinam conſtituunt, neque ita longi, neque acuti in tribus poſtremis conſpiciuntur: ſed lati quodammodo ſunt, & in extremitate in orbem circumſcripti, nec abſimiles vertebrarum lumborum proceſſibus in eadem ſerie conſtitutis, vbi adnotare operæpretium eſt, poſteriorem duodecimæ proceſſum omnium breuiſſimum, & minus alijs deorſum ſpectantem. Hic nõ eſt prætermittendum, quòd quæ nos cum recte ſentientibus duodecimæ tribuimus, ea Galenus decimæ aſcribit: verum illi canes, & ſimiæ impoſuere, in quibus decimæ eſt dorſi vertebrarum medium, ac veluti punctus & axis quidam: quo omnino quieſcente cæteræ hinc inde moueantur. quod in duodecima hominis verû deprehendes, quæ parem articulationis ſpeciem ab vtraq; parte eſt conſecuta; infra namq; ſupraq; proceſſus mediæ extuberantes habet, vt vtrinque ſuſcipiatur, contra quàm primæ ceruicis vertebræ vſu venit, quam vtrinque ſuſcipere capite ſuperiore demonſtrauiſmus. Quòd ſi quis huius articulationis varietatis diligentius rationem requirat, animaduertere oportet eandem motus rationem in ſuperioribus vertebris ad duodecimam vſque ſeruari:  
inde

Coſtarum tubera articulantur cū cavitatibus proceſſuum vertebrarum thoracis.

Thoracis vert. tres primæ. deorſum tres, poſteriores ſurſum reſpiciunt mediæ medio modo.

Proceſſus tranſuerſi vndecimæ & duodecimæ vert. quales.

Coſte nothæ cedunt quandoque inteſtiniſ tumētib.

Quomodo vertebræ coſtis validiſſime alligantur.

Prima vertebra vndecima & 12. quales ſinus habent.

Proceſſus poſteriores vertebrarum thoracis quales.

Decima vertebra in cane & ſimiæ eſt mediū vertebrarum dorſi, ſed in homine 12. Gal. error.

Duodecimæ vert. vſus & figura.

Duodecima vert. vtrinque ſuſcipiſ. Prima vertebra vtrinque ſuſcipit. Cur nõ ſit eadem in omnibus thoracis vertebris articulatione.



Dorsum quō ī anteriora flectatur. Quā ope dorsum ad posteriora curuetur.

Vertebrae thoracis habent quinque processus & quos.

inde vero à subsequentibus nempe lumborum vertebri contrariā. Quocirca cōtrarius quoque in illarum superioribus, inferioribusq; processibus articulationis modus reperitur, & forte præcedentium articulatio aptissima est ad dorsum in anteriora flectendum: cum vero illud ipsum ad posteriora toto pene corpore curuatur, id muneris tunc lumborum vertebrae præstiterint. Thoracis vertebrae illud postremo commune habent, in quo à superioribus maxime differunt, quòd quinque appendicibus sunt donatae, binis ad ipsorum corpora supra, infraq; totidem ad transuersos processus, ac demum singulis ad extremitatem spinæ.

10

### De Lumborum Vertebri. Cap. XVII.

Vertebrae lumborum 5.

Substantia vertebrarum lumborum qualis.

Processus superiores & inferiores quales.

Cur vertebrae lumborum committantur diuerso modo.

Processus transuersi.

Prima & quinta vertebra.

Transuersi processus mediae vertebræ lumborum quales.

Error Vessalii. Transuersorum processuum usus.

Cur in loco processuum transuersorum costæ non sint productæ ad maiorem longitudinem.

Productio transuersorum processuum vertebrarum lumborum quata sit.

Processus alii duo.

**E**X ijs, quæ supra de colli, ac thoracis vertebri dicta sunt, nō pauca eliciuntur, quæ ad vertebrarum lumborum explicationem attinent, quæ repetere nullo pacto est opus. Lumborum igitur vertebrae quinque numero sunt, atq; hæ superiorum omnium maximæ: verum substantia rarissima, & foraminibus crebris peruiæ constant. Harum superiores processus sinus speciem referunt. inferiores autem in hos immittendi paululum eminent, atq; ita sua & ipsi cartilagine tecti committuntur, contra quam in superioribus fiat, quoniam hæ articulatio oppositam motus rationem præstat. Transuersi processus longiores multo his, quàm thoracis vertebri, attamen tenuiores, atque inter se dispares. Prima enim & quinta lumborum vertebrarum breuiore illos habet, quàm media: qui à se inuicem præterea disidēt, quoniam superiores deorsum, inferiores sursum, vnus vero, quæ media est transuersi processus nec sursum, nec deorsum vergunt: quidquid de his senserit Vessalius. Tales autem processus costularum vicem quodammodo gerunt peculiare maximis vasis propugnaculum allaturi. Non enim eo loco iustæ magnitudinis costæ produci potuere; siquidem non conducebat eam intestinorum regionem ossium mole, ac duritie comprimī, quam ad immodicam extensionem nonnunquam deuenire oportet, præsertim in foeminis, quando vterum gestant. cui rei natura consuluit accuratius: cum duas postremas costas, & breuissimas efformarit, & sensim à pectoris osse abduxerit: satis fore existimans si transuersos lumborum vertebrarum processus tantum porrigeret, quantum venæ cauæ, magnæq; arteriæ muniendis opus foret. Nō procul ab his processibus duo alij, vtrinq; singuli, exoriuntur exigui admodum iuxta nerui exortum, quos Vessalius

20

30



Vessalius in homine nunquam, in canibus vero, ac simijs se animaduertisse asseuerat. Cui ego hac in parte subscribere nullo pacto possum, & verissimam esse sententiam Gal. cogor fateri, cum sæpe in cadaueribus publice sectis Patauij, Pisis, Romæq; eius generis ossa animaduertim: & pleno theatro atrectanda propoluërim, quæ haud dubie nuper dictis processibus abundabant. Quid? quodd apud me sceletos adhuc perstat, in cuius lumborum vertebri-  
 10 tates tales processus insigniter apparent. Hi tamen nō in omnibus apparent. Aliquando inueniuntur vertebrae, in quibus obscurissimifint. Atque hæc prolixius dicta sint, vt omnibus perspicuum fit, me in rebus Anatomicis non tanti Galenum, & Vessalium, quos plurimi facio, quàm veritatem ipsam facere: veritatem appello, vbi cum rei natura oratio maxime concordat. Dantur præterea lumborum vertebri posterioribus processus, neque longi, neq; acuti, neque ita deorsum tendentes, quales in superioribus vertebri-  
 20 bus visuntur: sed validi sunt, crassi, ac lati, & in extremitate circulari linea definiti. Hæ tandem vertebrae aliarum more appendicibus exornantur, quæ quanto cæteras magnitudine antecellunt, tanto etiam cartilaginem, quæ inter ipsarum corpora mollissima interfidet, maiorem, & crassiorem adeptæ sunt, neq; foraminibus illis destituuntur ante inferiores, superioresq; processus exculptis, per quæ tam patet ingressus uasii nutrimentum afferentibus, quàm exitus neruis ex dorsali medulla progredientibus. Hæc autem foramina à superioribus differunt: non enim vere orbiculata sunt, neque magis in vnus, quàm alterius vertebrae parte excuantur, sed parem vtriusq; portionem exemptam postulant, quemadmodum videre est in quibusdam ceruicis vertebri. id quod si minus obseruatum videris, non magni referre putato, si humilior istorum foraminum sedes inferioribus vertebri tribuatur. Illud autem  
 30 omnium vertebrarum dempta ceruicis prima commune fuerit, quodd in posteriore corporis parte, quam vtiq; spinalis medulla parte sua anteriore attingit, adistit foramen patens, ac peruium subintrantibus venis, atque etiam arterijs, vt alimentum abunde suggerant. Atq; hæc hætenus de ceruicis, thoracis, ac lumborum vertebri: quarum descriptio à Galeno tradita omnino rejicienda est, quando cum brutis potius, quàm cum humanis conuenire videtur. In sacro item, & coccygis ossæ Galenum eadem ratione nō sequemur, vt sequenti capite palam erit. Illud insuper adnotabis posteriorem processum, quem spinam vocari diximus, deorsum tendere à secunda ceruicis vertebra vsq; ad vltimā lumborum, quamuis

Contra Vess. pro Galeno.

Processus est anatomici, Patauij, Pisis, Romæ.

Sceletum habet domi.

Galeno & Vessalio in rebus Anatomicis veritatē præfert.

Processus posteriores lumborum quales.

Vertebrae lumborum habent appendices.

Cartilago inter corpora vertebrarum qualis.

Vitus foraminum ante processum in inferiores ac superiores.

Differentia foraminum vertebrarum lumborum ab alijs

Comune omnibus vertebri præter primam ceruicis.

Gal. errat in vertebrarum sacri & coccygis descriptione.

Spina tendit deorsum à secunda vertebra colli ad vltimā lumborum.

Gal. error.

quamvis secus Gal. senferit, qui dixit processus sub decima sursum  
vergere.

De Sacro, &amp; Coccygis offe.

Cap. XVIII.

*ἱερὸν  
κόκκυξ.*  
Cur *πλατὺ* vocet  
os sacrum.

*ἱερὸν*. i. magnum.

Etymologia sacri  
ossis quòd ita vo  
cetur quia in pa  
rientibus dilata  
tur absurdissimū  
est.

Gal. descripsit os  
sacrum beluinū.

Vessalii sermonis  
prolixitas.

Authoribus legen  
dis iudicium ad  
hibendum.  
Pythagoricis sat  
erat *αὐτὸς ἕρμα*.

Gal. quandoq; dor  
mitat.

Galeni error.

In simia cane &  
leone verum est  
quod scribit Gal.  
de offe sacro.  
Os sacrum homi  
nis ex quinq; vel  
sex ossibus.  
Os sacrum in æta  
te tenella laxat  
& separatur.

Vbi seruetur vesti  
giū cōmissuræ in  
osse sacro.

**D**ORSI duæ iam postremæ partes restant, quarum alteram sa  
crum, alteram vero coccygis os nuncupamus, utroq; à Græ  
cis sumpto vocabulo: siquidem illi hoc *ἱερὸν*, illud autem *κόκκυξ* dixe  
re, nonnunquā etiam sacrum *πλατὺ* vocarunt; latum id, amplumq;  
intelligentes. superat enim non modica amplitudine reliquas om  
nes vertebrae, quibus veluti basim substratum animaduertimus. 10  
idem vero apud veteres *ἱερὸν*, quod magnum sonat. Illud de hoc of  
se satis absurdum est, atque à rei natura maxime abhorrens, quod  
nonnulli magni etiam nominis authores commenti sunt: os istud  
fœminis, dum pariunt, ita dilatari, ac retrocedere, vt percommo  
de fœtus edi possit; ac propterea sacrum appellari. Neq; mihi ad  
ducenda videntur, quæ Galenus varie de hoc offe tradidit, cum  
satis constat, non humanum os sacrum, sed beluinum, quale est  
canum, ac simiarum, ab eo fuisse descriptum, quemadmodum plu  
ribus verbis quàm fortasse necesse fuit, Vessalius ostendere cona  
tus est. Verum enimvero hæc, atque alia quandoque in medium 20  
afferri debent, vt nonnulli discant legendis authoribus iudicium  
adhibere, neque Pythagoricorum more satis esse ducere, quod ip  
se dixerit. cuius tantum opinio præiudicata poterat, vt etiam sine  
ratione valeret autoritas. Quis enim non videt magnum Gale  
num quandoq; dormire, cum ossa non distinxerit, quantum à  
brutorum ossibus humana distarent? Illud enim ne à sacro offe  
discedamus, quod scripsit Gal. in sacro offe tria tantum inueniri fo  
ramina, quæ in ossium, ex quibus id ipsum constat, compage ex  
culpta sunt; videre non possum, quo pacto verisimile sit tribus fo  
raminibus donari posse, cum duas tantum commissuras obtineat: 30  
quandoquidem vult ex tribus id ossibus cōstructum, quem simiæ,  
vel canis, vel leonis os sacrum inspicienti non obscurum erit, mi  
nus vero tria hæc foramina sacro ossi humano tribuentur; quòd vi  
delicet non ex tribus, neque ex quatuor (vt ille arbitratus est) ve  
rum ex quinq; & sex plurimum ossibus conflatum est: quæ tametsi  
in ætate adhuc tenera laxari, ac separari possunt, neq; tunc multum  
à reliquis vertebrae differre videantur; Tamen cum facta sint, vt  
consistant; ita coalescunt, vt nisi interna parte, quæ anterior est  
commissurarum notæ seruarentur, vix quisquam crederet ex pluri  
bus illud ossibus constare. Cæterum ossa hæc non secus inuicem  
commissa



commiffa funt, atq; superiores vertebræ, præterquam quòd inter-  
stitio cartilagineo carent, quo minime opus erat immobilibus fu-  
turis. Quamobrem in vertebrarum numero habentur, non quia  
vertebrarum vsum præstent, cum nulla ratione moueri possint, ve-  
rum quia similitudinem quandam retinēt, per quam cum illis con-  
uenire videntur. Nam si à teneræ ætatis corpore sumpta hæc ossa  
decoxeris, & à se inuicem diuulsa consideraues, & corpus in ijs,  
& processus, ac demum eandem pene figuram obseruabis, quam  
vertebræ ipsæ præ se ferunt. Porro non aliam ob causam os istud  
10 à natura paratum fuit, quàm vt super eo quiescente reliqua ossa in-  
feriora, æque ac superiora mouerentur. licet enim ad ossa partes  
corporis vniuersæ adhærescant, atque ijs motis eadem simul mo-  
ueantur, ex naturæ tamen lege vnum præcipuum os esse debuit, ad  
quod reliqua ossa stabilirentur. quod profecto commodius alibi,  
quàm in medio pene corpore locari non potuit; vt tam superiori-  
bus, quàm inferioribus mouendis assisteret. At quoniam dorsa-  
lem medullam admittere debebat, transmittendisq; ab illa nervis  
vias recludere: iccirco in eo foramina sunt incisa, per quorum me-  
dium spinalis medulla descendit: quæ adeo dura, solidaq; existit,  
20 vt nerui magis, quàm medullæ naturam sapiat. Quapropter in  
neruos plures, ceu in ramulos desinit, qui extra fines sacri ossis  
parte posteriore progressi ad nates, & aliquot vtriusq; femoris mu-  
sculos deferuntur. ad latera item ante, retroq; perforata sunt ossa  
ista, quæ scilicet inuicem committuntur: foramina vero rotunda  
sunt, & æque superioris, ac inferioris ossis portionem occupant,  
vnde nerui fluunt. Cum autem sex ossa (totidem enim illa sæpenu-  
mero esse solent) quinque necessario commissuris vniantur, quin  
etiam vtrinque foraminibus donari oportet; quorum duo prima  
maxima sunt omnium: reliqua vero quo longius à primis abscedūt,  
30 eo minora sunt: verum extrinseca omnia si cum intrinsecis confe-  
rantur, minora cernuntur. Quod si etiam addas partem illam,  
qua cum postrema lumborum vertebra superior primi sacri ossis  
portio coniungitur, cum illic extent duo alia foramina: dicendum  
est sacrum ijs pariter foraminibus abundare. Ex quibus omnibus,  
qui nerui transmitti soleant, suo loco docebimus. Huius ossis figu-  
ram non video cui rei conferre possim, nisi protuberantis propu-  
gnaculi formam imitetur. Etenim superne planum habet corpus,  
cui incumbit quinta nervorum vertebra, & se in bina latera protē-  
dit, crassa illa quidem, ac geminis processibus parte posteriore  
munita, atque ita respondet secundo; postmodum descendens

H semper

Quomodo intelli-  
gatur os sacrum  
haberi in nume-  
ro vertebrarum.

Ossis sacri vsus.

Os sacrum cur vnu.

Cur in medio si-  
tum est.

Cur in medio ip-  
sius sunt foramina

Spinalis medulla  
transiens per os  
sacrum nerui na-  
turam sapit.

Nerui a sacro osse  
ad nates & ali-  
quot mus. femo-  
ris.

Os sacrum ad late-  
ra ante & retro ē  
perforatum.

Si ossa sacri sunt  
sex foramina v-  
trinque sunt quin-  
que & qualia.

Foramina vtrinque  
in osse sacra ex-  
tra minora, in-  
tra maiora sunt.

Nervorum descri-  
ptionem aliò re-  
ijcenda.  
Figura ossis sacri.

Os sacrum cur anteriore sit leue ac finum.

Cur posteriore gibbum.

Cur asperum.

Sinus ac processus ossis sacri.

Os primum sacri quid habeat peculiare.

Tres sinus in extremis lateribus trium ossium superiorum sacri.

Connexio iliorum cum sacro qualis

Ossa iliorum & sacri neque mouentur, neque moueri possunt.

De coccyge.

Coccyx.

Cauda.

Os caudæ.

Coccyx os cur ita dictum.

Descrip. coccygis

Coccyx aliquem quandoque motum edit.

Parturientes cruciantur cum coccyx flectitur.

Processus quatuor primi ossis coccygis figura trium reliquorum ossium coccygis.

semper sit angustius, quousque in acutum fere tendat, ubi primum os coccygis coalescit. Præterea parte anteriore leue est, ac finum ut organis, quæ subsunt, cedat, neque abesse ullo pacto possit. posteriore vero parte gibbum est, ut firmitus hæreat, ac eas partes, quas munire debet, validius tueatur; nec minus asperum quoque est, multosque sinus, ac processus facit, quæ potius tubercula quædam mihi esse videntur. Posteriores item processus breuiores sunt, nec secus atque ossa, unde prodeunt, inuicem committuntur, ac vnâ veluti spinam constituunt; quod tamen in quatuor, vel tribus primis ossibus obseruabis. At quæ sequuntur posteriores processus in duas quodammodo partes diducunt: ut exerenti sese medullæ, ac in plures, ut dictum est, propagines diuisæ sinum parent, qui tamen hinc inde prominentes aliquantum illam tueri videntur. Primum os sacri hoc habet peculiare, quod superiores emittit processus leuiter cauos, quibus immittuntur inferiores postremæ lumborum vertebræ processus modice protuberantes. Demum notandi sunt tres sinus in extremis trium superiorum ossium lateribus, quorum medius maior est, ac profundior cæteris. in hos tenacius inferuntur prominentes illorum partes, atque ita cum transuersis processibus eorundem cartilaginis, ac ligamenti interuentu cohæret, ut vix diuelli possint. quin etiam videre est iliorum ossa adeo sacro ipsi connexa, ut connata quandoque videantur. Nec mirum id cuiquam videri debet, quando hisce oculis vidi os sacrum, cui finistrum os ilij connatum erat deficiente dextro, ac illud ne ferro quidem conuelli poterat: unde firmior redditur sententia, neque ossa iliorum, neque sacrum moueri ullo pacto posse. Quinta, & vltima dorsi portio ex quatuor ossiculis constructa ab ossis sacri extremitate veluti cauda quædam pendet: Ideo caudam recentiores, siue os caudæ dixerunt. Græce autem coccyx nuncupatur, quoniâ cuculi auis rostro persimilis apparet: rubescit enim os istud præsertim in iunioribus, & ductu ad interna obliquo in mucronem tēdit. Primum coccygis ossiculum, quod cæteris latius est, ac maius, superne sinum habet, quo imam postremi sacri ossis partem media cartilagine excipit, atque in eo vertebrarum inter se compagem imitatur ad aliquem forte motum, cum tempus postulat, edendum. Quocirca vero simile admodum videtur, os istud à sacro laxari, ac versus posteriora flecti, cum mulieres fœtum emittunt: id quod non sine aliquo patientium cruciatu contingit. Huic primo ossiculo dantur quatuor processus, duo è lateribus, ac totidem posteriores acuti, & superiora spectantes. reliqua vero tria ossicula rotunda



runda quodammodo sunt, ac sensim in acutum tendunt: vt rostri illius, quod referunt, mucronem constituent. Hæc inter se adeo arcte compacta sunt: vt vnicum os esse videantur, non nullis foraminibus peruia: fungosa tamen existunt, qualia sunt ossa pectoris.

Ossa coccygis sũt fungosa vt ossa pectoris.

## De Thorace. Cap. XIX.

**A** VERTEBRARVM descriptione ad explicandam thoracis naturam aliorum exemplo aggredi decet; quando illæ duodecim, quæ inter ceruicem, ac lumbum locum habent, ad thoracis constitutionem necessario concurrunt: etenim costæ præcipuè thoracis partes, cum exactiorem illius figuram efficiant, maiorem firmitudinem, ac robur à vertebrais, quàm ab osse pectoris sortiuntur, quibus omnes gemino fere nexu copulantur. Quamobrem si pectoris os thoracis partem censemus, multo certe magis fatendum est vertebrais iam commemoratas ad thoracem pertinere. Nò immerito igitur ex vertebrais, costis, ac item ex osse pectoris integra thoracis constructio constat, quod descripturi, de costis, pectorisq; osse tantum agemus. Nam satis, superq; de vertebrais meminimus. Cæterum in thorace cor princeps membrum cõtineri nemo est qui nesciat, cui veluti calidissimo, & assiduo pene feruore æstuanti partem aliquam adesse oportuit eius refrigerandi gratia. Propterea in thorace geminos pulmones natura fabrefecit, vt hinc inde asideat ceu cor ipsum medium complexuri; quorum perenni motu, atque agitatione tanquam flabello ventiletur, vt ita dicam, & æstus ille ingès mitescat. cum vero pulmones per aerem vicissim inspiratum, atque expiratum continenter moueri necesse fuerit; Thorax modo attolli, modo comprimi debuit, prout respirationis beneficium postulabat; quanquam dixerit aliquis, thoracem commodissime huic necessitati obtemperare potuisse, si musculis tantum, ac pelle abdominis more tegetetur. Verum enimvero salutari pariter, ac tutelæ tam nobilis, & principis membri consulendum fuit. parandumq; etiam, vnde musculi eiusmodi motui famulantes exoriri, aut quo inferi quàm appositissime possent. Sapientissima ergo rerum cunctarum genitrix natura eam constructionem molita est costis tali figura, atq; inarticulatione conflatis, vt leui momento contrahi, ac rursus dilatari possent: nec non etiam percommo- dam pulmonibus, & cordi sedem struerent. hinc facile sibi quisq; rationes comparare potest, quo satisfaciatur sciscitantibus cur Thorax non totus osseus, aut nulla ex parte osseus; vel denique cur ex

Quæ vertebrae concurrant ad constitutionem thoracis.

Thoraci maior à vertebrais quàm ab osse pectoris inest robur.

Thorax ex quibus constat.

Traçtatio de vertebrais proluxa est. Cor membrũ princeps in thorace. Pulmonum situs, & vsus.

Cur thorax modo attollatur modo comprimatur. Occurrit obiectio ni.

Cur thorax nõ est totus osseus. Cur nulla parte osseus. Cur ex costis per

interualla distin-  
ctis ex superiori-  
bus patet.

Costæ non sunt  
semper 24.

Costæ 13.

Costæ 11.

Sancta habebat vi-  
ginti quinque co-  
stas.

Sceletus Bartho-  
lomæi Stratenfis.

Tot costæ sunt in  
mulieribus quot  
in viris.

Cur costæ quâdo-  
que deficiât vel  
superet numerû.

Costarû numerus  
proportionem re-  
spodet vertebris

Aristoteles præci-  
pius naturæ filius  
Aristotelis in nu-  
mero costarû er-  
ror,  
Vndecim costas vi-  
dit Patauij,  
Quâdo primû Ana-  
tomiam Patauij  
publice professus  
est.

Ioânes Antonius  
Leonicius præce-  
ptor.

Sceletum misit ad  
Ioannem Baptis-  
tam Picinardû,  
Duodecim ut plu-  
rimû sunt costæ  
in Thorace vtrin-  
que.  
Quot sint costæ ve-  
ræ & vnde dictæ.

costis, ita per interualla distinctis fuerit efformatus. Verum costæ vigintiquatuor numerari solent: quando vtrunque latus duodecim admittit, qui tamen numerus nō semper idem reperitur. in aliquibus enim aliquando tredecim, aliquando vndecim costæ insunt: multo tamen rarius deesse videas, quàm superesse. Abundantem vna tantum costula mulierem Sanctam nomine à me publico Pifa- rum Theatro dissectam, ac demum ad sceleti formam compositam apud se detinet familiaris meus Bartholomæus Stratenfis medicinæ Pisis publice professor, quam aliquâdo expositam memini cernen- tes idiotas pene iureiurando affirmare solitos illam ipsam costam esse, qua fœminæ viros superant: cum tamen idem sit numerus costarum in viris pariter & mulieribus. Quòd si quandoque aut in his, aut in illis vel deficiunt, vel superant: id nimia materiæ copia, vel eiusdem inopia certum est prouenire: quemadmodum contingit, cum natura aberrans plures in manu, paucioresque quinq; digitis producit. Verum quod de thoracis vertebris superius dictum fuit, idem quoque de costis affirmandum est. Cum enim singulæ vertebræ geminas costas excipiant, & illæ, si modo variari numerum contingat, rarius pauciores, quàm plures duodecim existant, ita rarius imminuitur costarum numerus. quæ quidem varietas, æque in maribus, ac fœminis apprehendi solet. Quamobrem nō possum satis mirari Aristotelem alioqui præcipuum naturæ filium scribere ausum esse octo costis homines constare, atque apud aliquas nationes septem solummodo costis donatos esse. Vndecim mihi semel tantum dinumerare licuit, cum primum Patauij Anatomicam administrationem publice profiteri cœpi. Etenim cum Vessalius abesset, ac diutius in germania detineretur, ip̄ opus suum de Humani corporis fabrica imprimendum curaret: me tum Venetijs primario Chirurgo, ac præceptori meo Ioanni Antonio Leonico graui morbo laboranti omni officio, ac potius pietate assistentem vniuersa Schola Patauina dignum iudicauit, quem in Vessalij locum sufficeret, ac non contemnendo præmio accersuit. In ea igitur dissectione cadaver vnum vndecim costis munitum forte fortuna obtigit, cuius deinde ossa decocta, & aneis vinculis compacta ad præstantem medicum Ioannem Baptistam Picinardum Cremonam misi. Verum enimvero ad ea, quæ fere semper talia sunt, respicientes dicimus duodecim vtrinque costas thoraci constituendo adesse oportere, quarum aliæ veræ sunt, ac legitimæ nominatæ, aliæ vero nothæ, ac spurix. septem superiores veræ ideo dictæ sunt, quoniam vere pectoris ossi media cartilagine per Arthrodiam



throdiam vniuntur. Quinque vero aliæ sequentes nothæ sunt, quâdoquidem cum osse pectoris non coniunguntur; nam suis cartilaginibus ad os pectoris non pertingunt, sed superiorum verarum cartilaginibus committuntur, ac eo pacto inter se iunctæ vniuntur, præter duodecimam, quæ omnino ab vndecima, sicque à cæteris abscedit; neque tamen proprio adminiculo destituitur; nam cum septo transuerso colligatur, id quod interdum vndecimæ contingere solet. Costæ cum vertebribus etiam duplici (vti antea diximus) nexu coarticulantur, vt validius ibi inhærent: tamen si non omnes duplicem hunc articulum obtinent, quando postremæ duæ, vndecima scilicet ac duodecima vno tantum loco suis vertebribus committuntur: Desinunt omnes posteriore parte in processum quendam capitatum, sed acutum potius, quàm rotundum, quod caput in vertebrarum corpus immittitur, quæ latera sinus quosdā habent, sed diuerso modo celatos: non enim admodum alte excavati sunt illi sinus trium inferiorum costarum inarticulationi subseruientes. Habent præterea non longe à capite processum alterum; si quidem illæ vbi à capite progrediuntur: non parum excauantur, eo præcipue latere, quo protuberare rursus incipiunt, atque alterum hunc processum emittere, qui cum transuersis vertebrarum processibus validis vinculis alligatur. Quæ nihilominus vniendi ratio minime omnibus est communis: nam vndecima, & duodecima hoc secundo articulo priuantur: id quod etiam in prima costâ frequentius obseruatur. & quoniam huiusmodi processus, tam qui ad extremitates costarum prominent, quàm qui transuersis processibus vertebrarum inhærent appendicibus sunt præmuniti. Vbi etiam cartilago posita est, excipiendæ erunt, quæ vnico articulo committuntur: singulos enim appendices hæ tantum habent. constant costæ omnes partim ossea, partim cartilaginea substantia; nā totus earum ductus à vertebribus versus anteriora prope os pectoris osseus est, quæ vero cum osse pectoris legitimæ, aut cum aliarum cartilaginibus nothæ coniungi debent: cartilaginem multam producunt, vt ne dura cum mollioribus immediate componantur. Iam vero substantia illa ossea non vsquequaque est persimilis, aut æqualis: siquidem costarum extrema tenera quodammodo sunt, ac etiam fungosa, media vero ipsarum regio durior est, ac intus medullosa. Porro ab ea parte, quæ vertebribus vicinior est, graciliores existunt, ac veluti teretes; quanto autem magis ad pectus adducuntur, tanto quoque latiores fiunt. Præterea pars superior crassior est inferiore: vnde certam propemodum notam colligito, qua

Vniri per Archrodiam.  
Costæ spuriz cur dicantur.

Costa duodecima vbi alligetur.

Costa xj. quâdoq; colligatur cum septo transuerso.

Costæ quæ vertebribus articulantur & cur.

Vertebræ vndecimæ, & duodecimæ cū vertebribus articulationis quibus.  
Processus costarū posteriore parte.  
Sinus in lateribus costarum.

Processus alter.

Costæ vndecimæ & duodecimæ peculiare.  
Processus cum appendicibus.

Costarum substantia.

Cartilaginis in costarum cōiunctione vsus.

Costarū extrema.

Media.

Costæ latiores pectus versus.

Quo signo distinguantur costæ de-

- xtræ à sinistris. qua dextras à sinistris secernas. hanc vero tenuitatem, ac latitudi-  
 nem in omnium fere animalium costis deprehendere licet Leone  
 excepto. cuius quidem costæ crassiores, ac prorsus teretes visun-  
 tur, quæ nihilominus insignem cavitatem habent, in qua nisi me-  
 dulla cõtineatur, inanem omnino eam ipsam fore necesse est. quod  
 eo dictum est, vt obiter animaduertant operum naturæ studiosi,  
 quàm vere dicat Aristoteles leonum ossa penitus esse solida, nec  
 medullam intus continere: vt scilicet incredibile horum animalium  
 robur hoc argumento probaret. Equidem dum Florentiæ cum  
 Mazzolario Academiæ Pisane moderatore ad visendos leones ad- 10  
 ducti effemus, quos florentissima illa ciuitas suis claustris, & publi-  
 co loco, publico etiam sumptu alit, idq; in signum maiorum suo-  
 rum, ac perpetui cuiusdam hominis ergo: in eum sermonem deue-  
 nimus, an verum id esset, quod Philosophus de hisce animalibus,  
 ac præsertim de ipsorum ossibus tradidit; cumq; ille me dubium,  
 ancipitemq; cerneret, quid (inquit) obstat cur id oculis nostris nõ  
 exploremus; quando hic demortuorum leonum sepulchra adsunt?  
 itaque custodiæ præfectum rogauimus: vt per illum liceret ex leo-  
 num sepulchris ossa tantisper effodere, dum quod maxime cupie-  
 bamus intueremur. ille comiter non modo eruendi sed exportan- 20  
 di etiam quotquot voluimus copiam fecit. quamobrem nostro illa  
 arbitrato fregimus, ac medullosa conspicati sumus. quid quòd non  
 modo grandiora ossa amplis cavitatibus prædita, sed minora etiã  
 caua offendimus? Tales ergo leonum sunt costæ, quales antea di-  
 ximus. cartilagine item in quas costæ ipsæ parte anteriore defi-  
 nunt; diuersæ sunt. Etenim verarum cartilagine non adeo mol-  
 les cognoscuntur, quales sunt spuriarum: quod non sine consilio  
 factum intelliges, si prius consideraueris illarum cartilagine du-  
 riores fore, quæ cum duriore substantia, nempe cum osse pectoris  
 coniungendæ fuerint: inferiorum vero, quæ nothæ dicuntur, ideo 30  
 molliores, quoniã cum cartilaginibus copulari debebant: id quod  
 nobis res confirmat: cum in senio affectis corporibus intuemur su-  
 periores illas cartilagine, quæ cum pectoris osse cohærent; iam  
 pene totas in ossium naturam abiisse. Ad hæc costarum sextæ, se-  
 ptimæ, octauæ, nonæ cartilagine cæteris sunt longiores: at spu-  
 riarum tenuiores, angustiores, & in mucronem tendentes. Postre-  
 mæ tamen cartilago breuissima est, quemadmodum esse solet pri-  
 mæ, ac legitimæ: quanquam in eo differunt, quòd acuta illa est, &  
 gracilis, hæc vero lata, & ampla; sicuti etiam ipsa reliquas omnes  
 costas latitudine superat: quæ amplior etiam redditur, quo propius  
 ad os
- Leonis costæ qua-  
 les.  
 Ossa leonis non  
 sunt solida con-  
 tra Aristot.  
 Mazzolarius præ-  
 fectus academiæ  
 Pisane.  
 Florentia aluntur  
 leones.  
 Florentiæ adsunt  
 sepulchra leonũ.  
 Leonis ossa maio-  
 ra omnino infre-  
 git medullosaq;  
 reperit.  
 Cur cartilagine  
 costarum quæ cū  
 osse pectoris cō-  
 iunguntur sint du-  
 riores.  
 Cartilagine co-  
 starum notharū  
 quales & cur.  
 Cartilagine co-  
 starū verarum in  
 valde senibus pe-  
 ne ossæ.  
 Cartilagine co-  
 starum cōparant  
 tur inter se.



ad os pectoris accedit; secus autem alijs contingit, nam earum cartilagine initio sunt, quam in progressu ampliores: costis autem tam longæ cartilagine appositæ fuerunt, vt ex assiduo motu minus læderentur, ac vel dormientibus sursum attolli, itemq; deprimi pro pulmonum naturali agitatione possent. Quæ quidem cartilagine cum sint veluti vincula, quibus pectoris ossi costæ alligantur: non immerito costarum intervalla constituunt, quæ tamen inter se positione, ac situ variant: nam sex superiorum costarum cartilagine æquis à pectore spatij dehiscunt, atque eo modo æqualia costarum intervalla efformant. Sextæ autem parte solummodo inferiore, qua septimam respicit, & septimæ. octauæ, ac nonæ varius est ductus, & earum cartilagine sic adhærent, vt continuæ fiant, nec quicquam spatij, quo separantur, relinquunt. Præterea costarum verarum cartilagine in tuberculum, ceu capitulum quoddam terminantur, quo pectoris ossi vbi sinus est committi, atque inarticulari debuerunt. Costarum figura semicircularis esse videtur, vt duplici veluti medio, hoc est continuo duodecim vertebrarum ductu, ac pectoris osse circularem formam thoraci suggerant, quæ cum validior est, & constantior, tum ad plura continenda accommodatior. primæ superiores, ac postremæ inferiores, cum breviores sint medijs, hanc sphericam thoracis non minimum adiuuant: in quo illud obseruatu dignum est, quod superiores curuæ magis, postremæ autem lentiores, ac minus gibbæ sunt. Iam vero tam superiores, quam inferiores arciores existunt: mediæ vero longiores, ac latiores; primam tamen excipito: quæ utique omnium latissima est, ac breuissima. verum quia costæ interna sui regione membrana succinguntur, quæ Græcis *πλάσμα* dicitur; non decebat partem illam asperitatem vllam obtinere, quæ membranam hanc sensu non modico præditam lædere potuisset. Ea igitur parte leuissimæ sunt, quamuis sinus ibi adsit, qui ad imam earum regionem secundum longitudinem iacet, vt susciperet venam, arteriam, & neruum illac vnâ repentes. hæc autem interna cavitatis costis omnibus æqualiter haud inest: ea enim longius protenditur, ac profundior est in medijs costis; in primis vero, ac extremis paruus inest sinus: quoniam admittere debuit vasa, quæ minora essent pro costarum paruitate. quanquam iste sinus non ita conspicuus est in duabus vltimis costis, atq; etiam in prima, cuius locum interdum maior subit costarum tenuitas, vt vasis ipsis cefsisse quodammodo videatur. huiusmodi vasorum ductus maxime animaduertendus est propter affectum, quem Græci *εμπύημα* vocant: in quo si quando per

Cur costæ habeant tam longas cartilagine.

Cartilagine costarum ligantur costas osse pectoris Intervalla costarum.

Quo verè costæ articulantur ossi pectoris.

Figura costarum.

Vnde adueniat circularis figura thoraci.  
Cur thorax sphericus.

Costæ superiores sunt magis curuæ

Mediæ costæ quibus sunt latiores & longiores.

Prima costa latissima & breuissima est.  
*πλάσμα* succingit costas.

Interna pars costarum cur non sit aspera.

Vena, arteria, neruus quo sinu costarum suscipiatur.

Naturæ industria.

In empimaticis v-  
bi sic secandum.

Cur costæ sint as-  
peræ, extrinsec'  
vbi vertebris iun-  
guntur.

Insertio musculo  
dorsali longissimo

Insertio quiti mu-  
sculi thoracem  
mouentis.

Qua parte costæ  
superiora petat,  
qua deorsum fe-  
rantur, cū qua rur-  
sus attollantur.

per musculorum intercostalium incisionem pus exhauriendum fue-  
rit; sectio administranda est ad supernam costæ regionem, non au-  
tem sub ima eius parte, vbi resident vasa ipsa, quæ facile incidi pos-  
sent: nam maximum incommodum consequeretur. Cæterum co-  
stas extrinsecus parte posteriore, qua vertebris alligantur, asperas  
esse, ac inæquales necesse fuit, vt inde commodius prodeant liga-  
menta, quibus vertebrarum corporibus, ac earundem transuersis  
processibus alligantur; nec non ibidem tubercula emittunt, quæ  
vertebrarum sinibus articulationis gratia vniuntur, ac postquam  
à vertebrarum processibus non procul recedunt, tuberculo alio  
donantur, qui musculo dorsali longissimo est destinatus. eadem  
item costarum sede, qua distant ab ipsidem vertebrarum processu-  
bus trium prope digitorum interuallo, asperitatem, ac propemo-  
dum extuberantiam habent, quo ibi aptius inferi posset musculus  
thoracem mouentium quintus. illud addendum ab ea parte, vbi  
costarum radix est, atque illæ in vertebrarum corpora implantan-  
tur, vsque ad transuersorum processuum nexum costas superiora  
petere, inde vero deorsum flecti, ac tendere, atq; ad pectus cōuer-  
sæ cartilagini appropinquare, rursus sese attollere, & ita ad medium  
os pectoris, atque ad anteriora ferri. Sed hæc hætenus de costis.

10

20

### De Osse Pectoris. Cap. XX.

πέγρον. i. pectus.  
σῆθος regio pecto-  
ris.

Figura pectoris in  
homine.

Gal. error de nu-  
mero ossium pec-  
toris.

Ossa pectoris plu-  
rimum quatuor,  
minimum tria.

Gal. sententia de os-  
sibus pectoris ve-  
rificatur in simijs  
& canibus.

Aristotelis opinio  
cor esse in medio  
pectoris vera est  
de canibus & si-  
mijs.

Substantia ossium  
pectoris qualis.  
Ossa pectoris vni-  
untur per symphi-  
sim.

Ossa pectoris mo-  
uentur ad motū  
costarum.

**P**ECTORIS os, quod Græcis πέγρον, & σῆθος nuncupatur, quan-  
quam σῆθος ea regio potius intelligitur, quam ipsum os vna cum  
costarum cartilaginibus circumscribit, quam partem proprie pe-  
ctus appellamus: in humanis latum est, ac breue, ex paucioribusq;  
os constructum, quàm Galenus sensit: quando ille putauit tot in eo  
ossa esse oportere, quot essent legitimæ costæ, vt singulis esset, cui  
adhærescerent. Septem igitur illa sanxit; cum tamen plurimum  
sint quatuor, minimum vero tria; quod in simijs, & canibus falsum  
non est, in quibus verum & illud est, quod Aristoteles ait: cor me-  
diam omnino pectoris regionem tenere, quasi rectā in medio po-  
sitionem habeat. Sed de hoc infra, vbi de corde agemus. Pecto-  
ris ossium substantia minime solida est, qualis est reliquorum, ve-  
rum mollis, & fungosa: attamen ipsa ossa inuicem cartilaginis ope  
vniuntur per symphysim, cum nullum ne obscurum quidem mo-  
tum edant: licet costarum elationem, & depressiōem sequantur.  
huius pars superior cum cæteris amplior est, tum etiam crassior;  
vbi parte interna, quæ in medio residet, sinus exculptus est, vt  
cederet

30



cederet asperæ Arteriæ illac descendenti: eiusdem partis superioris latera sinibus pariter duobus abundare oportuit, extrinsecus tamen celatis, quibus exciperent iugulorum capita, quæ cum ijs articulantur. Pectoris os intus, extraq; læue deprehenditur, præterquam superne, vbi asperitas quædam existit, vnde nascitur, detineturq; musculus longus, & validus tendens ab huius ossis summitate ad mammillarem processum, in quem vtrinque implantatur. habet præterea alios sinus ab vtraque parte descendentes, quos subeunt costarum cartilagine modice quidem illæ in superficie protuberantes, sicuti supra diximus. quod iccirco factum est, vt aptius, ac tenacius inhærent. Ad imam eius partem extat cartilago quædam longa, & triangularis, nonnunquam bifida, aliquando etiam leuiter mucronata, quæ ideo plura obtinuit nomina, nam Græci Xiphoides dicta est, à Latinis autem clypealis, gladialis, ensiformis, & mucronata nominatur. Alij malum granatum appellant propterea fortasse quòd vnus balaustij formam referre videtur. Hanc nonnulli credere pro ventriculi oris munimento stare, & illud ab extrinsecis tueri, cum tamen os ventriculi ab ea regione multum distet; quod ad dorsum vergit, ac iuxta illud prorsus situm est.

20 Cum ergo mucronata hæc cartilago vsu hunc præstare nequeat, dicerem subditorum propugnaculum esse, ac præcipue septi transversi, quod eo loco maxime nerueum est, siue tendinosum; cuius partis læsio ad cor ipsum ibi pene substratū penetrare potest: namq; humani cordis inuolucrum, quod pericardion Græci vocant, diaphragmati adnexum est. pectoris ossis figura gladij, vel pugionis imaginem retinet: iccirco non defuere, sicuti Gal. lib. de Ossib. testatus est, qui totum id os gladiale nuncupauerint.

Sinus cedens asperæ arteriæ.  
Quibus sinibus costarum iugulorū capita excipiant.  
Cur asperum sit supæ os pectoris.

Sinus excipientes cartilagine costarum.

Cur cartilago costarum in superficie protuberent.

Figura cartilaginis quæ est in imo pectore.

Nomina cartilaginis imi pectoris.

Cur malū granatum appellet cartilago imi pectoris.

Cur Xiphoides nō potest tueri os ventriculi.

Os ventriculi sitū est iuxta dorsum. Verus vsus Xiphoidis.

Læsio septi transversi potest penetrare ad cor.

περικαρδιον ὁνομαζοιτο. i. inuolucrum cordis.

Pericardion est annexum cū septo transverso.  
Gal. lib. de ossibus

De Scapulis.

Cap. XXI.

30

ANTEQVAM ad scapularum enarrationem aggredieremur, dicendum nobis esset de cordis ossiculo. Caterum quando in humanis id minime reperitur, nihil huius interesse negotij arbitrati sumus. cuius tamen si quis nimium curiosus fuerit, illud in grandioribus animalibus quarere poterit, nempe bobus, equis, elephantis, ac fortasse etiam in ceruis senioribus, & si quidam negant, atq; illud quod pro ceruini cordis osse venale circumfertur, bubulum dicant. mirari profecto licet Gal. VIII. de Administr. Sec. lib. & VI. de Part. Vtilitatibus, ac demum in fine libelli de ossibus mentionem huius ossis fecisse, cum nec in simijs quidem, quas I crebrius

In corde hominis non est os.

Numero animalium in quorum corde est os.

Os de corde bouis pro ceruino venditur.

Gal. error.

Cor simiarum caret osse.  
Simiæ quid habe-

ant in corde loco  
officuli & vbi.

ομοπλαται. i. sca-  
pulæ.  
Numerus scapula-  
rum.

Situs.  
Vfus.

Forma.

Cur cōcauæ intro.

Spina scap.

Scapulæ articulā-  
tur cū iugulis &  
humero.

Nexus scapularū  
cum alijs partib.

Scapularum neces-  
sitas.

Brachij articulus  
abscq; scapulis in-  
firmus esset.

Scap. figura.

Quid sit basis in  
scapulis.

Processus scapu-  
larum.

Quomodo natura  
augeat sinum sca-  
pulæ excipiendo  
humero dicarum

Cerviæ capitis sca-  
pulæ.

Processus anchi-  
roides situs & v-  
fus.

crebrius secare solitus fuerat, os istud cernas: cuius loco membra-  
nas duas prope cartilagineas offendes, quæ inter arteriæ magnæ, &  
venæ arterialis radices instar firmamenti iacent. fed de his alibi.

Cordis itaque osse dimisso, ad scapularum explicationem deuenia-  
mus. Scapulæ quas *ομοπλαται* Græci vocant, geminæ sunt, altera  
dextram, sinistram altera parte obsidet; ambæq; posterius in supe-  
riore regione summis costis adhærent propugnaculi vicem geren-  
tes, non secus ac si tergum aliquod hinc inde porrigatur ad extra-  
neos ictus propulsandos. Propterea scapulæ scutatam formam ob-

tinuere: ac roboris maioris gratia interna parte, qua costas respi-  
ciunt, concavæ sunt, externa vero prominent, & spinam quandam 10

veluti iugum producunt, quod eminet, inq; superiorem partem as-  
surgit ad earum validitatem augendam. cum iugulis, atque humero  
aliorum ossium more articulantur: verum ad thoracis, cervicisq;  
vertebras, ad os hyoides, ad occiput, ac tandem ad costas muscu-  
lorum, de quibus postea dicemus, interuentu adnæctuntur. Ex

quibus omnibus colligitur necessaria scapularum constructio, quæ  
non modo posteriorem partem muniret, sed muscutorum etiā tum  
ortum, tum insertionem susciperet, ac deniq; quod caput est, bra-  
chij articulationem exciperet, quæ apprimè infirma, imbecillisq; 20

futura erat, nisi scapularum nexum, compositionemq; habuisset.  
Scapulæ triangularem figuram præ se ferunt, non tamen æquilate-  
ram: pars enim supra longe breuior est duabus hinc inde ad infe-  
riora tendentibus, quæ pariter in angulum obtusum desinunt: Ita  
quod ima hæc portio tantum spatij occupat, vt ego magis eam pro  
basi accipiendam putem, quam latus illud, quod ad spinam ver-  
git. tribus processibus donatæ sunt, quorum vnus breuissimus  
est in caput latum, sinuatumq; desinens, excipiendo summo hume-  
ro paratus. propterea cum hic sinus longe minor sit, ac depressior,

quam altum, & rotundum humeri caput requirat; operæpretium 30  
fuit, ne humerus quocunque leui momento exiliret; huiusmodi si-  
num adaugeri. Neque enim magis scapulæ substantia poterat ex-  
cauari. Ergo cartilago crassior ad internam sinus labiorum partem  
obducta, atq; exporrecta magnam, & idoneam profunditatem cō-  
stituit. Id vero sinuatum scapulæ caput sua cerviçe non caruit,  
quamuis ea modica, & brevis appareat. Ab hoc processu nō lon-  
ge alter est coruini rostri, aut anchoræ persimilis, quem ideo ancy-  
roides, aut coracoides appellant, per quem brachium à costis di-  
ducitur, ac distat. hic os humeri in sua sede continet, atq; ad eius  
partis validitatem confert. in hunc tandem inseritur musculus, qui  
ad an-



- ad anteriora scapulam trahit, & qui cubitum flectit. Tertius processus ille est, quem iugi, seu spinæ speciem referre diximus: longior, ac prominentior; quocirca dictum fuit à Græcis ἀκρόμιον quasi humeri apex, & summitas. Atque ita ab Hippocrate superior hæc articuli sedes perpetuo nuncupatur. cum hoc processu clauicula coniungi debuit: quamobrem illo fere omnia animalia carere videas, quæ clauiculis priuantur. Inter acromion & clauiculam Galenus voluit quoddam os dari, idq; in solis hominibus addens acromion à nonnullis & κατακλιδα vocari, quod mihi adhuc non est com-
- 10 pertum, nisi si quis Galenum Hippocratis auctoritate tueatur, qui lib. de Articulis idem sensisse videtur. quem tamen fortasse non inapte dixerimus per tertium illud os appendicem quandam intellexisse, quæ ad Acromij extremitatem assidet, & in iunioribus facile deprehenditur. Quod & si detur, nescirem tamen cur Galenus asserere potuerit solos homines eo ipso osse abundare: cum nihilominus in simijs reperiatur. Cæterum acromion scapulam validiorem reddit, & locum clauiculæ constituit, cui commode annexatur; nec minus etiam tutam, atque aptam musculis inserendis sedem parat. Scapulæ non vndique sunt æquales, nam toto eo ductu, qui
- 20 ab ancyroide processu versus spinam flectitur, ac descendit ad basim vsque tenuissimæ sunt, ac multo etiam in medio tenuiores. At in ipsis processibus, atque eo latere, quo brachium respiciunt: insignem crassitudinem ostendunt: vbi eorum substantia medullosa, fungosaq; conspicitur. Neq; etiam desunt foramina venarum, arteriarumq; ingressui destinata, quæ ipsis scapulis nutrimentum deferant. Interna scapularum regio sinus transuersim oblique tendentes habet, longo temporis progressu ad crebrum costarum motum, quibus adhareret, celatos. Extra tam etsi gibbæ sunt, ac protuberant, non minimos tamen sinus obtinuerunt, quatenus musculi
- 30 los excipiunt, quanquam ijs ipsis cedere illos omnino oportuit. Vbi animaduertendum est prudentissimæ naturæ artificium. Etenim ne propter istos sinus scapulæ nimium tenues fierent: cernere est ab altera parte os succreuisse ad augendas, firmandasq; partes huiusmodi sinibus è regione subiectas. Iam vero in scapulis appendices quinque sunt. Appendices vero discernuntur. Tres enim ad latus internum iuxta spinæ deductum, atque ad basim adhærescunt, vnde musculorum quorundam origo trahitur. reliquæ duæ ligamēta suggerunt, quibus vinciuntur humerus acetabulo, clauicula acromio; nimirum acromion harum duarum appendicum alteram sibi vendicat, alteram acetabulum. Præterea in summitate, nempe

Processus acromion cur dicatur.

Hippocrates quid vocet Acromion

Clauicula iungit cum acromio. Clauiculis carētia non habet acromion.

Opinio Galeni de osse inter acromion & iugula. κατακλιδα quid vocet Gal. Hipp. lib. de Arri. Galenum excusat.

Galenū inexcusabilem reddit.

Vsus Acromij.

Scapularum inæqualitas in tenuitate & crassitie.

Scapulæ vbi fungosæ & medullosæ. Foramina venarū & arteriarum. Interni sinus scapulæ.

Naturæ artificium in sinibus externis scapularum.

Appendices quinque scapularum.

Appendicum scapulæ vsus.

Cauitatis inter a-

acromion & supremam scap. vñs.

Foraminis orbicularis vñs.

inter acromion, & supremam scapulæ partem concavitas non minima reperitur, facta vt musculus commode cunctos circumactionis humeri motus efficiat. In ea item regione foramen fere orbiculare vasis cessurum reperitur.

### De Clauiculis. Cap. XXII.

Cur tractādū erat de iugulis post os pectoris.

κλειδες. i. clauiculæ

Clauiculæ hærent superiori pectori

Alios sequitur in ordine tracta. de clauiculis.

Iugulorū descript.

Cur distæ clauiculæ.

Vñs.

Cur furculæ dicuntur clauiculæ.

Iugula cur dicantur Iugulari.

Substantia clauicularum qualis.

Clauic. figura.

**D**IGNVM profecto nobis videbatur, vt ab eo capite, in quo de osse pectoris egimus, statim illa ossa explicaremus, quæ à Græcis κλειδες, à nostris autem clauiculæ, siue iugula dicuntur: propterea quòd illæ ad superiorem pectoris partem adhærent, & cum primo eius osse vtrinque coarticulantur: scapulæ vero nullum peculiare munus habent cum pectore, neque nisi mediantibus clauiculis eidem vniuntur: verum quando id parum refert: neq; rei naturâ hic ordo tractationis immutat; ab aliorum instituto minime recessimus. Scapularum itaque præmissimus descriptionem, quam nunc iugulorum enarratio sequetur. A supremo pectoris osse singula hinc inde ossa discedunt flexuosa, & rotunda, quæ transuersim delata sensim supra summum humeri caput ad scapulæ processum ascendant, quem acromion vocari diximus. Hæc ossa clauicularum nomen obtinere: quoniam humerum cum scapula coarticulatum ita claudunt, vt ne ad thoracem, pectusue brachium delabi possit, atq; adeo dehiscat, distetq;: vt ad pectus manus admoueri, suasq; innumeras propemodum actiones edere valeat. quod quàm vtile, atq; necessarium sit: vnicuique constare potest, si vel ab humano pectore clauiculas demerit, vel bruta clauiculis priuata accurate fuerit contemplatus. quo factum est, vt vulgares furculas appellent ad egregium hoc ipsarum munus alludentes, cum veluti fulcra quædâ ab osse pectoris deducendo, sustinendoq; humero parata sint. alterum eisdem iugulorum nomen Latinis inditum est: quia fortasse iugi, quod bouum collis alligatur, similitudinem referant. Vnde iugulari animal tunc dici solet, cum venæ, atque arteriæ diffecantur, quæ sub his iugulis positæ sunt. Clauicularum substantia intus fistulosa, fungosaq; tenui crusta ossea obtegitur. maxime reliquorum ossium frangibilis est, earum figura non multum differt à nostro *s* ita delineato, bis enim clauiculæ curuantur, bis gibbæ, bis etiam sinuæ fiunt. nam ab eo ductu, qui à pectoris osse incipit, ad mediam vsque regionem intrinsecus cauæ sunt, extrinsecus vero conuexæ tuberis in morem. At à media regione ad Acromion opposito se habent modo; vbi latiores apparent, & capite sunt depressiore, quo

10

20

30



quò cum acromij summitate coniunguntur. Verum alterum caput rotundum quodammodo existit, & magis ea parte, quæ sterni sinu excipitur. ad vtrunque caput appendices assident suis obductæ cartilaginibus: adnotareq; oportebit alteram superaddi cartilaginem illi capiti tantum, quod in summo pectoris osse residet: quanquam vterque articulus ad Arthrodiam sit referendus. Cum autem ex clauiculis muscoli partim exoriantur, partim ad eas terminentur: iccirco nonnulla in eisdem tubercula, nonnullas lineas, atque asperitates cernimus inferiore præsertim parte, qua costas respiciunt; atque hæc omnia musculorum gratia. Quòd vero parte anteriore potius, quàm posteriore extrorsum promineant: summo consilio factum intelliges, si diligentius inspexeris ea regione subiecta esse non minimi momenti. Vasa, nempe arteriam insignem, ac venas cum axillarem, tum etià cephalicam, quas comitantur nervi quinq; ad manum progressuri, quibus omnibus incuruata clauiculæ pars non inconcinne cedere, ac simul propugnaculi vicem præbere videtur, clauiculæ suis foraminibus non caruere; vt illac penetrarent vascula nutrimentum transmittentia.

Clauic. appédices.

Articuli clauicularum referunt ad Arthrodiam.

Cur ante, quàm retro promineat magis clauiculæ.

Clauicula tuetur arteriam, venam axillarem cephalicam, &amp; quinq; nervos.

20

## De Humero. Cap. XXIII.

**M**ANVM Hippocrates totum id appellat, quod à scapula ad extremitatem vsque digitorum porrigitur: quod ex pluribus ossibus constat. primum inter scapulam, & cubitum residet, humerum omnes vocant: deinde cubitum constituentia vlna & radius, his succedit pars illa, quam proprie manum dicimus, quæ brachialis, postbrachialis ossibus, ac summis digitis construitur. Verum à summo humero ad extremam vsque manum totus ille ossium ductus humeri scilicet radij, atque vlnæ brachium nuncupatur. His hoc modo distinctis ad singulas partes explicandas accedamus.

Manus qd sit Hip.

Humeri situs.

Cubitus cõstat ex vlna &amp; radio. Brachiale.

Postbrachiale. Summi digiti.

Brachium quid vocetur.

Humeri descript.

Teres longum.

Galenii error.

Sacrum os est humero manus. Ossa iliorum sunt latiora humero. Tibia est longior humero.

Sinus. Cur humerus est inæqualis.

30

Ergo humerus illud os erit, quod parte superiore cum scapula, inferiore cum radio, vlnaq; coniungitur. vnicum est, teres, longum, ac manus ossium maximum, non tamen omnium, femore excepto maximum: vt Galenus scripsit: quandoquidem neque magnitudine sacrum, neque latitudine iliorum ossa, neque longitudine tibiâ superet, à qua ceteris quoq; dimensionibus facile vincitur; & quâuis teretem figuram ostendat, tamen sinibus non est expers; quasdam planities, ac summitates in longum producit; & inæqualis est ob musculorum nexum, vt alij inde ortum ducant, alij ibidem implantentur. pars superior in caput magnum, rotundumq; desinit, cui

- Humeri appendix.** cui adnata est appendix nō exigua ex ea parte maxime cartilaginea crusta oblita, quæ in scapulæ acetabulum inferitur. quoniam vero caput id altum necessario profundum sinum postulabat, quod in scapula fieri minime poterat: ideo circa scapulæ sinum natura addidit altam cartilaginem, atq; eminentem, quæ sinum ipsum maiorem efficit, & articulationem hanc in omnem fere motum proniorrem reddit. supra id caput rotundum duo processus eminent, qui oblongo, insigniq; sinu dirimuntur: ex his anterior posteriore minor est. amborum maxima portio in appendice continetur. illa vero inter ipsos interiecta cavitatis musculi cedit, qui à scapula duplici principio fluens hæc iter habet deorsum ad cubitum flectendum
- Cartilago augens sinum scapulæ: ex capite humeri.** inferior humeri pars capite haud rotundo sua appendice delatus. inquit Gal. tum etiam Vessalius, qui opinatus est hanc humeri partem appendice omnino priuatam esse: at mihi semper conspicua fuit in natu minoribus. Cæterum pars hæc inferior ampla est, ac in tria veluti capita exurgit, ijsq; in æqualibus, ac distinctis, quæ ideo trochlearum formam effingunt, quod à lateribus eminent duobus sinibus leniter concauis apposita; tertio, quod est in medio, eosdem sinus diuidente: in quorum sinuum alterum incumbit vlna, & circa eundem flectitur, extenditurq; cubitus. qui motus vt commodius fieri possit: pars huius humeri capitis posterior ampliter excauata fuit: vt superior vlnæ processus ibi consideret: vt absoluta fieri posset cubiti extensio: sicuti cum flectimus, ne quicquam impedimento esse possit. sinus quoq; paratus in anteriore, atque interna eiusdem capitis sede, quo pertingit secundus vlnæ processus, dum cubitus ita contrahitur, vt extrema manus fere humerum contingat. externo humeri capiti assidet sinus, qui positus est in superficie radij, cui inhæret multa obductus cartilagine. at eius caput, cum sit depressum, & expansas oras habeat: interna ora sinum alterum obsignat, circa quem & ipse agitur, ac demum vlnæ validitati confert; quando illi ita annexitur, vt sinum quandam subeat in interna secundi eius processus regione. At propria radij cum humero articulatio maxime spectat, vt manum oblique ad latera deducere valeamus. cum vero vna cum brachio extenditur, aut flectitur; talis vtique motus ab vlna provenit sequente radio. hanc humeri cum cubito coniunctionem non bene Aristoteles nouisse videtur: quando existimauit articulū illum, quo cubitus cum humero connectitur: contra se habere in quadrupedibus, atq; in humanis habeat. Siquidem affirmauit homines antrorsum, quadrupeda retrorsum cubitum flectere. At nō recte
- In appendice processus humeri.**
- Caput inferius humeri habet appendixem.** Gal. & Vessalij error.
- Inferioris humeri descriptio.** Trochlearū forma
- Vlna & cubitus quomodo articulantur humero.**
- Vbi sit excauatum caput inferius humeri & cur.** Extensio cubiti. Flexio. Sinus vtilitas. In magna cubiti contractione quo pertingat secundus vlnæ processus.
- Alius sinus.**
- Vlna propria articulationis radij cum humero.**
- Qui motus ab vlna proficiscatur.**
- Aristotelis error.**
- Cubiti flexio di-**



recte animaduertit, quem situm hæ partes in brutis teneant. non enim cubiti, atque humeri illa est articulatio, quam ipse putat; sed cubiti, ac brachialis compositio, de qua sequenti capite dicemus. Latet autem in brutis ipse humerus, quem si recte consideres: non aliud tum articulationis, tum motus genus in brutis reperies, quàm in hominibus: aut statuendum erit eiusmodi animalia humero destituta esse: Quod omnino falsum est. hæc tria humeri capita sua cartilagine crustæ ritu munita sunt, quorum protuberantius est internum, ac externum maius quodammodo cernitur. præter hæc extat

10 duo processus ad vtrumq; latus, quorum internus longe maior est. His hærent principia muscutorum tendentium ad extremam manû. quod autem humeri os tota sui longitudine modo gibbum, modo simum cõspiciatur; talem formæ varietatem varius muscutorû vsus postulauit, sicut clarius ostendemus: vbi musculos manum mouentes explicabimus. os idem intus cauum est, ac medulla refertum, quam pariunt venæ per foramina in eo sita subeuntes.

uerfa in homine & brutis Aristot. Cubiti & brachialis cõpositio est quæ Aristoteles esse cubiti & humeri.

Humerus in brutis latet.

Trium humeri capirû in interiore hum. descriptio.

Processus duo & eorum vsus.

Cur humerus in longitudine sua modo sit gibbum modo simum.

Humeri cauitates in medulla. Foramina per quæ venæ.

### De Cubito. Cap. XXIII.

20 **C**UBITI nomine totam illam partem intelligimus, quæ inter humerum & brachiale ex duobus ossibus constituta est longis illis quidem, sed humero minoribus. appendicibus vtrinq; donatur: verum parte superiore, qua cum humero articulantur, appendices breui coalescunt, atque in ossium portiones transmutantur. tam hic, quàm in ima humeri parte Vessalius Galenum sequutus perperam putauit appendicem non adnasci. parte autem inferiore diutissime in ambobus appendices seruantur. horum os alterum, quod est inferius; vlnam, quod etiam cubiti nomine sæpe numero donatur; alterum, quod superius existit, radium appellamus. hæc cum inter se, tum maxime humero, ac brachiali iunguntur: quamquam vlna parte inferiore radio tantum committitur, sicuti mox dicemus. Superior ergo pars vlnæ crassior in duos processus oblongos triangulares, sed obtuso potius, quàm acuto angulo, tam etsi Galenus acutos eos accipiens coronas appellauit, terminantur. hi processus ita prominent, atque attolluntur: quoniam sectum est id spatij, quod in medio residet, ac in semicirculi speciem excavatum, qui sinus protuberantibus hisce processibus conclusus C Latinum refert, quod nõ absimile est, c Græco. Propterea Galenus Sigmoides nuncupauit. Factus autem fuit iste sinus, vt aptissime processus ipsi sinum imi humeri cõplecti, & circa illum verti possint.   
Quam-

Cubitus quid significet. Structura cubiti qualis.

Cubitus habet appendices vtrinq;. Superior appendix cubiti breui sit ossæ. Gal. & Vessalij error. Appêdix inferior cubiti & radij diu durat. Vlna dicitur etiâ cubitus. Radius.

Vlna & radius committuntur inter se, & cum alijs. Vlna inferius committitur radio. Superior vlna qualis Galeni error i processibus vlnæ.

Sigmoidis vsus.

Linæ in medio  
Sigmoidis vsus.

Humerus & vlna  
articulatur Gyn-  
glimo.

Sinus excipiens ca-  
put radij.

Quomodo vlna cū  
radio parte supe-  
riore articulet.

Galenī error.

Styloides proces-  
sus non agit ma-  
num in obliquū.

Vessalius laudatur  
in explicatione  
vsus ityloidis.

Dictum Gal. in fi-  
nia verificatum.  
Cartilaginis cras-  
sæ, & mobilis  
utilitas.

Processus vlnæ uti-  
litas.

Vlna exterius qua-  
lis.

Sinus ex quibus  
musculi.  
De Radio.

ῥαδῖος. i. radius.  
Radij situs.

Capitis superio-  
ris & inferioris ī  
radio cōparatio.

Caput superius cū  
biri articulat cū  
humero, inferius  
cū brachiali.

Radius agit manū

Quamobrem cernere est in medio Sigmoidis lineam prominētē, quæ funiculi modo, vt in trochleis contingit, rimam insitit, ne huc illuc vlna dilabatur, vnde mutuus exoritur vtriusq; partis osium ingressus: ita quòd huiusmodi articulatio Ginglymo iure tribui potest. ad priorem processum, qui posteriore minor, interna parte, quā radium respicit sinum offendimus, in quem incumbit radij caput: verum cum ab his processibus recesseris, vlna fit accliuus, ac sensum attenuatur: vsque dum in caput desinat, quod ad internam partem magis aliquantulo propendet; vbi leuem radij sinum subiēs cum eodem articulatur. Quòd autem Gal. senserit eiusmodi caput cum brachiali coniungi: id ego nullo vnquam modo assequi potui: cum videam nullam brachialis portionem ad infimum vlnæ caput adhærescere. Præterea cum ex hoc ipso capite extrinsecus producat processulus quidam tenuis, oblongus, & acutus, quem ideo styloidem Anatomici vocarunt; Hunc Gal. iudicauit in externum brachialis os infigi, atq; ea ratione conferre ad manum in obliquum agendam. Quod à veritate alienum esse omnino experimento comprobatur. Hic enim processus tantum abest, vt hunc vsum præstet, vt impedimento sit, ne manus ad eum modum moueri queat: sicuti optime Vessalius probauit, vbi cubiti historiam recenset. neq; non hic processus à quarto brachialis ossē multum distat, licet Gal. octauum innuere videatur, quod in simia veritatem habet; at in homine tertium quoq; brachialis os respicit. Interfidet tamen quædam crassa, mobilisq; cartilago, quæ cum spatium id repleat, quod interpositum est, vlnam cum brachiali coniungi innuere videtur, cum tamen minime coniungatur. Verum hic processus non nihil roboris ipsi brachiali addit, ne prorsus in eam partem decidat: quādo tantum ab ipso vlnæ capite dehiscit. Iam vero vlna parte exteriori leuis est, & admodum teres, parte vero qua radio respondet, in tenuem, asperamq; lineam secundum sui ipsius longitudinem extenditur, & humiles quosdam sinus habet. ex quibus locis nascuntur musculi pollicis famulantes, nec non musculus ille, cuius beneficio indicem à pollice abducimus. Alterum sequitur os superius, quod Græcis ῥαδῖος dicitur, nos radium vocamus, exteriorem fere totam cubiti partem occupat, in capita crassiora desinit, sed superius minus est, ac rotundius inferiore: inferius autem & maius est, & latius. quod non temere factum intelligitur, si perpendatur, quomodo superius cum humero, inferius cum brachiali articuletur. Nam cum humerus ibi desinat in caput quodammodo rotundum; depressius, ac sinu præditum radij caput exegit, qui quoniam in

prorum



pronom, atque supinum oblique manum agere debuit: rotundum sui capitis sinum rotundo humeri capiti inhaerere oportuit, quo circum agi commodè, munusq; id obire possit. cui rei non parum deseruit sinus ille, quem diximus insculptum esse ad internam vlnæ prioris processus regionem, cui asidet interna radij capitis portio. Nec minus fit, vt per hanc geminam articulationem leui momento cum sequatur, tum etiam adiuuet cubiti flexionem, & extensionem. Id caput copiosa obductum est cartilagine ad motionis agilitatem augendam. In ceruicem descendit teretem, oblongamq; ad cuius extremitatem, qua vergit in vlnam, tuberculum emittit, quo terminatur musculus primus flectendi cubiti auctor, nec non etiam recipit alterius portionem eodem munere fungentis, qui fere totus in superiorem vlnæ partem implantatur. Cæterum inferior pars radij (vt diximus) capite est maiore, depresso, ac lato, appendicis ope non minimum aucto, quod vel in grandioribus conspicuum est: in superficie non modo deprimitur; sed etiam in amplum, ac geminum sinum excauatur, in quo insident, atque inarticulantur duo suprema brachialis ossa: quibus quoniam reliqua brachialis ossa arctissimo ceu vinculo vniuntur: merito dicere possumus totum brachiale eius vnus articulationis opera cum ipso radio copulari: vnde manum ipsam modo sursum, modo deorsum inuertere licet, eamq; itidem ad latera ducere. cum vero in pronom, ac supinum oblique manum flectimus: id radij merito consequitur; quando is solus quiescente vlna mouetur. At quemadmodum radius cubiti flexioni suppetias laturus ab vlnæ sinu, cuius præcipuus est cubiti motus, superne suscipiebatur; ita etiam quasi mutuam vlnæ operam requirens in ducenda manu, dum cubiti motum sequitur, eius inferioris capitis insertioni sinum ipsa quoq; parauit. Quamobrem supra suscipitur ab vlna, infra vero vlnam suscipit, quam tamè compositionis speciem sub Arthrodia ponendam existimo. inferius radij caput parte anteriore planum pene redditum est, atque in decliue tendit, vt ita substratum esset, liberumq; aditum præberet muscolum tendinibus, qui secundum, ac tertium digitorum articulum flectendi partes sibi vendicant, eodem modo posterior pars tendinibus cedit muscolum ad exteriores articulos tensionis gratia transeuntibus, propterea plures in ea sinus cõspiciuntur. exterior eiusdem capitis portio pollicem spectans mammillarum quandam processum promit non aliam ob causam, quàm vt ea parte brachialis luxationem difficillimam redderet. Ad hæc radius extra non secus atq; vlna teres est, ac leuigatus; intus autem acuta acie, quæ longo

in pronom & supinum oblique.

Sinus ad internam regionē prioris processus vlnæ vsus

Cartilaginis multæ circa radium vsus.

Ceruix.  
Tuberculum.

Appendix capitis inferioris radii vel in grandioribus videtur.

Sinus excipieduo summa ossa brachialis.

Quomodo manū sursum & deorsum inuertamus. Quomodo manū i pronom ac supinum oblique vertamus.

Quo radius adiuuat flexionem & extensionem cubiti.

Ab vlna est præcipuus motus cubiti. Quomodo radius ferat opem vlnæ in ducenda manu.

Radius supra suscipitur ab vlna, infra etiā suscipit.

Cõpositio vlnæ & radij sub arthrodia.

Inferius caput radij cur planū, & in decliue tendat antierius.

Cur plures sint sinus in posteriore parte inferioris capitis radij.

Processus mammillaris i radio vsus. Radius extra qualis.

Lineam in radio  
comparat lineæ  
in cubito.

Lineæ in radio, &  
cubito vltus.

Membrana.

Ossa cubiti cur  
caua.

ductu extenditur è regione alterius lineæ, quam eidem perfimilem in interna vlnæ parte descripsimus. Ex harum linearum alterutra fluit membrana quædam in alteram lineam inferenda, qua ambo hæc ossa, quæ laxius à se inuicem dehiscunt, colliguntur, confirmeturq; . quæ membrana simul etiam interstitium quoddam exhibet, quo interiores cubiti muscoli ab exterioribus separantur. ambo hæc ossa cubitum constituentia caua intus sunt, ac medullosa, vt & leuiora sint, ac debito pabulo minus frustrentur.

De Brachiali. Cap. XXV.

10

Summa manus di-  
uisio.

καρπος. i. brachiale  
quid.

Brachialis ossa 8.

Prima acies bra-  
chialis ex quatu-  
or ossibus.

Secunda acies of-  
sium brachialis.

Ligamenti carti-  
laginei in ossibus  
brachialis vltus.

Cur aliqui credi-  
derunt ossa bra-  
chialis esse con-  
nata.

Ossa brachialis  
non conueniunt  
inter se figura.

Ossa brachialis ca-  
rent proprio no-  
mine.

Primum os bra-  
chialis.

Secundum os.

Tertium os.

Quartum os.

Quintum os bra-  
chialis.

Sextum os, septi-  
mum, & octauum.

**S**YMMAM manum alibi tres in partes diuifimus in brachiale, post-  
brachiale, ac digitos; qui & ipsi suis articulis constant. A pri-  
ma igitur parte exordientes dicimus brachiale, quod Græci καρπος  
appellant, totam eam ossium struem intelligi, quæ inter cubitum,  
& postbrachiale sita est, quæ octo ossibus constat: & ea duplici or-  
dine iuncta duas veluti acies constituunt, quarum vtraque quatuor  
ossa capit. prima ossium acies parte superiore radij capiti ita com-  
mittitur, vt primum, secundumq; ossiculum in sinum ipsius capitis  
inferatur: tertium autem paulum inhærere videtur: sed quartum  
nulli alteri osi iungitur, præterquam tertio, cui soli pertinaciter an-  
nectitur. Secunda item acies parte posteriore cum postbrachiali ar-  
ticulatur, priore autem cum cæteris brachialis ossibus, quæ inter se  
cartilagineis ligamentis ita connectuntur, vt connata esse videatur.  
quæ ligamenta cum nonnulli detrahare minime studuissent, hæc of-  
ficula non inuicem iuncta, sed connata prorsus credidere. ossa hæc  
adeo varia sunt, vt nulla ex parte conueniant, ac singula quæq; va-  
riam formam præ se ferant, vt, quanquam non facile inuenias qui-  
bus illa rebus recte compares, non ideo tamen difficile sit discernere,  
& quæ, qualiaq; sint, diiudicare. cum vero proprijs nominibus  
singula careant: solo numero, atque ordine dignoscuntur: eaq; ra-  
tione perdiscitur, quomodo inuicem, ac etiam cum alijs ossibus  
componantur. Is ergo erit ordo istorum ossium. Primum bra-  
chialis os illud est, quod in priore acie constitutum ab interno late-  
re versus pollicem nobis occurrit. Secundum, quod illi statim suc-  
cedit. Tertium, quod cum secundo cohæret ad externum latus  
versus minimum digitum, aut cubitum vergens. Quartum, quod  
omnium minimum vni tertio annectitur. Quintum, quod in po-  
steriore acie iuxta pollicem primo asidet. Sextum præterea, se-  
ptimum, atque octauum ita numerantur: vt ordine consequuntur.

Iam



- Iam vero non solum numero, ac figura, sed etiam magnitudine differunt. Maxima omnium sunt primum, ac septimum, quorum vtrum maius sit, vix discernere queas. His minus est secundum, quod tamen cæteris maius est, deinde sequitur octauum. Postea quintum, cui succedunt sextum, ac tertium, quartum minimum est omnium, vti paulo ante diximus. Quod autem ad ipsorum vnionem attinet, sciendum est primum os, præterquam quòd cum radio articulatur (superius enim cum in rotundum protuberet, in illius capitis sinum subintrat) inde sensim adhærere secundo, eiusq;
- 10 finum subit deinde cauo admodum sinu septimi tuber rotundum admittere, ac inferiore parte quinto, sextoq; coherere. Cæterum secundum & ipsum superne radij sinum ingreditur, parte anteriore cum primo, inferiore autem, quâ cauum est, cum septimo, posteriore cum tertio connectitur, ac ita tertium secundo iungitur; ac præterea inferiore latere octauum attingit; posteriore sed interno versus vnam quartum. quod quidem quartum alteri osi non committitur. Quintum superiore parte primo, posteriore sexto, ac prominenti secundi postbrachialis (vt interim quinq; eius ossa cõstituiamus) processui adhæret. At inferior eiusdem portio primum
- 20 postbrachialis os, quod Galenus primum articulum pollicis facit, excipit. Sextum primo, quinto, ac septimo, quâ illa respicit, nititur: inferiore autem tubere in angularem postbrachialis ossium sinum inferitur, ac subinde vergit ad tertium eiusdem postbrachialis, cuius primam, & longius productam portionem sustinet. Septimum omnium ceu medium primum, secundum, sextum, atq; octauum, terminos habet, eisdemq; non pari ratione committitur, cum alijs simis, alijs gibbis lateribus existat. Verum latere inferiore cum tertij, tum quarti, postbrachialis ossium portionem fulcit. Demum octauum, quod est altissimum: reliquis lateribus secundo, tertio, ac septimo copulatur. at inferiore parte basim præstat quarto, & quinto postbrachialis ossibus, quibus cum idem coarticulatur. Atque hi sunt veluti quidam termini, quibus brachialis ossa discernuntur, ac etiâ cum inter se, tum vero cum alijs vniuntur. Brachialis ossa motu non carent, tamen nullus ijs adest musculus peculiaris eorum motus auctor: & ob id obscurus censetur, ac sensus nostros omnino latet. Totius vero brachialis motus in agendo extremam manum, tum ad latera, tum in primum, atque supinum recta consumitur. Huic edendo motui præsto sunt musculi, de quibus loco agetur suo. Quamobrem dicimus Brachialis ossa cum radio per Diarthrosim secum inuicem, per Synarthrosim
- 30 cum

Cõparant in magnitudine ossa brachialis iter se.

De vnione ossium brachialis. Primum.

Secundum.

Tertium.

Quartum.

Quintum.

Galen.

Sextum.

Septimum.

Octauum.

Epilogus.

Brachialis ossa ob scure mouentur.

Brachiale mouet manum ad latera in primum & supinum recta.

Articulatio brachialis cum radio secunda, & cum postbrachialis qualis.

Totius brachialis  
descriptio & usus

Ligamentum ex  
processu octau  
ossis.

Brachiale exteri  
quale & cur tale.

Quatuor ligamen  
torū à brachiali  
parte extrinseca  
usus.

Ossa brachialis  
sunt solida.

In sinia verificat  
quod Gal. dicit  
de sinu quarti os  
sili.

cum postbrachialis ossibus partim per Synarthrosim, partim vero per diarthrosim esse coniuncta. Cæterum brachiale parte interiore latum, ac profundum sinum habet, quo excipit non paruos musculorum tendines in digitorum articulos inferendos. ibique claudit, ac ne defluant quodammodo continet validum ligamentum, quod ex processu longo octauī ossis producitur, ac in latiusculam quinti ossis portionem è regione illi positam inseritur. Hic autem processus introrsum pendet, vt ad hoc veluti munus paratum sese ostendat. At exterior brachialis pars tendinibus quidem substrata est ad digitos extrinsecus adeuntibus, nihilominus gibba est, neq; 10 cavitatem vllam insignem præ se fert, quando illi ipsi tendines cum longe minores interioribus existant, minus quoq; spatij occupare debuerunt, ac præterea decuit externam regionem in circularem formam diduci, internam vero in planum redigi. Verumtamen ab extrinseca brachialis regione prodeunt quatuor ligamenta, quæ dictos tendines vinciunt, ac in sua sede continent: de quibus alibi dicemus. Scire licet hæc ossicula, quamuis exigua sint, ac dura: non tamen solida prorsus existere: cauernulas enim intus habent medulla oppletas, inter quæ durissimum, ac pene solidum est, quod quarto loco numeratum fuit. cui addendum existimo, quod Gal. 20 asseruit, nimirum ossiculum id sinu quodam esse præditum, in quem immitteretur processus ille styloides ab vlnæ capite productus: de quo superiore capite mentionem fecimus. Sed hoc in humanis locum minime habet, in quibus neque ossiculum id vllō sinu donatur, quod prope sphericum est, neque styloides ad illud pertingit. Vtrunque tamen in sinia perbelle obseruatur.

### De Postbrachiali. Cap. XXVI.

metacarpiū id est  
postbrachiale qd  
Metacarpiū quid  
aliquib. significet  
Postbrachialis os  
sa sunt quatuor  
Gal. & Vell.  
Primus articulus  
pollicis pōt num  
merari cū ossibus  
postbrachialis.

Tractat de primo

PARTEM, quæ cum Brachiali sequitur, & ad digitos termina- 30  
tur: nos cum cæteris Anatomicis postbrachiale dicemus, quam  
Græci μετακάρπιον vocant, quanquam nonnullis hac voce libuit ma-  
num vniuersam brachiali excepto intelligere. Postbrachiale autem  
ex Gal. ac Vessalij sententia quatuor ossibus construitur. quibus ta-  
men si quis adnumeret primum pollicis articulum, nō incongruum  
fuerit: quando & illud os statim brachiali succedit, ac non minus  
eidem committitur, quàm faciant reliqua postbrachialis ossa, licet  
laxior sit huius, quàm ipsorum articulatio. Ex qua item euidentior  
motus editur. Verum quicquid est, siue quinq; ossa hæc, siue qua-  
tuor numerentur, nobis placet in horū explicatione tractare quoq;  
de



- de prima pollicis articulatione, vt ostendamus illum cum quinto brachialis osse per diarthroseos speciem, quæ arthrodia dicitur, co-articulari; quamquam pro ratione ipsorum ossium, quæ parua sunt, huiusmodi articulatio ad enarthrosim referri possit. Nam quintum brachialis os ea parte sinum satis insignem habet, atq; in angulum excavatum; in quem caput articuli quoquomodo oblongum, & versus anteriora protensum immittitur. Secundum postbrachialis os, quod Gal. primum est, in angularem sinum altum terminatur parte quidem superiore, qua excipit protuberantem sexti ossiculi brachialis partem; atque interim latus coniungit quinti ossis lateri, cui eo modo adhærescere videtur. Tertium in sinum desinit, ac parte interna; quæ ad pollicem spectat, in processum veluti oblongum protenditur: cuius superficies asidet sexto brachialis ossi. quod reliquum est eius sinuati capitis, cum septimo coniungitur. At quartum capite est quadrato, quod duobus infidet ossibus, nã cum septimi, tum etiam octauum partem occupat: quæ iunctæ planam sedem quodammodo huic plano capiti efformant: licet intrinsecus id aliquantulum decliue fiat. Vltimum similiter caput quadratum habet; paulum tamen ad exteriora tendit, atq; ad extremam vltimi brachialis ossis portionem adhærescit: atq; ad hunc modum postbrachialis ossa cum brachialis ossibus componuntur. Verum infra cum digitorum articulis vno, ac eodem modo articulantur. In caput enim rotundum omnia desinunt, quo leuiter excavatam subsequentiū articulorum superficiem laxa articulatione subeunt. Ossa hæc quatuor primo pollicis excepto à capite priore intus, extraq; attenuantur ad mediam vsque regionem: inde vero crassiora fiunt, ac interna præsentī regione angularem lineam constituunt, quæ per medium secundum longitudinem ipsorum ducitur, quæ facta est pro muscutorum ibi existentium ratione, quibus musculus parare etiam oportuit commodam sedem, ne vola nimia mole ad comprehendendum minus idonea redderetur. Iccirco ossa hæc hinc inde attenuata sunt, & ita intervalla non modica musculis occupanda præbuere: quorum muscutorum enarrationem suo loco trademus. Ad hæc postbrachialis ossa intus summa sunt, extra vero gibba, infra, supraq; appendicibus muniuntur: ex quibus ligamenta fluunt, quorum gratia ossa hæc inter se vtrinque necantur. Intus quoque cavitatem non parvam, & medulla refertam habent.

pollicis articulo hoc cap.

Primus articulus pollicis iungitur quinto ossi brachialis per arthrodiā sub diarthrosi.

Quomodo referri ad Arthrodiā sub enarthrosi possit horū ossiū articulatio.

Secundum os postbrachialis.

Tertium os postbrachialis.

Quartum os postbrachialis.

Vltimum os postbrachialis.

Postbrachiale supra cum ossibus brachialis infra cum articulis digitorum iungit.

Descriptio quatuor ossiū postbrachialis pollice excepto.

Lineæ angularis vñs.

Cur ossa postbrachialis sint attenuata hinc inde interna parte.

Figura ossiū postbrachialis.

Appendicem ossiū postbrachialis vñs.

## De Digitis. Cap. XXVII.

Ossa digitorū qui  
bus quindecim  
sint, & quib. qua-  
tuordecim.

De vnguibus tra-  
ctabitur libro de  
cartilaginibus.  
De sesaminis hoc  
lib. cap. vltimo.  
Digitorū substan-  
tia qualis, & cur  
talis.

Ossa digitorū nō  
sunt solida con-  
tra Gal.

Ossa digitorum in  
simijs & leonib.  
cavitatem habēt.

Quid Gal. decept  
in substantia ossiū  
iudicanda.

Differentia ossiū  
digitorum.

Forma ossium di-  
gitorum.

Ossa digitorū defi-  
nunt in capitulū.

Cur ossa digitorū  
interna regione  
sint plana.

**S**UPEREST vt de digitis iam dicamus : vt tandem absoluta of-  
fium manus fabrica tradatur. Digitorum ossa quindecim illi nu-  
merabant, qui primum pollicis articulum à postbrachiali disungūt  
singulis digitis terna internodia tribuentes : qui vero eundem inter  
postbrachialis ossa recensent, sicuti nos fecimus, duobus tantum  
articulis pollicem donant; atque quatuordecim solummodo statu-  
unt digitorum ossa, vt interim vngues misi fiant, quos in tractatum  
de cartilaginibus conijciemus : atque etiam sesamina ossicula, qui-  
bus postremum caput dedicauimus. Ossa igitur digitos constitu-  
entia substantia dura sunt : vt innumeris functionibus, quibus ma-  
nus parata esse debuit; prompta & absq; noxa vteretur. Non pror-  
sus tamen solida sunt, quemadmodum Galeno placuit : cum nō mi-  
nus insignem cavitatem habeant, quàm diximus inesse in postbra-  
chialis ossibus : qua cavitare simiarum quoque digitorum ossa mi-  
nime destituuntur, & quam in leonibus ipsis adnotauimus. Gale-  
nus vero solam ipsorum paruitatem considerans solida esse certo  
putauit; neque articulum aliquem fregit, vt periculum faceret, an  
internus sinus adesset, in quo medulla seruaretur. Ex his alia sunt  
longiora, alia breuiora; quædam crassiora, quædam etiam tenuio-  
ra conspiciuntur, pro digitorum, articularumq; ratione : nam digi-  
tis crassioribus crassiora quoq; ossa merito obtigerunt; atq; etiam  
quo longiores iidem, aut breuiiores sunt, eo breuioribus, longio-  
ribusue ossibus donantur. Similiter articuli primi maiores sunt se-  
cundis, secundi vero tertijs, tertij autem omnium minimi sunt.  
Præterea ossa hæc duplici forma sunt prædita : in quarum altera ar-  
ticuli omnes conueniunt; alteram vero, & multum priori dissimi-  
lem, sibi tamen communem articuli vltimi obtinent. Etenim ho-  
rum ossa cæteris sunt depressiora. Cumq; initio latiuscula sint, quo  
magis progrediuntur, eo magis attenuantur, angustioraq; fiunt.  
donec ceruicem superposito capitulo, in quod definunt, præparēt.  
id autem capitulum longum, ac rotundum vna existit, verum pri-  
mus pollicis articulus, itemq; primus, & secundus aliorum digito-  
rum, initium ac finem crassius habent, quasi duobus extremis ca-  
pitibus constent, quorum superius maius est inferiore. at in toto  
deductu, qui à priore ad alterum fit caput : semper tenuiora reddun-  
tur. Iam vero ossa exterius curua sunt, ac teretia, sed interna re-  
gione plana, & quodammodo sima : neq; id temere factum, siqui-  
dem interna veluti cavitare opus erat, cui superstrati esse debuerūt  
tendines



tendines non exigui, ac rotundi, qui & magnitudine, & rotunditate sua eiusmodi planitiem implent, atque eo modo teretem digitorum formam faciunt. alioqui nimia moles indidem extuberasset, illosq; minus idoneos ad apprehendendum reddidisset. præterquã quod non æque commode suis sedibus, tendines eò porrecti adhaesissent, sed in hanc, atque illam partem potius declinassent; siquidem gibba fuisset interna hæc digitorum regio. secus autem in externa contingit; nam illuc membranę ritu tendines subtilissimi producuntur. propterea curua, & teres esse debuit, vt digitorum quã  
 10 præ se ferunt venustati consuleretur. Interna item regione notabis lineas quasdam vtrinque per longitudinem ductas, vnde ligamenta ortum habent, quæ iam commemoratos tendines complectuntur; vt firmiter in sua sede maneant. Et hæc quo ad ossium digitorum figuram. Porro sic illa articulantur, vt alia suscipiant tantum. alia tum suscipiant, tum suscipiantur: vt obiter colligamus veram non esse Galeni sententiam, cum voluit prioris ossis caput in subsequētis sinum semper inferi. Nam prima digitorum ossa superne per enarthrosim cum postbrachiali iunguntur. etenim ipsorum capita sinuata sunt, & cartilagine incrustata, quibus rotunda postbrachialis ossium capita succedunt, quo articulationis genere facile præstatur, vt digiti in omnes partes moveri possint: nec non etiam circularem motum edere; quanquam Vessalius minime concedit. at leui opera quilibet experiri potest, si digitum circulari linea circini more obducatur. Inferiore parte duo paruula capita vtrinque prominent angulari quodam sinu illa dirimente. Hunc sinum media sequentis ossis capitis portio protuberans subit; capita vero in illius sinus vtrinque exculptos inseruntur. Quo fit, vt hæc internodia & suscipiantur, & suscipiant, cum priora duntaxat susciperent. Illum ideo articulum ad enarthrosim retulimus, hunc vero ad ginglymũ,  
 30 quod articulationis genus in alijs pariter internodijs obseruabis, quæ omnia cartilagine sua infarciuntur. vt quouis momento prompta, & lubrica magis in edendo motu articulatio reddatur. Ad hæc digitorum ossa suis vtrinque appendicibus munita sunt, exceptis vltimis, quorum pars inferior cum articulatione non egeat, neque eguit appendice; cuius tamen superficiem ungues ipsi obtegunt. horum ossium, simul etiam digitorum vsus, præterea cur ex tot, tamq; varijs articulis constructi fuerint; neque ex pluribus, paucioribusue, aut aliusmodi constare potuerint: longum esset recensere. quæ tamen si quis nosse velit: Galenum legat primo & secundo de Part. Vsu adamussim hæc multa cum admiratione tractantem. Illud

Cur digiti sint teretes & plani, interna regione.

Cur ossa digitorum extra sint curua & teretia.

Ortus ligamentorum ex lineis quę sunt in interna regione.

De articulatione digitorum.

Gal. error.

Ossa digitorum iunguntur cum postbrachiali per enarthrosim. Articulationis digitorum ratio. Vessalii error cofutatur.

Quæ internodia per enarthrosim, & quæ per ginglynon articulant.

Cur internodia sint cartilagine obducta.

Quæ ossa digitorum appendicem habeant, & quæ non & cur. Ungues quod faciāt.

Gal. primo & secundo de Vsu Part. docet exacte constructionem & vsum digitorum. Gal. laus.

Digitum licet inaequales cocunt tñ cū aliquod sphæricum est apprehendendum.

vero obiter scias eiusmodi ossa talem inter se structuræ portionem adepta esse: vt licet, alia breuiora, alia sint longiora: ad rectam tamen lineam, & æqualem digiti omnes perducuntur: cum ad ali- quod sphæricum apprehendendum mutuam operam conferunt.

De Ilium Osse. Cap. XXVIII.

Idem os in pueris & iuuenibus triplex videtur, in alijs vnum.

Os ilium quid vocetur.

Os pubis quid vocetur.

Os coxendicis quid vocetur.  
Vfus ilij, pubis, & coxendicis.

Basis ossium.

Tria ossa quæ cum sacro committuntur nō mouentur, sed alia circa ipsa

Ilium ita sacro hæret, vt connatum videatur.

Ossa ilium pelui similia.  
Iliorum vsus.

Iliorum figura.

**O**s illud, quod transuersis sacri ossis processibus committitur: etsi vnicum in adultis esse videatur, cum id nulla linea interfecet; perinde tamen censetur, ac si triplici ex osse constaret. 10 Constare autem cernitur in pueris, & iuuenibus triplici linea cartilagine oppleta illa tunc distinguente. ea propter tres in partes diuidi solet, tria; diuersa nomina sortiri. nam suprema eius pars omnium latissima, quæ cum sacro coniungitur: ilium os ab omnibus appellatur. anterior, quæ & ipsa lata, minus tamen quàm superior, ac vtrunque foramen amplum habet: pubis os vocatur. quæ vero media, & angustior quidem, sed crassior, & extrinsecus in magnum, ac profundum sinum excisa: coxëdicis os dicitur. Duo autem sunt huiusmodi ossa, singula scilicet vtrinq;: quæ quanquam sacro apposita sunt, dorsi tamen scapulæ vsui proportionem videntur respondere. 20 Hæc enim femur non aliter, atque illæ humerum, excipiunt, nec non etiam variam musculorum originem, insertionemq;. Verum sacro iuncta vniuersæ ossium compagi per necessariam illam basim suggerunt, de qua capite de sacro osse loquuti sumus: nam cum hæc perpetuo maneant, ac nullo vnquam motu sint prædita; circa ipsa reliqua omnia moueri iure optimo debuerunt. id quod facile attestari possumus, cum videamus superiorum partium, ac inferiorum motus sigillatim percurrentes omnes tandem in hæc ossa veluti ad centrum quoddam terminari. Enimuero ilium ossa ita ipsi sacro committuntur, atque adeo pertinaciter inhærent: vt connata prorsus 30 esse videantur. & nos adhuc ostendere sacri ossis compagem possumus, quam domi data opera diligenter in studiosorum gratiam asseruamus: cui sinistrum ilium os vsque adeo connatum est; vt nulli ratione diuelli possit. eadem quoq; inter se parte anteriore vniuntur, ac peluis imaginem elegantissime conformant, quæ vtero, vesicæ, ac intestinis tutius continendis à natura parata est. atque hos potissimum vsus ilium ossa præstant, alijs interim omisiss, quos opportunius alibi recensebimus. Horum ossium figura varia est, siquidem parte posteriore lata sunt, duobusq; latis sinibus insignita, in quos tamē curuari potius, quàm excindi videntur: quādo videre est



- est partes ab altero latere hisce sinibus oppositas protuberare, ac gibbas fieri, vbi multæ asperitates visuntur, extrinsecus præsertim musculorum nexibus percommode seruientes. huius partis suprema regio semicirculari linea obducitur: quæ secundum totam sui circumferentiam appendice munitur: cuius sedes quoniam aliquantum extra prominet: ideo spina dicta fuit. ab hac præcipue ligamenta fluunt, & eorum musculorum exortus, qui nates constituunt; deorsumq; in femur, ac tibiam, & etiam sursum ad thoracem, ac dorsum feruntur. quatenus autem cum osse sacro copulantur, natura mutuam ipsorum congressum excogitauit; vt is validior, ac pertinacior foret. Quamobrem transuersi sacri processus sinibus partim amplis, ac profundis, partim etiam leuibus excisi sunt, inter quos extuberant partes. Similiter ilium ossa & sinus, & tubera præferunt. Horum ergo sinus sacri tubera excipiunt; eminentes inter partes illius pariter sinus ingrediuntur, quam vnionem intercedens leuis cartilago glutinis modo continet, quæ quanquam eodem fiat modo, quo solet, cum ossa ginglymo articulantur, cum tamen nullus ex ea motus proficiscatur, symphyssi magis subijciemus. & hæc est partis superioris descriptio. quæ autem ab ea ver-
- 10 fus anteriora discedit, mediumq; ossis spatium occupat, cui nomen os coxendicis inditum est, crassissima facta fuit, vt commode sinus ille amplus, ac profundus fingeretur, in quem immittitur longum, ac rotundum femoris caput: ideo sinus iste acetabulum nuncupatur, qui tamen cum non adeo profundus esse potuerit, vt plene femoris caput contineret: cartilaginem eo modo adijcere oportuit, quo adhibita est, vbi humerus cum scapula coniungendus fuit. sinus iste non solum partem coxendicis, verum & ilij, & pubis occupat. Nam præter eam cartilaginem, quæ crusta ritu circumdatur tam femoris capiti, quam acetabulo: exurgit ex labris ipsius sinus
- 30 crassa quædam, & circularis cartilago, quæ acetabuli capacitatem auget; atque ita complectitur altum femoris caput, vt ne de sua sede egredi, luxariue tam facile possit. atque vt huiusmodi capitis insertio firmitus in eodem acetabulo resideat; è medio eius incrustatæ appendicis teres, ac validum ligamentum nascitur, quod in medio sinu figitur; sicq; articulationem hanc alioqui laxam maximopere colligat, continetq;. Pars inferior, quæ ilium, coxendicisq; os interfidet, ingenti sinu donatur: qui ad vtrunque latus patès, & peruius, ac inferne abruptus dehiscit, atque hic vtriusq; ossis communis esse videtur, quem ideo paratum animaduertimus: quòd illac pateat aditus pluribus, nec exiguis neruorum furculis à spinali me-
- L dulla

Asperitatù in Ilijs vñs.

Superioris partis ilij descriptio.

Spina in Ilijs quid & eius vñs.

Naturæ industria in coniunctione iliorum cù sacro.

Cartilago glutinis modo.  
Cur ad symphyssim potius quàm ad Ginglymon redigenda sit compositio ilij cù sacro.  
Coxendicis descriptio.

Cur crassissimū. Vñs coxendicis acetabula.

Cartilago vestis acetabulum.

Articulatio femoris cum coxendice proportionē respōdet articulo humeri cum scapula.  
Acetabuli descriptio.

Cartilago circularis augens acetabulum & cur.

Ligamenti in acetabulo situs & vñs.

Sinus inter ilium & coxendicem.

Sinus vñs.

Nervi maximi or-  
tus & iter.

Processus acutus.

Sinus iuxta basim  
coxendicis vsus.

Tendines quatuor  
contenti in suo  
musculo, tanquā  
in crumena.

Cur crassissima sit  
pars inferior cox-  
endicis.

Cur basis coxedi-  
cis habeat appen-  
dicem.

De ossibus pubis.  
Foramen pubis.

Quomodo os dex-  
trum pubis cum  
sinistro iungat.

Ossa pubis in partu  
dehiscere ridicu-  
lum est dictu.

Os coccygis si par-  
tu retrahitur.

In osse pubis diffe-  
runt mares à fœ-  
minis.

Quomodo distin-  
guantur ossa pu-  
bis fœminæ à ma-  
ribus.

Ossa pubis nō di-  
latari.

Cur ossa pubis de-  
orsum disjungi-  
unt. Qui muscoli ex su-  
periore parte pu-  
bis oriuntur.

dulla per sacri ovis foramina profluentibus : qui non inde procul in vnum coeunt neruum omnium nostri corporis neruorum maximū, qui per penitissimos femoris musculos delatus ad crus disseminatur, sicut alibi ostendemus. Ab hoc sinu cum recesseris versus anteriora, exurgit processus quidam acutus : vnde ligamentum prodit in sacrum os inferendum, paratum vt claudat manum, atq; neruum illum maximum, de quo paulo ante diximus. Præter hunc processum iuxta coxendicis basim alter adest sinus, latus quidem, sed humilior, ac rimis quibusdam intersectus, cui inhaerent tendines quatuor in suo ipso musculo tanquam in crumena reconditi : qui tandem in vnum coeunt in femur inferendum. Inferior coxendicis portio crassissima est, quam basim propterea paulo ante nuncupauimus. Hæc vna ex omnibus coxendicis ovis partibus appendice donatur, vnde tres muscoli tibiam flectentes enascuntur. Superest nunc, vt anteriorem partem, quæ os pubis nominatur, aboluamus. Ergo pubis ossa supra, infraq; tenuiora sunt cæteris. quo autem magis ad medium accedunt, eo magis attenuantur, vsq; dum in amplissimum foramen desinunt. superne iunguntur : ac dextrum cum sinistro multæ cartilaginis interuentu coalescit. quem nexum adeo tenacem, ac solidum offendimus; vt difficillimum sit cultro, aut scalpello abscindere. Propterea risu magis, quam reprehensione dignam illorum sententiam iudicamus, qui proferre in vulgus non verentur; ossa hæc in partu laxari, atq; dehiscere, vt facilius exeat fœtus. Nulla enim ratione dimoueri possunt : tantū abest vt laxiter aperiantur. verum autem id est de coccygis osse, sicuti supra suo loco dictum fuit. Illud enim certum est retrahi, ac eo modo parientibus non parum auxiliari : neq; de hac re ambigere quisquam debet, quando vtrunque facili experimento comprobare licet, si tactus adhibeatur. porro scitu dignum est, ossa hæc in maribus non ita ampliter produci, vt in mulieribus, in quibus latius hæc patent, & capaciora multo sunt; & quam diximus peluis similitudinem tenere. Animaduertendumq; est hinc facile discerni posse fœminarum ossa à virorum ossibus. Horum enim supra, infraq; strictiora, angustioraq; sunt, illarum vero ampliora : vt facilius credatur ossa pubis minime dilatari, quando si aperiri possent, frustra ipsa natura differentiam hanc constituisset; vt latius hæc, quam illa paterent. Cæterum ab ea, quæ sit per cartilaginem coniunctione, quo magis deorsum tendunt, eo etiam magis, ac magis disjunguntur : vt vacuum ibi sedem subsistentibus testibus, ac peni relinquant. Ex superiore parte, qua ossa pubis coniunguntur, quaq;



quaq; aspera sunt, ac gemino tuberculo abundant: exoriuntur tum recti abdominis muscoli, tum etiam illi, qui ad femur, tibiãq; deferuntur. Nec non illuc inferuntur abdominis muscoli oblique descendentes. inferiore vero, quæ munitur appendice producuntur muscoli penem sustinentes, cuius corpus statim sub ipsa ossium v-nione affigitur. At foramen illud, quod in medio est amplissimũ: leuitatis potius, quàm alius rationis gratia factum implent duo musculi internus, atque externus, qui deorsum tendunt, & in femur implantantur, eius circumagendi munere fungentes: inter quos  
 10 media est membrana non leuis, & foramen identidem obturans, & alterum musculum ab altero distinguens. Per huiusmodi foramen Anatomici imperiti putant seminaria vasa ad testes descendere: sed falluntur, quando illa musculum abdominis perforat, ac super hæc ossa feruntur, vbi sinus quidam oblique decliuus adest, per quem demittuntur simul tam deferentia, quàm præparantia vasa. qui sinus in mulieribus non reperitur; & hac potissimum differentia ossa mulierum à virorum distinguuntur. Atque ad hunc modum se habent ossa, quæ cum sacro committuntur, quorum substantia non multum ab ipso sacro diuersa est: fungosa enim plurimum sunt, nec  
 20 nimis dura, foraminibus crebris referta, per quæ nutrimentum al-latura vasa perducuntur.

Pubis inferior pars appendicem habet.  
 Situs & origo musculorũ sustinentium penem.  
 Foramẽ in medio ossium pubis cur factum.  
 Membrana inter musculos circum agentes femur.

Error anatomici: illarum de vsu foraminis pubis.

Iter vasorum seminariarum.

Sinus vasorum feminalium nõ est in ossibus pubis mulierum.  
 Substantia ossium quæ committuntur cum sacro qualis. Foramina pro nutrimenti delatione.

## De Femore. Cap. XXIX.

**F**EMORIS os tum humanum, tum etiam simiarum reliqua ossa omnia magnitudine superat. Cætera vero animantia feniur ipsu breuius multo quàm tibiã habent; in qua fortasse nonnulli decepti sunt existimantes in brutis femur illud esse, quod extra primum articulum constituit; neque considerant id ipsum in anima-  
 30 libus iuxta clunes latitare. Ea vero pars, quæ primo sese exerit, nõ femoris est os, sed tibiæ. In quo item errore versatus est Aristoteles, qui non contentus cubiti loco humerum ponere, sicuti supra etiam capite de Humero diximus: propriam & femoris, & tibiæ sedem ignorasse, palam fassus est: quando asserere nõ dubitauit, aues femore destitutas esse: quod omnino falsum est; siquidem illæ femur habent, verum id delitescit, quemadmodum in omnibus fere quadrupedibus, in quibus breuius esse oportuit, cum longius situs, in quo residet, minime patiatur. secus autem in simia, homineq; contingit. Propterea os tibiæ & his duobus femoris, & cæteris ossibus longe maius existit, illud supra cum osse coxæ dicis, ilei, pubis:

Hõ & Simia habet os femoris maius alijs ossibus.  
 Femur est breuius tibia in alijs animalibus ab homine & Simia.  
 Femur i animalibus iuxta clunes.  
 In animalibus quod vulgo femur creditur est tibia.  
 Aristotelis error, qui ponit humerum loco cubiti.  
 Aristotelis error existimatis aues carere femore.  
 In auiibus vbi sit femur.  
 Cur in omnibus fere quadrupedibus femur est breuius tibia.  
 Cur homo & Simia habeant femur maius tibia.

- Femur cum quib. articuletur.  
Femoris figura. infra vero cum tibia articulatur, cuius figura longa est, & teres, at non usquequaque recta: nam media prope regione curvatur, anteriore quidem gibbum, posteriore autem, ac exteriore simum, superne in caput crassum, rotundum, & cartilagine incrustatum definit longiorem cervicem obtinens, quæ sursum alte protenditur ad interiora plurimum incumbens. Caput autem huic præpositum cervici ab orbiculari appendice fere totum efformatur, & coxendicis acetabulum subit. quæ articulatio validissima esse debuit, propter immensum pondus, quod femori sustinendum fuit. Iccirco natura non modo altiorem insertionem effinxit, & cum profundo acetabulo cartilaginem composuit; vt ipsum adauctum, altiusq; redditum femoris caput facilius susciperet; Verumetiam teretem, ac robustam copulam paravit, quam è sinu quodam non levi in medio pene capitis vertice, magis tamen versus interiora produxit: atque id in acetabuli fundum immittendum curavit vinculi, ac firmamenti validioris gratia. Quæ cum ita habeant, eos refellere merito possumus, qui huius articuli luxationem minus integram putantes, notham illam, mentitamq; vocarunt: cum perfecta, veraq; sit, in qua sæpenumero accidere solet, vt ligamentum illud laxius, & prolixius fiat, vnde restitutio difficilis admodum redditur. Ab ipsa 20  
cervice statim os istud in portionem quandam latiusculam descendit, ex qua processus duo veluti nodi educuntur, qui in nuper natis appendicum naturam tenent, cum facile diuellantur. Temporis autem progressu ita coherent, & cum partibus vnde prominent, confunduntur: vt ne signum quidem appendicum ostendant. Itaq; femoris processus numerantur, qui ad posteriora magis vergunt: alter tamen altero superior est. superior extrorsum spectat, & maior existit: inferior vero longe minor est, ac in interna sede potius maiorem Γλῶτὸν Græci dixerunt: ambos vero Τροχαντῆρες quasi rotatores dixeris; cum videlicet rotando femori facti esse videantur. 30  
Etenim eorum musculorum insertionem admittunt, quorum opera femur tum extrorsum flectitur, tum circumagitur. quanquam præterea octavo musculo tibiam flectenti originem suppeditent. parte posteriore linea quædam eminens ab externo ad internum ducta hos ipsos processus simul iungit; hinc femoris os teretem formam sumit: Cumq; mediam regionem transferit, crassum magis efficitur, quo magis descendit; nec non etiam dilatat, atque introrsum magis deprimitur, ac tandem in duo magna capita exit, aspera illa quidem extrinsecus, at in superficie lævia, lævi quodammodo crusta peruncta, quæ magnæ appendicis interuentu constituuntur.
- Cervix.  
Caput.  
Cur articulus femoris cum coxendice sit validissimus.  
Cartilago vestit profundū acetabuli coxendicis.  
Ligamentū femoris cum acetabulo quale.  
Luxatio articuli femoris cū acetabulo legitima est contra, quosdam.  
Cur difficile restituitur luxatio articuli femoris.  
Processus femoris in nuper natis videntur appendices  
Processuum femoris descriptio.  
Γλῶτὸν quid. τροχαντῆρες quid.  
Processuū femoris utilitas.  
Processus femoris quomodo iungatur.  
Vnde femur teres.  
Quid efficiat cap. interiora femoris.



tuuntur. Prima non paruus (inquit Galenus) sed ingens quidam, ac profundus sinus, & asper, capita ista parte posteriore nō exiguo interuallo disjungit. parte item anteriore sinum leuiter depressum communem habent, cui innitur os quoddam orbiculare, quod Molam nominant, de quo suo loco dicitur. Hæc capita à se prorsus inuicem differunt; nam exterius crassius est, latius, ac depressum magis, idq; vt ne ambo cum tibia æqualiter inarticularentur; atque obliquus motus edi posset, cum tibia præsertim ad exteriora flectenda veniret; cui motui destinatus est musculus sub poplite delitescens, qui ab externo iam commemorato capite nascitur, extrinsecus scilicet versus posteriora, vbi pars quædā inest aspera, & sinulis quibusdam impressa. Atque hæc diligenter intuearis Lector optime; nam huius musculi munus non satis recte pèrpendit Vessalius; cum minime nosse posset, quomodo tibia in obliquum adduceretur. iam vero femur infra cum tibia per Ginglymum componitur; superius enim tibiæ caput duobus sinibus refertum est, inter quos educitur tuber eminens. capita vero infimi femoris tibiæ sinibus inhærent; at eiusdem femoris posterior sinus mediam portionem tibiæ eminentiorem excipit, vnde fluit ligamentum validum, quo artèssime femur cum tibia colligatur, non secus ac superiore articulo fiebat, vbi per Enarthrosim femur coxendici committitur eo, quo supra diximus modo. hoc autem ligamentum teres, quo femur supra infraq; insignitur, articuli detinendi gratia, in alijs articulationibus minime reperitur. Idcirco obseruatione dignum est: neque enim ob id hisce desunt communia cæteris ligamenta, quæ extrinsecus obducta partes cohærentes inuestiunt, & vndique colligant; sed de his priuatim agemus. Præterea notanda est linea quædam insignis, multumq; aspera, quæ in posteriore femoris regione prominet, nec procul ab interno rotatore incipit, ac per longitudinem eiusdem regionis defertur: deinde vltra medium in duas partes scindi, & caput vtrunque petere videtur; sed ad externum euidentius terminatur. Huic lineæ inseritur, ac tenaciter adhærescit quintus femoris musculus omnium nostri corporis maximus, cuius beneficio recti stamus. Aliæ nihilominus ibi adsunt asperitates, ac nonnullæ etiam impressiões, musculorum tantum occasione fabrefactæ, vt suo loco patebit, vbi musculi tam femur, quam tibiā mouētes describentur: femur & sistimus, cum recti stamus, & quaque versum agimus: nullum enim motionis genus illius cum coxendice articulatio excludit, quemadmodum in seipso quicunq; experiri facile potest. Os id amplissimum sinum habet intus, quo leuius

Gal. de prima in femore.

Vessalius decipit i musculo flectente tibiā ad exteriora. Femur componit cum tibia infra per ginglymon.

Origo ligamenti femoris cū tibia infra. Femur copulatur coxendici per enarthrosim. Cur ligamentum femoris supra infraq; sit dignum annotatione.

De ligamenti priuatim aget.

Lineæ quæ est in posteriore femore delineatio.

Quintus musculus femoris est omnium maximus. Quomodo recti stamus. Asperitates ab insertione musculorum. Femoris vsus.

Cur cauitas femo-  
ris sit magna.  
Venæ.

leuius fit, & medullam multam pro nutrimento seruet. huc scilicet pertingunt venæ per summā, imamq; præsertim ipsius ossis partem plurimis locis perforatam. De femore satis: nunc de tibia, fibulaq;

De Tibia. Cap. XXX.

Tibia & fibula p-  
portione respon-  
dent cubito & ra-  
dio.

Tibia idem quod  
crus.

Cruris os maius ti-  
bia quoq; dici-  
tur.

Fibula est os gra-  
cilis cruris.

Idem sura & fibula  
xviij. p. p. p.

Tibia ē maior hu-  
mero.

Humerus non est  
maior tibia con-  
tra Gal.

Femur reliqua of-  
sa magnitudine  
excedit.

Tibia habet appen-  
dicem vtrinque.  
Sinus.

Tuberculum.  
Sinuum vsus.

Crusta cartilagi-  
nea.

Cartilaginis luna-  
te figura & vsus.

Cartilago lunata  
ligamenti vicem  
gerit in tibia.

Quomodo articu-  
lo tibiæ cū femo-  
re roboretur.

Tibia deorsum ver-  
sus triangulum imi-  
tatur.

Cur tibia tribus  
præcipue partib.  
incuruetur.

QVEMADMODVM inter humerum, ac summam manum of-  
sa duo descripsimus, quæ iuncta cubitum constituēbant; ita à  
femoris osse ad extremum pedem regio duplici osse constructa per-  
tinet, quæ modo tibiæ, modo cruris nomine donatur. Alterum 10  
os, quod maius est, totius nomine tibiam nuncupamus; alterum ve-  
ro longe gracilius quandoq; suram, quandoque fibulam vocamus.  
Tibiam Græci *xviij. p. p.*, fibulam vero *περόνν* appellant. Tibia ea ma-  
gnitudine prædita est, vt vel humerum superet, quem tamen Gale-  
nus omnium ossium maximum, excepto femore credidit. Hæc in-  
fra, supraq; appendicem habet. superior ipsius pars latior est, &  
crassior: duos sinus leuiter inq; superficie sortita est, inter quos cur-  
rit tuberculum quoddam prominens atque asperum. Hisce sinibus  
excipiuntur ima femoris capita, in quibus ne incommodius infide-  
rent, cum præsertim depressiores sint, quàm capitum altitudini 20  
conueniat; Natura præter cartilagineam crustam vtrique sinui af-  
fixam, alteram apposuit mobilem: cuius figura lunam imitatur, &  
nostrum C similitudine refert, initio ac circa sinuum oras crassior,  
quo vero introrsum magis ad centrum recipitur, eo tenuior semper  
fit, prius quidem desinens, quàm centrum attingat. ita sinuum  
profunditatem maiorem relinquit: ad quam augēdam potissimum  
facta esse videtur: quanquam quòd lubrica est, læuis, mollis, &  
vinctuosæ humiditatis plena, ligamenti vice fungitur, & articuli mo-  
bilitatem plurimum adiuuat. Accedit etiam non minimum firmā-  
di huius articuli adiumentum; nam id tuber, quod è media tibiæ 30  
superficie emergere, & alterum sinum ab altero dirimere conspici-  
mus: in amplum sinum immittitur, qui partem posteriorem vtriusq;  
femoris capitis intercipit, ibique valido ligamento vincitur. quod  
ligamentum ex tuberis apice prodit, & in medio sinu impense ad-  
modum infigitur, atque ita articulus omni ex parte probe munitus  
in sua sede continetur. A superiore hac parte deorsum procedens  
tibia sensim attenuatur longioribus lineis, ac sinibus varijs distin-  
cta, ita vt triangularem formam imitetur; at oblique tendit, ac tri-  
bus præcipue partibus incuruetur, perspicue cedens musculis illac  
descendentibus. Ibidem extrinsecus versus posteriora iacet sinus  
quidam



quidam lævis, & cartilagine obductus, cui adiacet internæ fibulae capitis portio, itaque superne fibulae tibiae agglutinatur. Educitur præterea è media posterioris partis summitate sinus decliuus, quæ transeunt vena, arteria, & neruus, ac deorsum feruntur; verum antrorsum non procul à summæ appëdicis sine extat eminëntia quædam horrida musculorum in primis infertionem admittens tibiam extendentium. Inde vero producta linea in media regione acuta prominet, veluti cultri aciem effingens, propterea quibusdam spina vocata est. Hinc tibiæ latus internum ex carneprehenditur; 10 iccirco regio hæc creâ dicta fuit contrario sensu, cum locus ille omni prorsus carne sit denudatus. alia autem tibiæ latera, maximeq; posterius multa carne opplentur. Secunda item linea, quæ fibulae subest, illiq; è regione respondet; ideo facta est, vt ex ea ligamentum producat, quo fibula cum tibia connectitur; ac interim anteriores musculi à posterioribus seiunguntur. Inferior tibiæ pars rursus crassescit, & in caput definit, quod superiore minus est, verum in superficie vnico, amploq; sinu excisum, qui sua cartilagine obducitur, & tali infertionem suscipit. Huius capitis pars interna producitur, ac in processum crassiusculum euadit, qui sinui iam 20 commemorato prominet, ac talum sinui inhaerentem claudit: qui cum alteram in partem protrudi, & è sua sede dimoueri posset; alterum processum postulauit, quem tamen externæ tibiæ regio capere non potuit: quando in ea celari debebat sinus oblongus sensim latefcens, & in duo supercilia definens, quem subiret, cuiq; incumberet extrema fibulae portio. Quod igitur tibia præstare non potuit, fibulam eam sedem occupantem præstare oportuit: quam obrem eius caput in acutum tendens, tanto decliuus tibiæ osse descendit, quantum tibiæ caput superius fibulam excedit. Vnde inferius fibulae caput non aliter, quàm processus quidam, alterum tali 30 li latus comprimit. Hæc autem duo tubercula malleoli dicuntur, quorum qui à tibia promittitur, internus: qui vero à fibula prouenit, externus vocatur. Ambo hinc inde talum tibiæ inarticulatum obsident, vt neutram in partem delabi possit, adeo vt si quando huiusmodi luxatio contingat, ad internum magis, quàm externum malleolum talus inclinet necesse sit: quoniâ externus longius quàm internus producitur. tibiæ processus, quem modo internum malleolum vocari diximus, parte posteriore sinum habet, vnde ligamentum educitur, quo tali os tibiæ alligatur; cui etiam firmitus nectendo nõ minimum adiumentum præbet sinus ille oblongus, asper, & transuersim ductus, quem exigit anterior inferioris tibiæ appen-

Quomodo fibula tibiæ agglutinet.

Sinus vasa excipiens.

Musculorum tibiæ extendentium infertio.

Spina tibiæ quid.

Circa quæ pars tibiæ, & cur dicta.

Vbi tibia multa carne vestiatur. Secundæ lineæ in tibia vñs.

Inferior tibia describitur.

Vide naturæ artem miram.

Malleoli duo qui internus & qui externus.

Cur in luxatione malleolus inclinet magis ad internum malleolum, quàm externum Interni malleoli figura & vñs.

Tali ceruix tibiæ  
nectitur.  
De Fibula.  
Fibula non attingit  
femur supra.

Arthrodia sub synarthrosi.

Asperitatum processuum fibulæ v-  
sua.

Vbi dehiscat fibula  
a tibia & cur.

Vsum tibiæ ac fibulæ  
potest quilibet in se  
experiri.

Cur fibula in pronum  
& supinum non mouetur.

Fibula & tibia habent  
medullâ in cavitatē, habent  
& foramina.

Patellæ vsum communis  
est femori & tibiæ.

Cur tractatur de patella  
separatim à capite de femore  
& tibiæ.

Patellæ nomen explicatio.

Patella nō est cartilaginosa  
neque solida.

Substantia patellæ  
qualis vere sit.

Vbi inuoluatur cartilagine  
lubrica patella.

dicis sedes : Etenim hinc ligamentum nascitur tali ceruicem ossi tibiæ nectens . Caterum fibula tibiæ non secus inhæret, ac radius cubito adiungi diximus ; parte tamen superiore femur nusquam attingit, verum sub tibiæ capite eo, quo supra diximus, modo connectitur : infra vero longum tibiæ sinum subit, vtriusq; tamen partis structura per Arthrodiam fit, quæ sub Synarthrosi ponitur . Ambo fibulæ capita in processum acutum exeunt, quæ nonnullis asperitatibus prædita sunt, horum superius, quod est rotundius, muscutorum tibiam mouentium insertioni deseruit : inferius autem, quod depressius est, ac extrinsecus gibbum magis : musculus emittit extremo pedi famulantes . Verum quatenus bina hæc capita sinibus excipiantur, cartilagine obtenduntur . fibula, etsi recta est, aut saltem modice curua plurimum tamē ab ipsa tibia dehiscit, parte præfertim modice curua plurimum tamē ab ipsa tibia dehiscit, parte præfertim superiore, quoniam ibi tibia in sinum flectitur . in eo autem interuallo ligamentum cernes, de quo supra meminimus, fibulam, tibiamq; medio spatium complectens, ac præterea ligamentum id musculos distinguit, per quos spatium illud hinc inde repletur . quorū insertioni, ac nexui maxime inseruiunt inæqualitates fibulæ sinibus ac lineis comparatæ . huius muneris ergò hisce pariter fit, vt fibula æque ac tibia angularem propemodum figuram adipiscatur . vsum 20  
horum ossium in se ipsis omnes, si experiri non pigeat, perdiscere possunt . Fibula vero in pronum, ac supinum non mouetur, quòd musculis huic obeundo muneri dicatis caret . Sed tam fibula, quàm tibia intus cavitatem habet medullam asseruantem, nec foraminibus deficit .

### De Patella. Cap. XXXI.

**O**s quoddam genu præponitur, quod à femore, tibiāq; separatim, vtrique tamen communem veluti operam præstat, sicuti mox dicemus . Ideo separatim de hoc ipso osse agendum fuit 30  
post femoris ac tibiæ descriptionem ; quando neque cum hoc, neque cum illo commisceri, neque etiam ante hoc, vel illud tractari commode potuit . id autem est, quod Græci *επιγυνεῖα* seu *επιγονατιν* vocarunt, Latini autem patellam, genu molam, vel scutum, vel scuti-forme os, vel genu rotulam nominarunt . os est, non cartilaginofum, sicuti nonnullis visum est, neque rursus adeo durum, vt solidum existimari debeat, vt alij existimarunt ; at substantia est, qualis duræ cuiusdam appendicis, quæ tamen prona sit, vt nutrimentum per omnes sui partes suscipiat . Verum intro cartilagine lubrica inuoluitur, idq; magis parte, qua femur, ac tibiā respicit, cum altera parte



parte musculorum tendinibus inuestiatur. Patella hæc facta fuit, vt tegetet femoris, & tibiæ articulum, alioqui nimis patentem, ac proniorem, vt antrorsum procumberes facillimo luxationis genere. præstat item, vt in rectum angulum genu flexi possit. mobile præterea, nec pertinaciter adharens esse debuit, vt ne difficilem articuli huius motum redderet; aut longum in genu decubitus præpediret. Suis tamen ligamenti cum femoribus, tum etiam tibiæ neçitur, quicquid alij dixerint, sibi persuadentes solis musculorum tendinibus contineri; nam ex appendicibus femoris, & tibiæ ligamenta nascuntur, quibus manifesto molam vtrinque vinciri plane perspicimus, at cum femore solum articulatur eo modo, quem sibi Ginglymos vindicauit. Etenim anterior imi femoris pars in duo, vt diximus, capita desinens in medio finem habet, in quem media protuberantior patellæ portio immittitur. quem vt magis impleat, commodiusq; inhæreat, hinc inde & ipsa sinus natura dedit protuberantibus femoris capitibus respondentes. quamobrem femur patellam excipit, & ab eadem pariter excipitur. Formam pene orbicularem naçta est: verum in acutum quodammodo definit, quatenus tibiæ asidet: propterea scuti nomine donatur. in extremitatibus tenuior: quo magis ad medium tendit, eo crassior efficitur; vbi prorsus eminet, vmbonemq; imitatur.

Patellæ utilitas prima.

Cur patella sic mobilis.

Patella habet propria ligamenta cõtra comunem.

Ortus propriorum ligamentorum patellæ vnde.

Patella articulatur femori per Ginglymon.

Patellæ figura qualis.

Vbi patella est similis vmboni.

### De Pedis ossibus, ac primum de Talo.

#### Cap. XXXII.

**S**UPEREST nunc vt extremi pedis ossa describamus; quæ sex supra viginti sunt: Vnde pes vno minus constat, quam summa manus. Cæterum in pede tres ordines similiter, ac in manu constitutuere placet. idq; clarioris doctrinæ gratia; vt prima pars, quæ statim tibiæ, fibulæq; succedit, quamq; tarsum nominamus, brachiali respondeat: secunda vero, quam pedion cum cæteris appellabimus, postbrachialis ossibus: Tertia sit digitorum articulis destinata. cum interim tamen eo solo inter se differant, quod septem nobis erunt Tarsi ossa, brachialis autem octo. quo fit, vt vno eo osse, quo brachiale tarsum superat, manum pariter extremam extremo pedi præstare dicere possimus. Quinque vero pedij ossa, quot etiam postbrachialis numerabuntur. quæ item supererunt vtrobiq; in digitorum articulos quatuordecim distinguuntur. Neq; video cur à tarsi ossibus tria illa priora seiungi debeant, sicuti ab alijs Anatomicis factum fuit fatentibus quatuor posteriora, quæ sola

Ossa pedis 26. Manus ossium numerus.

Tres ossium phalanges in pede.

Cõparant tres ordines ossium in pede cõ tribus ordinib. ossium in manu.

Tarsus quid.

Tarsi & brachialis conformitas.

Pedij & postbrachialis cõformitas.

Tarsi ossa septem Brachialis ossa octo.

Pedij ossa quinque.

Ossa postbrachialis quinque.

Ossa digitorum cum manus cum pedis quatuordecim.

In ossib. Tarsi differt ab alijs anatomicis & quo.

M tarsus

Prima classis septē  
offium Tarfi in  
pede respondet  
brachiali.

Singula Tarfi ossa  
non habēt nomē.  
Talus.  
Calx.  
Scaphoides.  
Cyboides.  
Quomodo distin-  
guantur tria ossa  
Tarfi carētia no-  
mine.

Idem est ἀσπυ-  
δος ἀσπυ & Ta-  
lus.  
Tali situs.  
Talum habent ho-  
mo & animalia  
pede multifido.  
Aristoteles deci-  
pitur in Talo.  
Tali figura.

Cur appendix ti-  
biæ talū excipiat

Talus articulat  
tibiæ per gyngli  
mon.  
Gynglimi vsus in  
talo & tibia.

Curos tali carti-  
lagine in crustet.  
Cur tali latera sint  
decliua & plana

Quid constituat  
malleolos.

Cur malleolus ex-  
ternus differat ab  
interno.  
Tali pars inferior  
qualis.

Per anteriore par-

tarfi appellatione dignantur; ad brachiale tantum referri oportere, tribus primis absq; relatione designatis. Per me itaq; semper licebit cum hæc tria, tum etiam quatuor sequentia tarfi vocabulo complexi: vt cum à tibia, suraq; recesserimus, descendentes protinus ad vnam ossium compagem, veluti classem deueniamus, quam brachiali comparemus, quod quidem post cubitum, vlnamq; nobis occurrit. verum hæc tarfi ossa singula peculiari nomine non sunt donata; nam prima tria alijs à tarso secernunt, & vnum ex quatuor sequentibus proprium nomen obtinere. at postrema tria adhuc sunt sine nomine. Primum igitur omnium talus, secundum calx, 10 tertium scaphoides, quartum cyboides nominabitur. quæ supersunt tria, quanquam innominata sunt, attamen numeri, situs, ac formæ ratione distinguuntur. Primum ergo talus erit, quem Græci ἀσπυζαλλον, & ἀσπυον vocant: Tibiam, fibulamq; illico subit, quippe cui illarum appendices incumbunt; quanquam tibiæ soli substratus esse videtur. Id os homini cum cæteris commune est animalibus, quæ multifido, seu in digitos scisso pede incedunt: quicquid dixerit Aristot. atque illum sequuti. à quorum sententia rei veritas omnino abhorret. Tali forma ea fuit, vt supra emineat, vt orbicula- 20 re tuber, ceu rotulæ partem imitetur, quæ in medio leuem sinum possidet lateribus hinc inde prominentioribus, quæ scilicet cum tibiæ osse copulatur: sic enim tibiæ ossis appendicem, quemadmodum capite de tibiæ, suraq; ossibus dictum fuit, natura inculpsit, vt excipiēdo talo percommodam sedem præberet, tutiorem nimium articulationis speciem constituens, quæ ginglymos dicitur. subseruit autem hic articuli modus pedi flectendo, ac reflectendo, qui motus ab ingrediente animali continenter fieri solet. qui motus vt facilius foret, minusq; membrum ex eo laboraret; aut ne ossa attritu multo tandem deficerent, naturæ solertia pars vtraq; cum 30 tarfi, tum tali appendicis vberiore crusta leuigauit. Tali latera vtrunque sunt decliua, ac figura veluti plana, vt illis internus tibiæ processus ac fibulæ appendix malleolos ambos constituentes adhærescerent. at externum latus longius descendit, magisq; est excava- tum, quo inferius procedentem fibulæ appendicem excipiat, ad externum malleolum construendum, qui propterea deorsum magis quam internus protēditur. inferior tali pars sima est, ac sua cartilagine obducta: tota calcis ossi inhæret, ita tamē, vt anterior eius portio semicircularem sinum habeat, cui inseritur media se offerens calcis regio. at posterior quodammodo prominet, qua scilicet ab interna, atq; posteriore calcis portione suscipitur. nos anteriorem partem



partem semper intelligimus, quæ à capite descendentibus primo se offert; posteriorem vero, quæ sequitur, remotiorq; est. sed inter illa duo spatia cauitas admodum profunda iacet, quam etiam augere videtur calcis sinus in ea parte cauitati huic è regione respondens.

Hanc ipsam non aliorum factam fuisse conijcio, quàm vt mucosam quandam substantiam, ac pinguedinem simul contineat humectandis inungendisq; hisce ossibus paratam, ne scilicet crebro motu exsiccarentur: atq; ita suo munere frustrarentur; præterquàm quòd ligamenta ibi præsto sunt, calcem, ac talum artissime colligantia.

10 Anterior eiusdem pars in ceruicis formam producit, qua in caput rotundum, & sua crusta obtectum desinit, quod ab osse scaphoide in amplum, rotundumq; sinum cælato excipitur. Is articulus præstat, vt pedem obscuro quamlibet motu introrsum, extrorsumq; moueatur, nec non etiam aliquo modo circumducatur. Demum parte priore talus decumbit, & in geminum quasi processulum supra calcem extenditur, quæ scilicet ad internam regionem vergit, atque in hunc modum se habet tali os: quod tamen adeo sinuatum conspicitur, vt non modo ligamentorum insertionem, ortumue admittat, sed tendinum musculorum digitos mouëtium deductui ce-

20 dat. huius substantiam solidam non inuenies: vt aliquis opinatus est, verum intus spongiosa est, ac multis foraminibus peruiâ. secundum, quod sequitur calx, siue calcis os dicitur, alij calcaneum, vel pedis calcar appellât, Græcis *καλκαριον* vocatur: magnitudine ideo omnibus summi pedis ossibus antecellit, non multum à tali substantia dissidens, quanquam fungosius esse videtur: neque adeo duro cortice vndiq; munitum, superne tali ossi ad eum, quem paulo supra diximus, modum committitur, cum scilicet media versus anteriore regio partim rotundo tubere turgat, partim vero ingentem sinum habeat, vt talum excipiat, & ab eodem per Ginglymon excipiat.

30 at quæ prior est, in tergum tamen vergit; oblonga, rotundaq; est, quodammodo caput in superficie habet, & in ea regione appendice munitur, ac tota portione à tibie rectitudine excedit: quod ideo factum fuisse existimo, ne pes cum tibia posteriora versus delaberetur, minusq; sic illa pedi, pes vero humi hareret. inferiore calcis partem, qua progredimur, latiusculam esse oportuit: vt tutius ibi pes cõsisteret: eandem præterea asperam, & transuerso processu abundantem, vt inde oriretur musculus flectendo quatuor pedis digitorum articulo deferuiens, vbi præterea ortum habet materia illa musculosa, vnde emergunt quatuor muscoli, qui longo tendine in internâ quatuor digitorum regionem implantantur,

tem quid intelligendum.  
Quid per posteriorem.

Cum natura cauitatem magnam in talo sinxerit.

Vbi sint ligamenta calcis & tali.

Anterioris tali partis figura & vñs.

Quo pes obscuro motu mouetur.

Descriptio partis prioris tali.

Cur tali os sit sinuatum.

Tali ossis substantia qualis.

Error cuiusdam existimantis os tali esse solidum.  
Calcis nomina.  
Calx est maius os in summo pede.  
Calcis substantia qualis.

Cur calx à tibie rectitudine excedat.

Cur inferior pars calcis sit latior.  
Cur aspera, & processu transuerso.

Materia musculosa ex qua quatuor exeunt muscoli.

Cur inter processus eminentes sit cauitas.

Asperitas in capite calcis cur.

Articulationis forma sub Ginglymo ad Synarthrosim referenda.

Processus vius.

Cur internum latus calcis sit insigniter excauatum.

Os Tarsi vel Nauiforme.

Situs nauiformis.


Articulatio nauiformis cum talo ad enarthrosim.

posterioris cymbæ descriptio.

Externi lateris cymbæ descript.

& propterea eminentes hinc inde processus cauitatem quandam relinquunt, vt commodius in ea tam musculus, quam musculosa illa substantia locum habeat: ne, dum pes humi validius incumbit, eiusmodi musculorum capita nimia compressione lædantur. Iam vero calx ea parte, quam in caput euadere dictum est, impressionem quandam habet leui, ac paululum elata asperitate donatam, quo melius in eam tendo omnium maximus, ac robustissimus inferretur: qui à tribus musculis pedem mouentibus in vnum tandem coeuntibus conficitur. parte qua minimum digitum respicit, cum cyboide coniungitur: Ita quidem, vt superne, vbi leuiter effertur, plano propemodum cyboidis sinui aptetur: Inferne autem obliquo ceu sinu, atque ad interna vergente æquali ductu procedentem cyboidis portionem excipiat. Quamobrem sub Ginglymo ad Synarthrosim referenda talem articuli formam rectius posueris: quàm vero maximum digitum spectat, (quam tamen regionem ad internum calcis latus concinnius referas) processum non modicum emittit, quo sinum in interno latere celatum adaugeat, ac propterea propugnaculo sit cum musculorum tendinibus, tum etiam venarum, arteriarum, ac neruo illac transeuntibus. Non enim ob alios usus latus id tam insigniter excauatum est, quàm vt hisce vasis, tendinibusq; cederet, quibus omnibus tam confert processus iste, quàm etiam præstat, vt talus ibi aptius cum calce cohæreat. externum denique calcis latus depressum est, asperum, & inæquale: cui prope partem posteriorem paruus adest sinus sub exiguo processu conditus, vbi cartilagineam crustam offendes, quàm nimirum petit musculus septimi tendo, pedi extendendo subseruientis. Tertium tarsi os à Grecis *σκαποειδής*, à nostris autem nauiforme, siue naiculare, siue cymbam referens nuncupatur: quoniam scapham, aut phaselum imitetur. Id os in interna pedis parte positum est; anteriore sui sede sinu est profundo, in quem oblongum, rotundumq; tali caput inferitur, qui articulus ad Enarthrosim nihilominus obscuram referri debet; quando ab eo non nisi obscurus motus provenit. posterior pars priori quinti, sexti, ac septimi ossium nomine carentium sedi committitur ita quidem, vt non facile sit iudicare, ab illis ne ossibus excipiatur, an illa ipsa excipiat. Etenim hæc sedes non prorsus com-  
mostrant, sinusne, an tubercula sint; tamen leuiter demum protuberare videntur. externum eiusdem latus amplum, rotundum, sinuatumq; est, quàm præsertim cum quinto osse coniungitur. Vnde simul atque disceditur, sensim in angustum redigitur, & in internum processum finitur; veluti naus rostrum referens. ita internum latus promi-



- prominet, vt insigne tuber constituat, cuius ope dextrum à sinistro leui momento secernimus: inferioremq; sinum, cui eminet, maiorem efficit, quā tendo sexti musculi pedem mouentis percommode reflectitur, multis asperitatibus cum superiore, tum etiam inferiore parte scater, vt idoneam ligamentis sedem præbeat, quibus ossa hæc inuicem connectantur. Quartum os, quod cæteri primum tarfi faciunt: *κυβοειδές* Græce, Latine autem cubiforme, seu cubum, tesseramue imitans dicitur. & licet quadratum esse videatur, ita quòd tesseræ figuram referat, multiplici tamen forma insignitur:
- 10 ideo *πολύμορφον* quasi multiforme nuncupatum est. Arabes grandinosum vocarunt. Id quidem ad extimum pedis latus iacet, & cum calce parte anteriore eo articuli genere iungitur, vt non magis suscipere, quàm suscipi videatur; sicuti antea asseruimus, vbi de calce loquebamur. In posteriore autem illius parte duos similes sinus cernere est, quibus suscipit extrema duo pedij ossa, quibus fulcendis veluti basis paratum esse videtur. At internum latus cum externo septimi ossis cohæret, vbi non secus atque alijs partibus, quæ cum cæteris ossibus copulantur, leui cartilagine incrustatum animaduertas: cum tamen alibi nulla cartilagine obducatur. Solis siquidem iuncturis talis adest cartilago, ne nimis impacta sint ossa: ac motui quamuis obscuro resistent. extrema sedes bifida est, ac duos processus exerit sinu medio illos dirimente, qui ad inferiora obliquo ductu tendit, vt obsequatur tendini septimi musculi pedem mouentis, cui substratus est, ac viam præbeat. superior pars planior est, sed extrorsum accliuus fit, quando talis reliqua pedis forma futura est, vt scilicet in medio elatior, in vtrunque latus, ac maxime in externum sensim declinet. Propterea videre est pedis ossa, præsertim postrema Tarfi quatuor in orbicularem formam diducta, vt parte superiore cōuexa sint: inferne autem concava fornicem imitetur.
- 30 Validior nempe constructio hæc futura erat, ac roboris plus habitura, quæ sufficeret tum figendo pedi, tum demum corporeæ moli sustinendæ. Ad hæc prominere huiusmodi ossa necesse fuit, vt infernæ cavitati relinquerent idoneam sedem, tutum iter exhibituræ tendinibus ac musculis sub inferiore regione positis. Verum hæc obiter dixisse sufficiat, vt patere possit; quare in superficie protuberantem pedis formam, ac in ima parte sinuam, cauamue, non planam naturā construxerit. Cæterum ad tarfi ossa reuertamus, è quibus reliqua iam sunt tria, quæ adhuc nomine destituuntur. horum quintum è regione pollicis situm est, cuius figura talis esse videtur.  ante sinuata cōspicitur, & cum posteriore nauicularis portione

Reflexio tendinis  
sexti musculi pe-  
dem mouentis.

Cyboides os quam  
tum.

Cyboides non est  
quadratum.  
Cur cyboides di-  
catur *πολύμορφον*  
Os grandinosum.  
Situs cyboidis.

Cur iūcturis adest  
cartilago.

Sinus viā præbens  
tendini septimi  
musculi pedis.

Cur tarfi ossa po-  
strema præsertim  
sint fornicis ilar

Cur prominēs os-  
sa tarfi.

Pedis forma in su-  
perficie protube-  
rat in ima parte  
sinuata est.

portione prominente coniungitur; retro vero primi pedij ossis;  
 quod pollicem sustinet, sedes efficitur, quam partem si per se spe-  
 ctes, difficile iudicatu sit, sinuatane sit, an promineat: quod qua-  
 tuor hŕce tarsi ossibus commune est, quatenus inuicem, aut cum  
 pedij ossibus vniuntur. obscuri enim adeo in ijs sunt sinus, vt pla-  
 nis seu superficiebus in modum glenes committi recte dici possint.  
 Attamen si consideres partem illam pedij ossis, quæ huic quinto os-  
 si incumbit, vbi eam videris duplicem cauitatem præ se ferre, pro-  
 cul dubio iudicabis necessum esse, vt altera hæc pars in duo quam-  
 libet exilia tubercula turgeat; nisi geminas hinc inde sinuatas par-  
 tes committi fateamur: quod mea quidem sententia perridiculum  
 foret, quando vbiq; tum naturæ, tum etiam artis naturæ prorsus  
 æmulæ ordo postulat, vt vel plana planis, vel summa protuberantibus,  
 nusquam vero caua cauis committantur. superior pars modica est,  
 & ad intimam sedem, quæ latissima visitur, descendit. hæc autem  
 quoquomodo gibba est pro eius cauitatis ratione, quæ in externa  
 regione cernitur; quæ ad inferiora pertinet, cum interim latus id  
 parte sui superiore internum sexti ossis latus modico sinu contingat.  
 verum inferior crassior existit, quo firmitus terræ inhereat. Sextum  
 os quadrilaterum apparet, si superiorem eius faciem intueamur: 20  
 quæ vtiq; plana est, & quadratis lateribus respondet. At si partem  
 inferiorem, cum illa angustissima sit, & in aciem abeat: hoc ipsum  
 os cunei tantum imaginem referre dicemus, quale item esse dixeris  
 septimum, quod illi proximum est os, de quo mox dicemus. ac me-  
 hercule ambo hæc ossa sic inter alia, quæ circumstant, posita sunt;  
 vt cuneorū more ad ea veluti constipanda immissa fuisse videantur.  
 Verum sexti huiusce ossis pars anterior cum scaphoide, posterior  
 leuiter prominens cū secundo Pedij osse, intima cum externo quin-  
 ti tarsi ossis latere, ac demum externa cum intima septimi eiusdem  
 fede copulatur. Quibus partibus sua nõ deest cartilaginea crusta. 30  
 Septimum medium est inter sextum, ac quartum, quod cyboides  
 nuncupauimus. quadrangulare id quoq; videtur: sed longiusculum  
 est. anteriore sui parte ad nauiforme declinat, eiusq; tuberculum  
 exiguo admodum sinu excipit, itaque illi committitur: parte vero  
 posteriore tertium pedij os admittit; at suis lateribus latera tum  
 sexti, tum quarti ossis attingit. atque hæc de tarsi ossibus:  
 quorum substantia dura quidem est, non omnino tamẽ  
 solida, nec à foraminibus vacua recipiendi  
 alimenti gratia constitutis.



## De Pedio. Cap. XXXIII.

**S**ECVND A Pedis pars, quàm Græci *πεδιον* appellant: latinis modo planta, modo pecten, modo pedis vestigium: ea est, quam postbrachiali respondere diximus, quinq; ossibus constans, articulos digitorum imitantibus oblongis, ac teretibus, quorum extrema capita mediâ regionem subtiliorem relinquunt. Etenim initio crassiora, ac sinuata quâ cum quatuor postremis tarfi ossibus eo quo dictum est modo componuntur; inde vero quâ cum primis digitorum articulis iunguntur; in rotundum caput nō secus atq; postbrachialis ossa, eminent. Ex his ossibus primum maximum est, verū alijs longitudine cedit; siquidem omnium breuissimum est, cuius pars inferior, quæ sub capite est anteriore, in tuberculum prominet, quo duo sesamina ossicula ibi assidentia disiungit. At secundum os, quod sustinēdo indici est efformatum: omnium longissimum, quantum illud quoq; esse videtur, quod minimo subest: eius enim longitudinem adauget prominētiō in externum pedis latus producitur, in quem octauī musculi pedem mouentis tendo inditur. Cæterum omnia parte anteriore tarfi ossibus vniuntur, atq; etiam sibi inuicem inhaerent, sensim deinde dehiscunt, & à se mutuo abscedunt, tenuioraq; sunt, vt in medio interualla constituent, in quibus musculi sunt primos digitorum articulos flectentes. Tam anteriore, quàm posteriore parte appendicem obtinuerē cartilaginea crusta obtectam, verum appendix posteriori parti adnata rotundum illud, de quo diximus, caput effingit, quod in sinum primorum articulorum profundum, atq; orbiculare immittitur. caua intus sunt, ac medullosa, & habent foraminula, per quæ cum venulæ, tum arteriolæ ad ea nutrienda, fouendaq; subintrant.

Idem est *πεδιον*, planta, pecten, vestigiūq; pedis. Planta respondet postbrachiali. Ossa plantæ quot. Ossium plantæ figura.

Primum os plantæ describitur.

Tuberculi in primo osse plantæ vsus. Secundi ossis plantæ descriptio & vsus.

Tendonis octauī musculi pedis insertio.

Situs musculorum qui flectunt primum articulum digitorum. Ossa plantæ habent appendicem.

Ossa plantæ sunt cur foraminulæa

30

## De Digitis. Cap. XXXIII.

**T**ERTIAM pedis partem explent digitorum articuli pedion subsequentes. Hæc ossa quatuordecim numero sunt: nam singulis digitis terni sunt articuli, præter pollicem, cui duo tantum obtigere; id quod in manu quoque, obseruauimus. qui enim maximī digiti primus articulus esse deberet; vtrobiq; pari passū incedere videtur, in postbrachialis videlicet ac pedis ossibus: adeo vt merito in eorum numero collocetur. licet in manu id genus os à cæteris postbrachialis ossibus differre facile deprehendatur; cum in eo motus quodammodo manifestus fiat. in pede autem os istud nō alio

Digitī sunt tertia pars pedis. Ossium digitorū numerus.

Pollex habet duos articulos in manu pedeq;.

Collatio ossiū digitorum pedis cū ossibus digitorū manus.

Vbi ossa digitorū pedis articulant per enarthrosim cū ossibus plāx. Enarthrosis quid. Mutua articulatio ossium pedij & digitorum fit per ginglymon.

Tendines musculorū flectentium secundum & tertium articulū digitorum.

Appendix.

Cartilaginis in articulatione utilitas.

Cur summi digitorū articuli careāt appendice & cartilagine.

Ossium digitorū cavitates medullā habet.

alio motu mouentur, ac reliqua pedij ossa. Iccirco rectius id ipsum inter illa connumeratur, atque ita duo tantum articuli pedis maximo assignantur. Quemadmodum ergo digitorum pedis ossa cum ijs, quæ in manu sunt, numero conueniunt: ita quoque parum ab eisdem discrepant substantia, structura, ac situ: præterquam quod prima internodia parte sui anteriore sinu constant profundiore, in quem inferuntur prominentiora ossium pedij capita: quod articulationis genus enarthrosim dicimus. Cæterum in mutuis ipsorum articulationibus Ginglymon semper obseruabis. Hæc itidem internodia breuiora sunt, quàm in ipsa manu, superne gibba, inferne vero sima, vt musculorum secundum, ac tertium digitorum articulum flectentium tendines tutissime admittant, nec appendice vtrunque ipsorum caput destituitur: vbi cartilago etiam obducitur firmiorem, lubricamque magis articulationem reddens (summam extremorum articularum partem excipio) vbi neque appendicem, neque cartilagineam crustam inuenias; quandoquidem nulli alteri ossi ibidem coarticulatur. medulla & ipsa intus referta sunt, neque inani cavitare prædita.

## De Sesaminis.

## Cap. XXXV.

20

Sesam. ossium figura & situs.

Ossium sesaminis vsus primus.

Sesam. vsus secundus.

Mole in genu vsus

Sesam. vsus tertius

Sesam. vsus quartus.

Cur sesamina sint dicta.

Differentia duorum sesam. ab alijs.

Sesam. ossium substantia qualis. Medullosus succus continetur in sesaminis.

**D**ANTVR ossicula quædam orbicularia, depressa; sub infimis digitorum nō modo pedis, verum etiam manus articulis inter ipsa internodia iacentia, quæ quanquam non aliorum à natura fabricata esse videantur, quàm vt infarciant vacuū illud, quod iisdem articulis reliquum est: alios tamen vsus longe maiores præstant; quippe quæ non secus propugnaculo sint articulis, quàm soleat genu mola eam partem munire, qua cum femore tibia articulatur: & apprehendendis rebus firmitatem non modicam, & in pede humi æqualiter aptando commodum maximum afferant. Præterea facta sunt, vt articuli in ipsa flexione in acutum angulum non dirigantur. Hæc ossicula, quod parua admodum sunt: non formæ tantum ratione veteres sesami semini compararunt; vnde Græcis σισαμινεύς, Latinis vero sesamina ossicula, vel sesami figuram præ se ferentia dicta sunt. Excipi ab alijs iure possunt gemina illa, quæ sub interiore primi pedij ossis parte, qua cum primo articulo pollicis articulatur, reperiuntur. siquidem maiora sunt, & cartilagine quadam incrustata, quatenus videlicet articulo inhaerent, cum cætera multo maiora sint. omnia substantia sunt pene solidiore, quæ tamen intus fungosa est, ac porris scatet, vbi succus quidam medullosus pro nutrimento

30



mento feruatur. Numerus ofsiculorum incertus est, in nonnullis viginti, in alijs quindecim, in quibusdam decem, in alijs plus minusue. Hic obiter dictum illud velim, horum ofsiculorum causa nonnunquam euenire, vt luxati præsertim primi digitorum articuli minus commode reponantur. Nisi enim quis difficultatis rationem optime nouerit, nusquam plenam restaurationem molietur.

Nō est certus numerus ofsium sciaminis.

Cur luxatio in pede sit quandoque reposita difficilis Breuitati & perspicuitati studet.

Atque hæc de ofsibus: quibus explicandis tum breuitati, tum etiā perspicuitati studuimus; vt quoad eius fieri potuit: discientium utilitati consuleremus; eandem operam in cæteris, quæ sequuntur, præstaturi.

10

# REALDI COLUMBI CREMONENSIS DE RE ANATOMICA

LIBER II.

20

## DE CARTILAGINIBVS.



EQVENS hic Liber Cartilaginum naturam explicabit, ligamentorumq; fabricam, ac postremo sceleti componendi rationem. A Cartilaginis igitur, quod ea primo nobis proposita sit, descriptione exordiamur. Cartilago substantia quædam est media inter ossa, & ligamenta: Nam ofsibus tanto mollior existit,

Ordo tractandorū

Cartilaginis descriptio.

Cur cartilagini se-  
tiendum nō fuit.  
Cartilaginū vsus  
multiplex.

Natura & cartilag.  
compositione ad-  
mirabilis.

30

quanto ligamentis durior: albedine tamē cum vtrisque maximopere conuenit: ac sensus penitus est expers. Etenim neruos sentiendi auctores nullibi cognoscit; quod summa cum ratione factum esse fatebitur, qui Cartilaginum utilitatem callebit. Nam Cartilagine sentire minime decuit, siue operiendi, ac sustinēdi munere fungantur; siue propugnaculorum vices gerant: siue præsent, vt ne ossa iniuicem atterantur; siue efficiant, vt eadem simul annexa firmius cohæreant: siue sinus augeant; siue articulorum motus faciliores reddant. Iam vero easdem sic natura composuit, vt nullo vsquam modo frangi possint vbique sua mollitie cedentes: neque adeo resistunt sicuti ossa, nec impetu aliquo decidunt, aut extenduntur at-

N tractæ,

tractæ, vt ligamenta plærung; faciunt; verum in sese redeunt semper, neque sedem suam, vel formam facile commutant.

### De Palpebrarum Cartilaginibus. Cap. I.

Quibus animalib. cartilaginee superiores palpebrarum maiores quibus minores sint.



Cur membrana & cute inuestiantur palpebrarum cartilaginee.

Pilorum in cartilaginibus palpebrarum usus.

**P**RIMUM locum inter Cartilaginee illæ sibi vendicât, quæ oculorum palpebris contingere: Binæ quidem vtrinque supra, infraq; at superiores maiores longe sunt homini, atque ijs animantibus, quibus palpebræ superiores mouentur inferioribus immotis. Quibus vero contra, vt auib; pene omnibus, inferiores superioribus maiores existunt. Cæterum has Cartilaginee inuestiunt intus membranula, foris autem cutis, licet in palpebrarum extremitatibus tantum sita sint, quas validiores efficiunt, vt arctius conniueant, ita propugnaculi vicem oculis præbent. cui rei nõ minimum adferunt adiumentum pili in vtraque cartilagine non secus, ac in duriori solo infixi, vt ne mollius iaceant, aut languidius pendeant, sed stent erecti ad ipsam oculorum aciem dirigendam. 10

### De Aurium Cartilaginibus. Cap. II.

20

Vsus.

Cur crassiores superne.

vbi duriores, & cur.

Os tēporū vbi sit asperum, & cur.

Figura cartilag. aurium qualis & cur talis.

Cur aures ossæ non sunt.

Cur aures sint cartilagineæ.

**H**is proximæ geminæ illæ sunt, quæ vtrang; aurem constituunt, Hauditus foramini sic appositæ, vt ipsarum ope, atque opera longius id extendi, ac latius quodammodo patere videatur ad sonos promptius percipiendos. Crassiores superne cartilaginee hæ factæ fuerunt, ac præsertim iuxta foramen, vnde ortum habent; vbi duriores quoque sentiuntur ob temporis osis, vnde prodeunt, vicinitatem. Nimirum id os ad meatus auditorij circumferentiam asperum redditur, vt cartilaginee educat, ea ratione accommodatius: vbi etiam ita affixæ sunt, vt nullo momento, neque deorsum labi, neque sursum propelli possint. Intus, extraq; partibus constant tum simis, tum etiam gibbis, vt prominentes partes externæ internis cavitatibus respondeant. Supra rotundæ sunt, infra vero in pinnam desinunt: quæ licet ab ipsis cartilaginum finibus dependeat, cartilaginis tamen omnino est expers, cum neutiquam eius ipsius indigeat. In promptu nemini esse nõ potest, cur non ossæ aures natura efformauerit. quoniam si subtilitatem respexisset ex osse illas fabricatura, fractu faciles, & paulo momento defecturas nouerat: At si crassas, & solidas, quales esse debuerant, nimis profecto capiti onerosas. rectissime ergo ex cartilaginea substãtia leui, atque 30



atque ob sui mollitiem ab externis ictibus minus lædenda construxit. Quibus præterea non tam munimenti, quam decoris gratia pertinacem cutim aduoluit.

Cur aurium cutis sit pertinax.

## De Nasi Cartilaginibus.

## Cap. III.

**E**XTREMA nasi portio Cartilaginea facta est magna naturæ prouidentia, vt facillime claudi, malorum odorum ascensus prohiberi, ac rursum aperiri dilatariq; possit aeris attrahendi causa. 10 Præterea hæc narium substantiæ ratio, vt de auribus dicebamus, confert, vt vix lædatur ab extrinsecis, quibus sæpe occurrat: præssa enim cedit frangi omnino nescia. Quæ vtilitates adeo necessaria sublatæ forent, si narium fabrica vniuersa ex osse constaret. Quam obrem optime huic parti, sicuti cæteris sapientissimus rerum opifex consuluit, dum imas nasi partes cartilagineas condidit superioribus offeis annectens, vt inferioribus superiores veluti basis, ac firmamentum forent, quando hæ ab illis pendere debebant. In tres ergo cartilagineas nasi extremitas distincta est. quarum duæ latera constituunt, quas pinnas, seu alas vocarunt, quasq; 20 cartilago interfecat, vnde nasi foramina duo conficiuntur. Hæc media osseo nasi septo finitima respondet. Pinnæ autem ipsæ solæ sunt quæ mouentur, cum proprijs donatæ sint musculis extrorsum illas ipsas trahentibus, vt dilatentur. sed introrsum nullo peculiari musculo adducuntur. Tamen Vess. internos quosdam musculos somniauit, qui mihi nusquam reperti sunt. Cæterum laborum beneficio clauduntur, quemadmodum loco suo vberius ostendetur.

Cur extremus nasus sit cartilagineus.

Cur totus nasus non est osseus.

Cur superior nasi pars sit ossea.

Tres nasi extremitates cartilagineas.

Cur solæ pinnae in naso moueantur.

Vessalij error.

Quomodo pinnae narium claudantur.

## De Maxillæ inferioris Cartilaginibus. Cap. IIII.

30 **P**RIORE libro, vbi de Maxilla inferiore loquuti sumus, duarum cartilaginum obiter meminimus, quas inter superiores eiusdem maxillæ processus, ac temporum ossa haud dubie reperies. mobiles quidem illæ sunt, nec alia de causa fabricatæ, quam vt frequentem maxillæ motum tanquam in lubrico ponerent. vix enim verisimile fit articulum illum quamlibet laxum sufficere posse: quin etiã inter edendum, loquendum, atq; oscitandum ossa hæc attererentur, aut saltem labore nimio fatigata ab ipso tandem motu desisterent: nisi cartilagineas istas mobiles adessent, quarum beneficio, quandocūq; opus foret, maxilla promptius moueretur nullum fere quietis, aut cessationis tempus requirens.

Situs.

Vsus.

## De Asperæ Arteriæ Cartilaginibus. Cap. V.

Trachea & larinx  
antiquis ex car-  
tilag. constat.

In brutis substantia  
laringis cartilagi-  
nea est.

Hominis in consi-  
stente ætate con-  
stituti larynx ex  
ossib. constitui cur  
Epiglottis quid sit.

Cur Epiglottis sit  
cartilaginea.

Cur de laringis  
partib. plerisque  
loquatur in libro  
de ossibus.

Anulorū tracheæ  
substantia qualis.

Anulorum figura  
detracta membra-  
na qualis.

In Angina quādo-  
que secāda mem-  
brana inuestiens  
anulos tracheæ.  
Asperæ arteriæ p-  
gressus.

**T**RACHEAM Arteriam, atque eius caput laryngem ex cartilaginibus, non ex ossibus constructam esse cum veteres, tum recentiores Anatomici existimauerunt. quorum authoritati subscribere non grauaret, nisi rei natura multo aliter haberet. Neq; mirum videri debet, tot celebres viros hallucinatos esse in substantia laryngis. facilis enim est error, si brutorum, vt bouis, & huiusmodi aliorum laryngem intueare, qualem Vessalius publice semper fecare, atque ostentare consueuit. Verum si humanam inspexeris, 10 præsertim in cōsistente ætate, procul dubio ossicula omnia, ex quibus conficitur, agnosces epiglottide excepta, quæ fistulam tegit. Ea vero linguæ formam referēs lingula nuncupari latine solet. græcam vocem magis amantibus Epiglottis dicitur. Quam cartilagineam esse oportuit, vt sine vlla noxa cōtinuum motum admitteret, qui expirando, inspirandoq; continenter editur, præterquam quod moueri quoque illam necesse est, dum aliquid deglutimus, dumq; loquimur, vbi modo attollitur, modo deprimitur, ac præterea in vomitu ad contraria reuellitur: quos motus facillime consequitur cartilagine in quamlibet partem cedente. At reliquas laryngis par- 20 tes, quoniam osseam naturam, vt antea diximus, sapiunt; nos inter ossa connumerauimus proprio de illis capite. Quod autem laryngem sequitur, asperæ arteriæ tractu finitur, idque totum cartilagineum est, & crebris anulis distinguitur. qui tamen anuli nō ex continua cartilagine constant: siquidem parte posteriore vertebrae versus, vbi oesophagus, siue gulæ canal is iuxta extenditur, intersecti sunt, membranula tamen eos illic copulante. Nō enim abrupti esse poterant: at nihilominus ipsi oesophago cedere illos operæpretium erat, ne deglutiendis cibis, cartilaginis compressione patere- 30 tur. Hanc membranulam si detrahas, protinus anuli diuulsi apparebunt, ac formam C nostri elementi præ se ferent. Iam vero simul iunguntur vestiente membrana, quam in acutissimo Anginæ affectu præscindere fortasse non ab re foret. Hic asperæ arteriæ ductus sub iugulis desinit, vbi duos in ramos scinditur, qui rursus in alios duos, itemq; ij in alios, ac demum omnes per Pulmonum substantiam disperguntur aerem inspiratum, ac expiratum deferentes.

## De Spinæ dorsī Cartilaginibus. Cap. VI.

**D**ORSI spina vertebrarum serie producitur, quarum corpora supra, infraq; cartilaginibus crassis committuntur. primam  
tamen



tamen vertebram excipito, quæ corpore caret, nec vlla cartilagine donatur. Præstant autem huiusmodi cartilagines, vt laxior quodammodo sit corporum vertebrarum inuicem facta articulatio, quo facilis antrorsum, retrorsum, & in vtrunque latus flecti possint. Hæ vertebrarum corporibus latitudine respondent illorum superficiem æquantes. Ideo quemadmodum illa in descensu magis augentur, ita quoque cartilagines maiores, crassioresque fiunt, vt grauiore ossium mole depressæ non deficerent. Sub osse sacro, vbi Coccyx affigitur, cartilago similiter afsidet: ac præterea inter primum, ac secundum eiusdem os interposita est, multa quidem illa, & præcipue in mulieribus: quoniam dum pariunt, cauda ipsa versus posteriora trahitur; cum tamen in viris nunquã à sua sede dimouetur.

De Cartilagine quæ in superiore pectoris parte posita est. Cap. VII.

**S**VMVM sternum vtrinque cartilaginem habet, quatenus iugulorum annexum admittit, quæ mobilis est vsus eisdem præstans, quales in maxilla inferiore non absimilem cartilaginem præstare diximus; quanquam non tam prompti, nec tam crebri sint hic, quàm illic motus: in magnis tamen vociferationibus, nec non in deglutendis cibis plurimum inspirationi, atque expirationi conducit, dum pectus modo contrahitur, modo assurgit: ac demum totius brachij motum expeditiorem efficit.

De Cartilagine medio pectore posita. Cap. VIII.

**I**NTER primum, & secundum os pectoris cartilago quædam sita est, quæ mollis existit, ac ligamenti vicem tenet, & idoneam motui magis superiorem partem reddit.

De Costarum Cartilaginibus. Cap. IX.

**C**OSTIS quoque adnascuntur cartilagines veluti appendices quædam, quatenus solum partem anteriorem respiciunt, tam veris, quæ pectoris ossi committuntur, quàm nothis costis donatæ. In quibus illud animaduertere est, quod breuioribus costis breuiiores quoque cartilagines contingere; longioribus autem longiores. Huc adde quod superioribus rotundæ cartilagines, inferioribus vero non acutæ prominent: Idque, vt costæ facilius pulmonis motu subse-

Prima vertebra dorsi cartilagine caret.

Cartilaginum vertebr. vlt.

Cartilag. vertebr. figura.

Cartilago sub sacro.

Cartilago inter ossa coccygis.

Cur cartilago inter primum & secundum os coccygis i mulieribus multa.

Situs.

Vltus cartilag. mobilis in summitate sterni multiplex.

Cur medij pectoris cartilago mollis.

Costæ tum veræ, tum spurie cartilagines habent. Costis, breuioribus, breuioribus sunt cartilagines & e conuerso.

Cur varia sit figura cartilaginum costarum.





xendicis os ibi excuari poterat, quantum femoris capitis longitudo postulabat. Iam vero ab inferioribus femoris capitibus ad supremam tibiæ regionem binæ cartilagines inueniuntur, altera interior, exterior altera, semicirculares, & inrorsum perfractæ ad tuberculum illud desinentes, quod è media tibiæ superficie assurgit, vbi pariter annectuntur. factæ sunt, vt sinus in summa tibiâ hinc inde exculptos adaugerent, quo aptius imi femoris capita illis inferrerentur, nec tamen articuli motus impediretur.

Cartilagines duæ  
in inferiorib. capi-  
tibus femoris.

Vfus earum.

10 De Cartilagine iuxta brachiale posita. Cap. XII.

**V**ERVM ad Brachiale veniamus, de quo post omoplata cartilaginem statim dicendum fuerat. Iuxta stylum, qui ab extremo cubiti capite progignitur, quemq; falso Gal. voluit cum quarto Brachialis osse coarticulari, sicuti capite suo probauimus: apposita est cartilago, quæ locum illum, alioqui vacuum implet, tum vero cauet, ne manus extrema, dum ad latus deducitur, in acutum illum processum impingat, atque eo modo non minimum lædatur.

Situs.

Galen error.

Vfus.

20 De Cartilagine sita inter pubis ossa. Cap. XIII.

**I**NTER pubis ossa tibi occurrit cartilago insignis pertinaciter inherens, quæ parte superiore lata, & crassa in descensu paulatim imminuitur, ac demum in acutum desinit ibi enata, vt ossa hæc nõ secus, ac tenacissimum glutinum committeret, atq; adeo connexa inuicem redderet, vt connata rectius, quàm coniuncta existimerentur. Vnde superiore libro illorum opinionem reprobauimus, quos asserere minime puduit in emittendo fœtu ossa hæc referari: quandoquidem dimoueri nullo modo posse nouimus: cum sæpe non modico labore nostro cultro diuidenda curauerimus.

Cartilaginis inter  
ossa pubis substantia,  
& figura.

Vfus.

Ossa pubis aperiiri  
i partu fallum è.

De Articulorum Cartilaginibus. Cap. XIII.

**D**ANTVR præterea articulis quibusque cartilagines, siue motus ex ijs obscurus prodeat, seu manifestus. Cartilaginibus autem in crustata ossa ibi esse debuerunt læuibus, ac lubricis, vt faciliore motu cierentur; neque tamen ex mutua confractione attererentur. propterea videre est mucum superadditum, quo veluti pinguedine quadam articuli ipsi inungerentur, quemadmodum locis multis est superiore libro repetitum.

Cur ossa in articulis  
cartilagine in-  
crustentur.

Cur in articulorum  
cartilaginibus ad-  
sit mucus quidã.

## De Vnguibus. Cap. XV.

Vnguium natura  
qualis.Vnguîû color di-  
uersus a colore  
cartilaginum.  
Cur de vnguibus  
agat post carti-  
lagines.  
Vnguium vsus.

Vnguium origo.

Cur sub vnguibus  
sit sensus exqui-  
situs.

**Q**UANTUMQVAM mediam quandam naturam inter ossa, & cartilagine vnguibus inesse nonnulli vere iudicarunt, quia neque ea duritie sunt, qualem in ossibus experimur, neque molles ita, ut cartilagine, à quibus præterea colore plurimum dissident: nihilominus hos cartilaginum tractationi adiunximus; cum ad ipsarum naturam propius accedere videantur. Earum enim ritu mollissimam digitorum superficiem tuentur, ne ab extrinsecus occurrentibus lædantur: ac ideo firmamentum non modicum ob sui duritiem præbent, apprehendendisq; durioribus rebus vsui sunt perneccessario, cum interim flecti, & cedere parati sint, ut ne frangantur. Vngues tum à cute, tum à tendinibus musculos digitorum extendentibus originem trahunt, quâquâ tendines sub vnguibus vsq; ad digitorum extremitates deferantur. hic enim postmodum dilatantur. Quamobrem perspicuum est, cur sub vnguibus tam exquisitus sensus delitecat: quod ego primus obseruaui, & Excellentissimo medico Alexandro de Ciuitate rei anatomicae studiosissimo lubes ostendi.

10

20

REALDI COLVMBI  
CREMONENSISDE RE ANATOMICA  
LIBER III.

## DE LIGAMENTIS.

Nomen.

Substantia.

Situs in vniuersum

Vsus.

Nominis interpre-  
tatio.

**L**IGAMENTVM (ut à nominibus interpreta-  
tione exordiamur) à Græcis *συνδεσμος*. i. vincu-  
lum appellatur. Substantia constat, dura quid-  
em, sed quæ tactui cedit, & albicat. quæ du-  
rities minor etiam in eo est, quàm in cartilagi-  
ne. ab osse incipit, & in os definit, præter quæ-  
dam, ut priuatim magis suo loco explicabitur.

Factum est igitur ligamentum, ut membra nostra colliget, proptereaq; id nomen sortitum est. Dissoluti nanque absque eo essemus, neque moueremur. Sed ut ad ligamenti substantiam redeamus, licet neruea videatur esse, est tamen sensus omnis expers, instar ossis & cartila-

30



cartilaginis. qua in re miris laudibus extollenda est naturæ providentia: nam si præditi essent sensu Syndesmi, cum ossa mouerentur, non possemus nõ laborare. Præterea genita sunt etiam ob muscutorum productionem ligamenta, quemadmodum, adnotauimus, cum de appëdicum vñ tractabamus. Nutriuntur autem tenui medulla: propterea inter ossa & appendicem natura collocavit ligamenta, vt suum ita ad sese commodius attraherent alimentum. Sed quamuis idem pene sit ligamentorum omnium situs, vt dixi in alijs, tamẽ plurimum inter se differunt: nam ex ijs alia crassa sunt, alia tenuia, alia magna, nonnulla parua, alia lata, angusta alia, quædam teretia, quædam vero minime, & alia differentias diuersas sortita sunt, sicuti tunc expressius dicitur, cum particularis eorum fiet distinctio. Quod vt ordine fiat, à capitis ligamenti iniciũ faciemus. Est enim pars princeps caput, quidquid hac de re sentiant philosophi.

Cur ligamēta sensu careant.

Vñs alius ligamētorum.

Ligamentorũ nutrimentum.

Ligamentorũ differentia.

Caput est pars reliquarũ princeps quidquid dicant philosophantes.

### De Capitis Ligamentis. Cap. I.

**A** CAPITIS igitur ossibus, maxillæq; superioris inter suturas, Atque harmonias ligamenta exoriri videbis, tenuia quidem, sed lata; quæ præterquam quòd hæc ossa vnà valido nexu vinciunt, ob eorum etiam muscutorum originem facta sunt, quæ ab hisce partibus ortum ducunt, vt musculi tum faciei, tum inferioris maxillæ & oculares, quos omnes à futuris, aut harmonijs exoriri videbis.

Situs.

Vñs.

### De ligamentis caput cum duabus primis vertebris necentibus, Cap. II.

**C**VM articulatio capitis cum vertebris nobilior, magis excellens maiorisq; momenti existat, quàm reliquæ sint articulationes, quid mirum si natura humano generi mater diuino spiritu afflata maiorem curam, diligētiamq; in hac vna quàm in reliquis adhibuerit? Nam cum tanta moles, quanta caput esse cernitis, tam exiguis vertebrarum ossibus connectenda foret, præter processus atq; in ossibus cavitates ligamenta meditata est, eaq; validiora quàm cætera omnia nostri corporis. Cum enim articulatio hæc luxationem nullo pacto patiat, est nanq; capitis luxatio lethalis, curauit eiusmodi esse ligamenta quæ partes hæc adeo arcte fideliterq; continerēt, vt difficillima horum sit luxatio. Licet vulgo existiment in ijs qui suspenduntur, longamq; literam suspensi efficiunt, caput luxari. quæ sententiam ego profecto inanem esse falsamq; deprehendi, neque

Articulatio capitis cum vertebris nobilissima est.

Cur ligamenta capitis cū vertebris primis validissima sit. Capitis luxatio lethalis est.

In suspensis laqueo caput non luxat.

O semel

Secunda vertebra  
facilius frangitur  
quàm luxetur.  
Io. Fraciscus Má-  
fredus.

Origo ligamenti  
huius.  
Cur occipitiū sit  
in pueris multifi-  
dum.

Figura.  
Error quorundam  
de situ.

Locus verus liga-  
menti huius.

Ligamentum den-  
tis secundæ ver-  
tebræ.

Ligamentū terciū

Vñs terciū liga-  
menti.

Cur de singulis li-  
gamentis nō agit.

Galenus error.

Vñs verus mem-  
branulæ quæ est  
in vertebrarum  
foramine.

Omnes vertebrae  
habent appendi-  
ces primis duab.  
exceptis.

Ex appendicibus  
vertebrarū oriun-  
tur ligamenta.

Cur ligamēta ver-  
tebrarum sint va-  
lida.

semel duntaxat, sed sæpius Patauij Pisis Romæq; . Tantum etenim  
esse huius ligamenti robur animaduerti, vt frangi facilius quàm lu-  
xari secunda vertebra possit, neq; secunda solum, sed prima quoq;  
quam rem Ioannes Franciscus Manfredius excellens medicus ana-  
tomes studiosus & familiaris meus non potest satis mirari. A basi  
itaque occipitis ligamentum exoritur, quod vt melius aleretur, sta-  
biliusque existeret, natura occipitium in pueris multifidum genuit,  
vt huic stabilimentum esset maius. orbiculare est hoc vinculum, &  
deorsum descendens inter primam, secundamq; vertebra; non fi-  
gitur vt nonnulli sunt opinati, sed vtriq; circumquaque validissime  
adhæret ita vt vel in mortuis ipsis difficillime diuelli queat. adhæret  
autem dictis ossibus ante retroq; & ad latera. Præter descriptum à  
nobis hætenus ligamentum, adest aliud quoq; validum satis, quod  
denti secundæ vertebrae valide adnectitur. præter hoc adest, & ter-  
tium quod ab interiore primæ vertebrae parte exortū secundæ den-  
tem continet ( dictum est autem in tractatu de ossibus de hoc dēte )  
est teres sed admirabili arte latera ipsius cōstructa sunt ne dens cum  
caput nimis inclinandum est spinalem medullam læderet, quæ illac  
transit. Atque hoc se habent pacto ea ligamenta, quæ capitis moti-  
bus deseruiunt. Et quoniam nimis prolixi essemus, si de singulis  
vniuscuiusq; articuli ligamenti priuatim tractandi prouinciam su-  
sciperemus, propterea omnia capite vno comprehendemus, eaq;  
præsertim quæ in re alia non discrepant inter sese, nisi quòd hæc ma-  
iora sint, illa minora. idcirco maxillam inferiorem silentio præteri-  
bimus, de cuius ligamenti post capitis ligamenta tractādum foret.  
De alijs igitur agam quæ aliquo pacto differunt. Et quoniam scri-  
bit Galenus libro de ossibus, vertebrae medio proprio ligamento  
non coniungi, sed à tertia duntaxat tunica, quæ spinalem medullā  
inuestit ( quam tunicam mediam inquit inter vertebrae ferri, easq;  
connectere ) scito dictum hoc profecto tanto scriptore indignum es-  
se. quo enim pacto illi verisimile videri poterat, vertebrae ossa nō  
parua à tam exigua membranula, quæ est in vertebrarum foramine,  
qua spinalis medulla trāsīt, contineri posse? vñs autem verus mem-  
branulæ illius est, ne spinalis medulla ossibus immediate occurreret,  
à quibus lædi facile potuit. ex qua re maximum incommodum non  
sequi non poterat. Sciendum itaque est vertebrae omnes ( primas  
duas excipio ) infra supraq; appendicibus præditas esse, quemad-  
modum suo loco dictum est, è quibus valida exoriuntur ligamenta  
vertebrae inter sese colligantia, cartilaginemq; inter vertebrae me-  
diam detinēt. Valida vero fuere satis, propterea quod onus ingēs  
vertebris

10

20

30



vertebris gestandum fuerat, & magnis validisq; motibus resistendum, horum autem ligamentorum hic est deductus. ab inferiore scilicet secundæ vertebræ parte ad coccygis vsque extremum, circa cuius corpus sunt sita. ab eius transuersis processibus alij insuper prodeunt ob muscutorum & costarum compagem, à posteriori quoque alia emergunt, cum vt vertebrae necitat, vnà, tum ob nonnullorum muscutorum exortum.

Deductus ligamentorū vertebrarū.

Vtus ligamentorū à transuersis processibus.

## De hyoidis ac linguæ ligamentis. Cap. III.

10

**I**NTER ossa hyoides constituenta ligamenta transeunt ob linguæ constructionem, à duobusq; processibus maioribus duo proficiuntur, quibus summæ linguæ articulatur. Duo præterea alij à styloidibus exeunt, in duosq; minores hyoidis processus immittuntur, idq; instar duarum catenarū suspensum detinent, quemadmodū Mahumetti arcam ferream à magnetis vi attractam in aere aiunt suspēdi. Adest insuper sub lingua ligamentum, quod multis adhæret locis ad dentes vsq; anteriores. hoc linguam attolli non finit, non finit labra exire, impedimentoq; est ne loqui possimus, hoc est dearticulatas voces efferre: propterea hoc secamus, vt hæc impedimenta tollantur.

Duo ligamēta summæ linguæ.

Duo ligamenta ossa hyoides suspensum detinentia.

Mahumetti arca.

Ligamentum sub lingua.

Cur in pueris ligamentū sub lingua secetur ab oblitricibus.

## De Ligamento brachialis. Cap. IIII.

30

**Q**VONIAM brachiale ligamentum ab alijs articulis diuersum obtinuit, propterea de hoc separatim agemus. Ligamentum igitur brachiali deferuiens oritur ab appendice inferiore cubiti radij, cuius munus esse videretur, instar aliorum articulorum prosequi ad postbrachiale. sed quia octo brachialis ossa in duos distincta sunt ordines, illi inter ea ingrediendum fuit, ne in motu è situ suo elaberentur. prudens igitur natura ligamentum parauit validum satis, quod hæc ossicula subit, itaque colligat, vt proprijs motibus edendis idonea esse possint, sed in appendicem ossis postbrachialis tandem implantatur, deferuitq; brachialis articulationi. In hac eadem regione alia adfunt ligamenta articulandis ossibus minime deferuiencia, sed illis duntaxat tendinibus continendis, qui cum digitis tum extremæ manui famulantur: idq; ne dum mouentur hac atque illac temere ferrentur. in interno itaque brachiali ligamentū validum cernes, idq; transuersum, quod tendines continet quarti, quinti, sextiq; muscutorum digitos flectentium. In externa vero sex ligamenta cernere est, tendines item extendentium muscutorum

Ortus.

Insertio.

Ligamenta tendinum digitorū & extremæ manus.

Ligamenta tendinum muscutorū extendentium vnū

videntur sed sunt  
sex.

De ligamentis cō-  
tinētibus tendi-  
nes per longitu-  
dinem digitorū.

Galenus errauit li-  
bro de Vlu Part.  
sed errorē agno-  
scit libro de ad-  
ministrandis Sect.

continentia. Illudq; maxime animaduertendum est, hæc quæ dixi ligamenta primo occurſu vnum videri. Verum si tendines perfecti accurate non grauaberis occurrent tibi sex ligamenta transuersa à dictis duabus appendicibus ortum ducentia. Sed posteaquam ad hunc locum deuenimus, operæpretium facturus videor, si de ijs ligamentis tractauero, quæ tendines continent per longitudinem digitorum. Animaduertendum itaq; est ab internis ossibus digitorum à lateribus iuxta eorum longitudinem adesse ligamenta ad extremitatem tendinum vsque pertinentia, quæ hoc in loco prudenter natura collocauit ne in flexione tendines extra ipsorum sedem attollerentur. propterea Galenus libro de vsu Partium aiebat ope tendinum quinti musculi tertium internodium flexcentium primum quoque flexi. at rei veritatem lib. de administrand. Sect. agnouit.

10

### De Ligamentis femoris, tibiæq; . Cap. V.

Cur quādoq; æger  
claudicat licet lu-  
xatio coxendicis  
sit reſtituta.

**I**N articulo femoris cum osse coxendicis ilei, ac pubis, præter membraneum quidem vinculum, sed crassum, quod articulis omnibus commune est, ligamentum videbis teres ac longiusculum, quod cum à profundo acetabulo ortum ducat, in superius femoris caput insertum deperditur, idq; roboris ergo; quod dum hæc pars laxatur sæpenumero disrumpitur: & quamuis os in locum pristinum redeat, luxatus tamen semper claudicat: hoc enim ligamentum impedimento est quominus ossa illa cohæreant. Inter capita item inferiora femoris, summamq; tibiam in interiore parte genu adest ligamentum crassum, quod & ab eorum appendicibus exoritur, & in ea definit. constructum est autem vt has partes contineat. cum etenim his duobus articulis nullus in corpore maior existat, quid mirum si natura prudens hoc loco eiusmodi apposuit ligamēta, qualia nusquam apposuerat, præterquam inter caput & duas primas vertebrae, cum ab hoc tertio ligamento disceſſeris adest aliud, quod genu articulationem fere circuit, sed hinc atque hinc genu rotulam ambit, à qua duntaxat detinetur. Imperiti complures opinantur id genus ligamenti teretis inter caput humeri, scapulamq; reperiri, sed mire falluntur, quemadmodum qui sensu pollet experiri facile poterit.

20

30

Ligamentum ambi-  
ens rotulā genu.  
Inter caput hume-  
ri & scapulā nul-  
lum adest teres li-  
gamentum.

De ligamento quod inter sacrum os & coxendicis situm est. Cap. VI.

**Q**UANTUM nates cernis, inter os sacrum, & coxendicis ligamentum adest, quod tantum non est teres. id autem oritur ab extremo osse

Origo.



osse sacri, transuerfumq; definit in acutam coxendicis partem, colligat hæc ossa, proptereaq; factum est vt colligata detineat, licet alter vñs adduci possit, vt scilicet maiori neruo qui in homine reperitur aditus pateat.

Vñs.

## De ligamentis transuerfis in pede. Cap. VII.

**I**N extremi pedis articulo inter ipsum tibiãq; & fibulam, præter id vinculum, quod iuncturis omnibus commune est, sex alia cõspiciuntur, qualia in exteriore brachiali cernebas. vñs horum est, vt eos tendines contineat, qui extremo inseruiunt pedi, digitisq; qui nisi hic tendines adessent, à suo situ nullo negotio dimoueretur. subsunt quoq; pedis digitis ligamenta, quemadmodum digitis manus. Cõstruxit autem ipsa natura, vt in officio cõtinerent tendines illos, qui digitos flectunt, secundũ inquã, tertiumq; internodium.

Sex ligamenta extremi pedis proportionẽ respondent ligamentis brachialis exte-  
rioris.  
Vñs.

Vñs ligamentorũ quæ pedis digitis subsunt.

## De ligamento reliquorum articularum. Cap. VIII.

**A**RTICVLIS omnibus ligamentum commune est: id vero ab osse vno ortum ducit. ab appendice nimirum, & in aliam definit. hæc vero in orbem amplectuntur, nec defunt alia laxiora, angustiora alia, iuxta ossium magnitudinem paruitatemq;. Ideo hoc loci de omnibus ligamentis actum existimato, quæcunq; thoracem vinciunt, scapulas, iugulaq; necnon inferiorem maxillam, humerum, cubitum, digitos, fibulam, tarsum, ossa pedij. quod si de ligamenti ilij pubisq; interrogas, hæc ab alijs præterquam in motu non differre, respondebo.

Quid cõmune sit omnib. ligamẽtis

Enumeratio partium cõplurium quæ ligamenti prædita sunt.

## De ligamentis cubito, tibiæ, ac pubi appositis.

## Cap. VIII.

30

**I**NTER cubitum, radiũq; inter tibiã, ac fibulam iuxta eorum longitudinem membranofum ligamentum cernere est, quod inter horum ossium interualla situm est, cuius vtilitas est non modo vt vniat, ac vinciat, sed vt interiores musculos ab exterioribus distinguat. eodem se habent pacto vincula, quæ sunt in pubis foramine nonum musculum à decimo diuidentia.

Ligamẽtum membranofum.  
Vñs.

Ligamenti pubis vtilitas.

## De ligamento hepatis. Cap. X.

**H**EPAR duobus præcipuis ligamentis continetur, quorum alter dexteram, alter leuam partem respicit. Ex quibus sinistrũ dextero

Duorum ligamen-  
torū iecoris vñs.  
Mediastinum, peri-  
cardium, pleura,  
peritoneum sunt  
membranæ potius  
quā ligamenta.  
Iecoris ligamenta  
non sunt prorsus  
sensu destituta.

dextero crassius admodum est. hæc septo transuerso hepar adne-  
ctunt, ne deorsum sua mole ac pondere procumberet. Horum igi-  
tur ligamentorum dexterum suspensorium vocitant, at finistrum  
nullo peculiari nomine insignitur.

Locus admoneret vt de mediastino, pericardio, pleura, necnon  
peritoneo, verba facerem: nam hæc quoque sunt ligamenta: sed  
de his in tractatu de membranæ sermonem reicimus: quoniam si  
res ad viuum secaretur membranæ sunt potius, quàm ligamenta,  
cum hæc sensu aliquo sint prædita, quo vera ligamenta omnino ca-  
rent, cum à iecoris ligamenti discesseris. hæc enim sola inter liga- 10  
menta non sunt prorsus sensus expertia.

## REALDI COLVMBI CREMONENSIS

DE RE ANATOMICA  
LIBER III.

DE SCELETO.

20

Sceletos.



Sceleti descriptio.

AMPRIMUM omnium quid Sceleti nomine si-  
gnificetur, explicandum est. Sceletos igitur  
Græcis hominibus nihil aliud significat, quàm  
ossium exiccatorum cadauer. cuius inspectio  
non modo nostris, sed priscis etiam tempori-  
bus in vsu extitit, quemadmodum ex Gal. pri-  
mo de administrandis Sectionibus colligere  
possumus, vbi historiam recitat, quo pacto ipse discendi cupiditate 30  
inflammatus se in Alexandriam contulit, quo loco medici aderant,  
qui hanc humani corporis ossium compagem se docere profitebã-  
tur. atque ibi duos sceletos suis oculis vidit, quorum alter suspen-  
sus pendebat a uibus expositus, quæ carnem, quibus ossa vestiun-  
tur, vniuersam deuorauerant ossibus relictis, quæ suis inuicem li-  
gamenti detinebantur: alter vero in sepulchro iacebat; qui à Nili  
fluctibus uehebatur, tandemq; ad ripam fluminis appulit, vbi con-  
stitit; erantq; illius ligamenta exiccata. Sed profecto (pace Gale-  
ni dixerim) neuter horum ossium disciplinæ accommodari poterat:  
Nam in his duobus sceletis articuli omnes ossium ligamentorum  
velami-



velamine delitescere cogeantur; at absque articulationum ossium exacta cognitione imperfecta est sceleti cognitio, & historia. qui enim scias, nunquid vlla adsit cavitas, tuber vllum: atq; hæc omnia altius ne, an in superficie sita. fuscipiant ne an fuscipiantur: atq; alia id genus complura, quæ in ossium explicatione maximum docenti, discentiq; afferunt adiumentum: quemadmodum ingenue fassus est excellens Franciscus Frigimelica, cui ars medica multum debet.

Is Patauij hominis sceletum suis cum ligamentis calce detinebat, idq; in illius florentissimæ Academiæ gratiam, cui semper prodesse  
 10 studuit. Sed in sceleto proprijs ligamentis iuncto non posse omnia disci, doceriq; optimus vir cognouit. Sceletos itaq; constare debet ex ossibus, quæ prius coquere, hoc est elixare maxima cura debes, quicumque sceleton domi parare studes. cura inq; magna in ossibus elixandis adhibenda est; ne processus, cartilaginesq; in earum extremitatibus incrustante aliqua in parte lædantur. Cadauer autem, ex cuius ossibus sceletos construendus est; esto iuuenis non obesus, statura pusilla potius, quàm procera; nam visu pulchrior euadet. hoc cadauer, quale descripsimus, excoriandum primo est, deinde caro adimenda omnis, quoad eius fieri poterit, visceraq; omnia interna abijcienda. Illud autem obseruandum est, vt dum fabricam hanc humani corporis expolias, aures diligenter adimas, seruesq; item nasi dimidium; extremum illud scilicet narium, quod cartilagosum existit: item palpebras, os hyoides dictû, laryngem vnà cum frustulo asperæ arteriæ. Postquam hæc omnia accurate effeceris, cranium secandum est, supercilia versus, idq; propterea quòd cavitas in fronte latitans huiusmodi sectione detegetur. Cerebrum postmodum vnà cum membranis à cranio ita separandum est: vt interna caluariæ pars munda prorsus, atque sordium experts relinquatur. Deinde secundam vertebam à tertia omni industria  
 30 separato. Deinde maxillam inferiorem adimito, ea tamen lege, ne cartilaginem illam mobilem, quæ inter caput, maxillamq; inferiorem sita est, vel tantillum labefactes; hanc chartis seruato. Deinde costarum cartilagines sensim à costis ipsis seiungito. Sinito tamen dictas cartilagines ossi pectoris adhærentes, neque vlllo pacto diuulito. Extremas item costas, cum cartilagine non iungantur sterno; alijs adimes quoque cartilagines suas, ac in papyro itidem pones. Summa quoq; diligentia adhibenda est, ne dum has vnà cum sterno eximis, duas mobiles cartilagines lædas, quæ inter iugula, sternumq; sunt sitæ, quemadmodum de mobili cartilagine, inter caput, maxillamq; inferiorem paulo ante dicebamus. Illud autem de sterno cum

Quomodo sceletos parari debeat

Ex qua statura parandus sceletos.

Obseruatio in expoliando sceleto.

Cranii sectio.

Cartilagines pectoris ossi relinquendæ.

Cartilagine non  
sunt coquenda.

Appendices non  
lædendæ.

Cartilagine filo  
excipiedæ vel in  
chartis seruandæ.

An quartū os bra-  
chialis vniat cū  
styloide.

no cum cartilaginibus meminisse oportet, hæc in cacabum non im-  
mitti: non enim coquuntur, sed soli exposita exiccantur, itaq; ser-  
uantur. larynx item, & hyoides os, & aures, & nares, & palpebræ  
eodem modo seruanda sunt separatim; neque enim vllum ex his co-  
quitur. Postquam hæc omnia absolueris, costas à corpore verte-  
brarum paulatim diuelle, necnon ab eorum transuersis processibus.  
quod si in ofsium scientia parum versatus fueris; sinistras costas vnâ  
vincies, atque à dextris semoueabis: Dextras item à sinistris separa-  
tas colligabis, ne misceantur, idq; ordine facies, vt primo primam, 10  
secundam deinde, & tertiam successiue. Ablatis costis, incipe eas  
cartilagine amouere, quæ inter vertebrâ, & vertebam sunt; idq;  
gladio facito, cuius acies tenuis sit, & dictum, ac factum incidat.  
Incisio vero ad corpus vertebrarum perreptet. Caue tamen, ne ad  
illud ita accedas; vt appendices lædas, quæ nõ admodum duræ exi-  
stunt: itaque progredere vsque ad ofsis sacri summum; easq; carti-  
lagines chartis impone, idq; ordine facito, vel eas acu perforatas  
filo excipias. idem dictum puta de cartilagine, quæ inter sacrum &  
coccygem sita est, & inter ossa pubis. Quo vero ad dorsum per-  
tinet, vniuersum in tres partes diuidito, & separatim colligito; vt  
in lebetes melius aptentur. His peractis, diligenter inspicere pote-  
ris, nunquid in acromio tertium illud os adsit, quod Galenus in ho- 20  
minibus duntaxat inueniri asseuerat; & scapulam ab humero separa-  
bis. Præterea circa scapulæ concauum, vbi cum humero articula-  
tur; cartilaginem illam tolles, quæ ibi à natura de industria apposita  
fuit; vt sinus ille profundior euaderet. Postmodum separabis hu-  
merum à cubito, rursus à cubito extremâ manum. quod dum agis,  
animaduerte, obsecro, an styloides processus quartum os brachia-  
lis ingrediatur: quemadmodum Galenus scriptum reliquit; nec ne  
suspice quoque supra styloidem; nam mobilem ibi quoque cartila-  
ginem inuenies, quam chartis recludes, vt supra. De alijs id genus 30  
sæpius admonuimus. Deinde femur à coxendice diuelles; & hoc  
etiam loco circa acetabulum mobilis tibi occurret cartilago instar  
illius, quam circa scapulam obseruaueras. seiunges etiam à tibia fe-  
mur. neque hic defunt duæ cartilagine, eaq; mobiles à natura ef-  
fectæ, atque efformatæ in eundem vsum, vt scilicet tibię cavitates  
amplificarent, atque attollerent, à quibus capita inferiora femoris  
suscipienda erant. illud quoq; meminisse oportet, patellam adhæ-  
rentem relinquendam esse; ne sinistra, dextraq; confundantur.  
Post deinde extremum pedem à tibia distinguito; & cartilagine  
vel chartis recludito, vel filo, vt lubet, excipito. Idem agendum  
est, vt



est, vt supra attigi, de auribus, naribus, palpebris, hyoide, larynge, & cartilaginibus omnibus, quas ademeris, & de sterno, quod nullo pacto aqua ablundum est. Reliqua in cacabum indes; ibique aliquandiu finito, vt molliora reddantur; & quod reliquum est carnis adhærens maceretur. bene abluto bis, terq; , & tunc terebello paruo perforabis caput superius, inferiusq; tum humeri, tum cubiti, tum radij, tum femoris, tum tibiæ, tum fibulæ: ferrumq; huic rei aptum per foramina dicta in horum ossium cavitatem immittes; idq; , vt medulla vniuersa exeat, querentia ossa denigrat, deformioraq; reddit; quod bonus Vessalius non animaduertit; neque enim

Ossa à medulla retenta denigrant.

Vessalij inscitia.

10 omnia animaduertere magnus potuit anatomicus. idem efficit in ossibus postbrachialis, digitorumq; : idem in ossibus pedij, & iugulorum sternon versus, alio minori terebello hæc ossa terebrans in capite altero duntaxat; idq; vt ex albis ossibus sceletos cōstet; neq; hisce foraminibus perexiguus sceletus turpitudinem accessuram esse verendum est; præ sui enim exiguitate conspicua non sunt. quod si conspiciantur ossibus omnibus simul iunctis alba cera, aut glutine ex caleo confecto, quo fabri lignarij vtuntur; dicta foramina diligenter obturato. Postquam ossa hæc, vt dixi, iterum laueris: in prom-

Qui ossa candidiora fiant.

20 ptu habeas vas amplum æneum, quale pro familiæ lineis pannis è sordibus abstergendis domi habent matronæ. sit vero aqua feruenti plenum, in quam ossa (vt diximus) denudata, & distincta immerges. Hoc etenim pacto candidiora euadunt. Illud præterea diligens sceleti faber obseruare nullo negotio poterit; vt manus, pedesq; linteis prius inuolutos in aquam immergat; ne articuli extremi, aut sesamina ossa pereant, confundanturue. tandiu vero bulliant, donec ab ossibus caro sponte decidat. nolim tamen carnem ab ossibus tam facile abscedere, vt appendices relaxentur; nam magnum tibi negocium crearet, appendices ita dissolutas suis ossibus

Ossa elixanda vt carne denudent.

30 denuo apponere. quod facilius eueniet. si adolescentuli cadauer supra dicto modo coquas. Separantur enim in hisce facilius ab ossibus appendices. Post hanc ossium elixationem partem caluariæ superiorem primo eximes; ne futuræ relaxentur; itaq; curam adhibe ne squamosæ futuræ separentur; neue pars superior temporalium ossium deperdatur. cum ab aqua eximenda ducis; lineos pannos paratos habeas crassiori filo textos, eosq; rudes adhuc, neq; attritos vetustate, quibus ossa prædicta abstergas. deinde caput, costas exime, iugulaq; , postea brachia, & crura, item manus, pedes, inferioremq; maxillam, postremo dorsum cum ossibus ilium. quæ ossa singula tibi per manus tradita tela exiccabis. Illud præterea ne

P obliui-

Pinguedo seruāda  
nec ossibus relin-  
quenda.

Ossa ne fœteant.

Gluten.

Ossa ex calce, aut  
cinere denudata  
nigrescunt.

obliuiscaris, quæso, vt dum ossa coquis, subinde spumam, & pinguedinem incitantem tollas: quæ tamen non sunt abijciendæ, sed in vase condendæ. vbi vero coagulatam videris pinguedinem, quæ spumæ subest; exime ab aqua, & serua. est enim pluribus in rebus hæc pinguedo perutilis. Exempta ossa ab olla ænea magna summa diligentia mundanda sunt, cultro fabrefacto paruulo, cuius sit acies acerrima. Cauendumq; est (vt supra etiam attingimus) ne in cartilagine articulis incrustatas offendas; nam si has attigeris, hoc est, incideris: mox articuli fatiscunt, & dissoluuntur, hoc pacto, ne fœteant ossa. Fœterent autem, si aliquid carnum ossibus adhærens relinqueretur. in quibus denudandis accuratus admodum sis oportet. In separatione capitis à vertebra, quod non ita facile existimato, ob valida ligamenta; propterea sensim, atque oculate progreditor; ne transversum ligamentum in prima vertebra positum lædas; quod ligamentum dentem secundæ vertebræ continet. vertebrae ea, qua diximus, diligentia nudatas ordine ponito; funeq; excipito, & in tabella vento, soli; exposita tandiu detineto; donec exiccantur; id vero biduo fiet, plus minus, sed caue ne imbribus aspergantur. Brachiale cum exossas, id est ossa eius separare, & cartilaginibus exuere in animo habes; prius considera, quàm difficilis sit tot ossium tam diuersa specie repositio. Quare si diffidis, satius est, minusq; absurdum, si relicto ligamento, quo brachialis ossa continentur; illa in superficie detegas; vt ex pluribus ossibus constare liquido constet; sed pedetentim hoc agito, ne hic ossium nexus, cuius colligationem reformidas, si nimis penetras, corruat. Eadem, vel paulo minor diligentia in tarso adhibenda est; dum hæc ossa sole, ventoq; exiccantur: quoniam temporis iactura maximi ab optimo quoque facienda est. poteris interim gladiolo, qui nouaculam secando imitetur: aures, nares, palpebrasq; excoriare, hyoidis os, laryngem, sternon, atque alias cartilagine à membranis liberare, & ligamentis: idq; præsertim, vt sceleti fœter inhibeatur. Caueto etiam, ne dentes omnes decidant; immo vero da operam, ne vel vnus quidem decidat. quod si exciderint; da operam vt in suum quisque alueolum redeat, in promptuq; habeas gluten ex recenti caseo, ex oui albumine, gypsoq; recenti cōfectum; itaq; struito, ne amplius labant. idem efficere poteris, si appendix aliqua è suis ossibus diuulsa concidisset. Non desunt, qui in ossibus cadaueris excoquendis pro sceleti fabrica calcem, cineremq; adhibeāt, vt candidiora fiant; quod mihi non valde probatur: Vidi enim ossa nigrescere potius, quàm albesceri huiusmodi rebus. Neque illud asper-

10

20

30



asfernandum est, ossa dum coquuntur: nisi aqua continenter submersa detineantur; fumo infici solere. Dum hæc aguntur, ferrum corporis mole altius palmi dimidio (vt nunc Romæ loquuntur) fieri curabis, quodq; deorsum tres in partes diuisum sit, & eas perforatas: ascendatq; crassiusculum ad ossis sacri inferiora. quod reliquum est ferri, tenuius esse debet, quo flecti possit, vt tibi ex vsu erit. huius ferri basis erit tabella tetragona, in cuius centro alia sit eminentior figura orbiculari, colore atra; ita enim elegantior esse videbitur sceleti situs, qui hisce tabulis clauis affixus detinebitur.

Instrumētū i ossib.  
preparādis com-  
modum.

10 cuius sceleti ossa vt elegātius connectas; tria ænei fili genera ad sint, quæ per tenuius, & crassius inter se differant. quod æneum filum coquendum est; vt flexibilis reddatur; neque in connectendis ossibus tam facile disrumpatur. forcipes quoque binæ parandæ sunt, quarum vna sit teres, vt filum illud æneum foraminibus immisum torqueas; alia vero incidat quod reliquum est. Acus item varia ex optimo ferro parandæ sunt ligneo manubrio exceptæ, quæ & perforare, & secare possint: hisce ossa, vt lubebit, perforato. Præterea animaduertendum est, si digitos rectos esse volueris; perforandos esse recta, vt à latere ad latus foramen penetret.

Quibus ossa con-  
nectenda.

20 quòd si obliquus illorum situs tibi magis arrideat; oblique perforato, ita vt infra magis distet ab ossis capite, quàm supra. Item qua forma voles, digitorum situm immutabis. A pedibus igitur initio sumpto quatuor seramina apponito, illis crura superpone; deinde femora. animaduertendum tamen est, inter tibiâ, femurq; posterius perforandum esse inter duo capita inferiora femoris; nec non eminentiore parte capitis tibiæ, vbi aderat ligamentum. Item ibi baculum appones; vt hoc fulcro præter æneum filum solidior sit connexus. Deinde os sacrum, coccygem, & lata ossa connectito, cartilagineq; apponito in genu circa acetabulum coxendicis inter  
30 ossa pubis, inter os sacrum, & coccygem. Antea vero quàm femur suo loces loco: imponendum ferrum est in os sacrum, suaq; ossa coniuncta. quod si facilius efficere volueris, ossis sacri tertium, quartumue posterius perforato: sit vero foramen adeo patens, vt ferro excipiendo sat esse possit, quod postmodum foramen illud ingreditur, per quod spinalis medulla descendebat. Sistendum est autem, fulciendumq; ne infra crurium altitudinem flectatur: nam crura flecterentur, quod turpe esset visu. Postquam stat ferrum, vt decet; crura, & pedes fige vario situ, ne suo loco labantur, atq; exeant. fies autem voti compos; si sub calce, & pollicem perforaueris; & paruo clauo, æneoque filo has partes ligneæ, quam supra

diximus, tabellæ affixeris. his optime dispositis patellam genu apponito. Deinde quinque lumborum vertebrae cum suis cartilaginibus sacro osi appone: supra has tres extremas thoracis vertebrae, quibus suas costas necesse, hoc est earum corpori: quanquam decima ad transuersum processum accedit. deinde reliquas nouem transuersis vertebrarum processibus prius perforatis, ut costæ facilius aptentur, illisq; elegantius admoueantur; quas prius anteriore in parte perforato, ubi cum cartilaginibus uniuntur. Posterius autem non perforato antea, quam metiaris, quæ singulæ perforandæ sint. sed prius vertebrae harum costarum in ferrum indito, ut dictis vertebrae superpositæ sint: & ex his à prima initio sumpto aneum, quod diximus filum bis, ter ue circa eas, transuersosq; processus vertito. Caue tamen ne hunc nexum arctes priusquam sternon suo loco imposueris. Illud equidem nolim obliuiscaris, sceleti elegantiam, & venustatem in thoracis concinna figura, sitam esse; quam sphericam esse oportet. Id ut fiat facilius, inter sternon, ac vertebrarum corpus lignum impone, quo retrocedere, atque introrsum inclinare prohibeatur. Præterea animaduertendum est, nonnunquam cartilagine nimis exiccatas esse: propterea minus cedere, quam sit opus artificis sceletocomponenti. quod si fiat, illas in tepidam aquam paulisper finito; tunc enim cedent. deinde collum, caputq; impone. sint vero ossa capitis, quod transuersum sectum fuerat; ut quæ in ipso cõtinebantur, auferri possent; vinculis excepta, ne corruant, in vertice, in futura recta, & labdalem versus. inincipite autem foramen adfit, è quo exire ferrum possit. thorace, ut oportet, exiccat, adde iugula, scapulas, brachia, manusq;: ita erit Dei ope sceletos absolutus; sed stude, ut iugulis, scapulæ, maxillæq; inferiori suæ cartilagine apponantur: item styloidi inter ipsum, & brachiale. Pulchrior etiam videbitur sceletos si ex brachijs alter extēdatur; flectatur alter: quod si mauis; scipionem manu gerat; ut lubet efficit, quem tabulæ clauis affigito. sceleti collo hæc suspendito, ut per thoracem pendeant, torquis instar, larynga, os hyoides, aures, nares, ungues, quas optime perpolies, palpebras, ossa sesamina dicta, ossa, quæ sunt in naribus spongiosa, quæ dum internam nasi partem emundas, facile decident. Tu vero caue, ne illa imprudens tanquam nullius pretij proijcias; ut Vessalio contigisse opinor, qui illa propterea nõ cognouit. Illud præterea memoria teneas, dum caluariam curas, qua aures sunt sitæ; id tanta industria, & diligentia efficit, ut ne ossicula auditus organo deferuentia lædas: quæ pulcherrima visu sunt, & scitu digna. Ex his duo prima nullo ne-

Venustatem sceleti in quo cōsistat.

10

20

30

gocio



gocio eximes, tertium vero non sine negotio: propterea caluaria  
 sapius manu cōcutienda est, vt eximi facilius possint. hæc vnā cum  
 alijs, quæ paulo ante memorauimus, sceleti collo suspēdes, ne quid  
 desit eorum, quæ scire operæpretium est. quòd si puelli sceleton  
 parare cupias; caue diutius ossa coquas: nam ossium appendices  
 facillime relaxantur. Idem de simijs iuuenibus admonitum puta.  
 si sceleton non modo non fœtere cupis, sed bene olere; priusquam  
 caluariā sericis ligulis vincias: cura, vt illa vincula muscum, & am-  
 bram optime redoleant, aut re huiusmodi bene olente, vt magis li-  
 buerit. filo æneo crassiori humerum scapulæ admoueabis, cubitum  
 humero, radio extremam manum, femur acetabulo, tibiam femo-  
 ri, tibiæ extremum pedem. Costas autem, vertebraşq; mediocri  
 æneo filo, vt digitos, & postbrachiale tenuiori. Deo vero Opti-  
 mo Maximo sit honor, & gloria.

# REALDI COLVMBI CREMONENSIS

DE RE ANATOMICA

LIBER V.

DE MUSCULIS.

Quid sit Musculus, ac de Musculorum differētijs. Cap. I.



**M**USCULVS Instrumentum est voluntarij mo-  
 tus, absq; quo nihil in nobis est, quod volun-  
 tarie moueri possit. constructus autem est ex  
 fibrosa carne, nervis, ligamentis, venis, arte-  
 rijsq; & membrana: carne quidem, vt qua  
 corpus ipsius constet, & moles; neruo, vt is  
 virtutem motiuam deferret, quæ à cerebro

Musculi descript.

Quæ musculū cō-  
 stituant & quem  
 vsunt ei quodq;  
 horum præstet.

emanat; ligamento, vt sit validus, neque in mouendo imbecillus;  
 vena, vt ali possit; arteria, ne vitali calore destitueretur. membra-  
 næ vero munus hoc est, vt omnia hæc complectens detineat: mu-  
 sculumq; à musculo distinguat. Musculum sunt qui à Mure dictum  
 putent, quòd musculi quidam muris figuram præ se ferant; nam il-  
 lis caput tenue existit, venter latus, cauda oblonga, angusta; non  
 desunt

Musculus vnde di-  
 catur secundum  
 aliquorum opi-  
 nionem.

defunt, qui musculum lacertum vocent; quoniam lacerto ipsi simili figura videatur. Alij pisci similem magis musculum autumant; propterea pisciculum vocāt. Sed profecto has formas in omnibus musculis non comperies: nam aliqui lati admodum sunt, alij trilateri, alij quadrilateri, alij orbiculares, sunt aliqui crassi, alij vero tenues, atque exiles, breues alij, alij prolixi, alijs vnum duntaxat fibrarum genus contigit, alijs duo, tria alijs, & nonnulli musculi omnibus fibrarum generibus mixtis præditi sunt, quibus videntur intertexti. Musculi in tendines, hoc est chordas desinunt; sed non omnes; multos namq; tendine carentes videbis: contra quibusdam musculis tendo adest in exortu, quibusdam in medio, quamuis Galenus de quarto duntaxat maxillam inferiorem aperiente mentionem faciat; vbi illius tendinis occasione capta miris laudibus naturam ipsam effert. sed meminisse poterat bonus Galenus quarti quoque musculi, à quo hyoides deorsum trahitur, qui tendinem in media sui parte à natura benigne suscipit; neque illi, quem tantopere Galenus extollit, ob hoc quicquam inuidet. Sed priusquam à musculorum tendinibus discedamus; nonnulli sunt, quibus vnicus inest tendo, aliquibus duo, tres ue, aut quatuor, quibusdam complures, vt longissimus dorsi musculus, nec non thoracis quintus; quidam longum, teretemq; tendinem obtinent, alij teretem quidem, sed breuem; alijs tendo adest tum oblongus, tum latus, alijs latus, & decurtatus. Ita vt facile perspicias figuram musculorum, tendinumq; ipsorum non vnicam esse, sed multiplicem & variam, quemadmodum in vniuscuiusq; musculi peculiari historia facilius quoq; & apertius discas. Ortum ducunt ab ossibus musculi, atque in ossa desinunt, sed non omnes; nam aliquos cernere est non ab ossibus, sed à cartilaginibus exorientes. Alij à membranis exoriuntur, & in membranas quoq; finem habent. alij post exortum descendunt; ascendunt alij. quorundam situs transuersus est, quorundam vero obliquus. At exortus musculorum neque in omnibus eodem se habent pacto; nam aliquorum oblongus, aliquorum autem breuis, his crassus, illis pertenuis, nonnullis carneus, alijs tendineus, licet nō desint, quibus ex carne tendini mixta videatur origo. Ex musculorum tendinibus nonnulli perforati sunt, alij minime, alij vnico foramine, alij pluribus donantur. Sed locus admonet, vt antequam ab hoc sermone discedo, doceā quid tendinem, seu tendonem dicunt; chordam ue, vt Arabes Anatomici. Tendo igitur in musculo pars alba est, dura, densaq; & pellucida, quæ cum primum detecta est, visu pulcherrima est, ac spectatores in sui admirationem trahit.

A neruo

Varie musculorū  
formæ.

Musculos in tendines  
desinere,  
sed non omnes.

Musculorū ortus,  
& terminatio.

Quid sit tendo.



A neruo autem distat tendo, etsi magno quoq; sensu præditum esse tendinem experientia facile pateat: cum ipso læso sæua accidentia consequantur. Si tendinem seces corpus solidum attrētabis, neruo vero cæso contra se res habet; nam licet albicet neruus, tamen neq; adeo durus est, quemadmodum tendo, & rotundior est, neq; adeo perlucet; quod si incidatur, corpus multis funiculis intertextum, villoq; circumdatum videre videberis. Adnotandum insuper est musculos organa esse motus voluntarij, qui neruorum ope illis demandatur. Hæc etenim vis neruis à cerebro demandatur, etsi

Differentia inter tendinē, & neruū

Musculos esse instrumenta motus voluntarij.

Musculos à neruis suscipere motum

- 10 Aristoteli secus videatur esse. Iccirco musculo cuiq; quamuis minimo neruus obtigit; immo & nerui quandoq; cum ad musculum neruum ferri dico, non ita intelligo prope musculos neruos ferri; aut per illorum medium recta præterire; sed per musculorum substantiam aio neruos disseminari; quanuis Vessalius parum in hoc Anatomicus sensui, rationiq; aduersetur, inquires musculos complures carere neruo, & inter reliquos quadratum musculum prope brachiale, qui radium in pronum ducit. Ego vero huic quoq; musculo inesse neruum asseuero adeo perspicuum, vt quiuis alter; neq; difficilis est inuentu. idem de eo musculo dictum puta, qui latum
- 20 tendinem efficit, deq; alijs, quos Vessalius excipit; quod dum efficit, naturam irridere maluit, quàm suam in hoc non obscuram negligentiam patefacere.

Neruos in musculorum substantia disseminari.

Vessalij error de neruorum in musculos distributio. ne. lib. 2. de corpore humani fabrica cap. 113. de musculis dicitur sentiri iuxta sensum



## De faciei musculis.

## Cap. II.

- FACIEM cum dicimus, eam corporis partem intelligimus, quæ capillos, mentumq; interiacet, moueturq; voluntario motu maxilla inferiore immota. neq; enim superiorem maxillam moueri nisi crocodillinam, teste Aristotele inuenies; licet ego pſitaci vtrunque maxillam motu præditam esse primus obseruauerim. quin facies ipsa hominis mouetur quidem ad inferioris maxillæ motum, sed non
- 30 primario, verum secundo motu.

Quæ pars facies appellatur.

Primus animaduertit superiorem pſitaci maxillam moueri.

## De Musculis frontis.

## Cap. III.

MVSCVLI igitur (vt ad rem redeamus) qui huic deferuiunt parti complures sunt; primi duo sunt, atque hi in fronte siti. exortus horum in superiore parte existit; in inferiore vero parte terminantur in communi futura, quæ dirimit ossa capitis ab ossibus maxillæ superioris; quamuis nerui huic parti subijciantur. Horum musculorum fibræ recte neutiquam sunt, quemadmodum Vessalius

Musculi frontis.

Vessalij error.

Vessalij commen-  
datio, eiusdem  
infcitiā.

Duos esse frontis  
musclos & non  
tantum vnum.

afferit; sed obliquæ à summo scilicet naso tempora versus: eorumq; motus est, vt supercilia attollantur: quanuis neque Galenus ille de re medica tantopere meritis, neque Vessalius nostris temporibus magni vir nominis in dissectione corporum, neque alius ex his qui ante me scripsere agnouerint. Quod si maiorem diligentiam adhibuissent, inuenire facile poterant. Hi duo muscoli & vniuersam frontem, & temporalium musclicorum tantam partem occupant, quantum ipsi obliq; ascendunt, præterquam media fronte, vbi nos cutim contrahimus, corrugamusq; quoties vehemēter commouemur, aut admiramur; adeo vt in multis sese supercilia mutuo contingant. Quæ cutis frontis contractio; si vnus hic esset duntaxat musculus; fieri nullo modo posset. hæc res, vt viros alios omittam minus notos: in fronte amplissimi Cardinalis Ardingelij, quem honoris causa nomino: perspicue videri poterat. cui cum sinister musculus ex his cōuulsus esset ob vulnus: dimidiam frontem mouebat: reliqua motus expers relicta erat. sed mitto hoc, sensum ipsum si tu quoque consules, hoc haud dubie nullo negocio comperies; nam si vniuersam frontis cutem detraxeris; in media fronte nullum videbis musclicum, nisi in summo naso: vbi dexter musculus cum sinistro ita coniungitur, vt vnus hoc loco musculus esse videatur; & vbi carnosiores, quàm vsquam inueniuntur. et quo magis ascendunt hi muscoli, eo tenuiores euadunt. superciliaq; sursum trahuntur non ab his duntaxat, sed etiam duorum musclicorum præsidio, quos deinceps describemus hætenus (vt opinor) anatomicis ignotos.

### De duobus Musculis Nasi. Cap. IIII.

Nasi muscoli inuēti.

Vessalij error.

Nasi musclicorum  
exortus, progres-  
sus, forma, &  
terminatio.

**P**OST hos bini occurrunt nasum dilatantes adhuc à nemine cogniti: nam etsi Galenus, alijq; de duobus musculis nasum dilatantibus meminerint; eos tamen cum labij superioris musculis confudere. Præter hos Vessalius duos descripsit nasum claudentes, quos interiore in parte esse vult; imaginationeq; duntaxat intuitus est. quo enim pacto oculis cernas, quod nusquam est? latas itaque nares reddentes muscoli illi duo, à supra dicta oriuntur sutura, estq; exortus eorum acutus, carnosusq; cum musclicorum frontis sine permixtus: deorsumq; tendentes latiores redduntur, & supra nasi ossa deferuntur: inq; eius pinnis terminum habet; triangulusq; pene efficitur, cuius duo sint latera oblonga, breue tertium, has pinnas sursum trahunt, fibrasq; rectas habent; itaq; dilatant: illi vero; quos alij anatomici describere, portio sunt eorum musclicorum, qui in



qui in superiore labro positi sunt; vt mox dicam. Clauditur nasus à musculis dicto labio opem ferentibus, non autem à proprijs. Nam quoties aliquid nobis per nares attrahendum est; superius labium constringere cogimur.

Quibus musculis  
nasus claudatur.

De Musculis latis in collo positis. Cap. V.

**D**uo præterea alij sequuntur pene quadrati musculi in collo sita, quos Gal. lib. de Vsu Part. deq; Anatom. Sect. se inuenisse exultat: qui labijs ancillantur, ea deorsum oblique trahentes. horum substantia membrana carnosæ est. à iugulorum regione, posterioreq; colli parte initium sumunt; eorumq; fibræ oblique ascendunt, atque eo tandem pertingunt, vbi cum superiore labro inferius iungitur. Quare cum hi lati musculi faciei deseruiant: etsi in collo collocentur: tamen inter faciei musculos connumerandi sunt, qui cum mento plurimum cohærent: atque in hoc oris apertioni videntur auxilium ferre.

Musculi lati in  
collo duo.

De quatuor musculis labiorum. Cap. VI.

**Q**ui labris famulantur musculi, quatuor numero sunt duo in superiore, totidem in inferiore. Superioribus quadruplex origo est: nam ab extrema futura ossis iugalis exoriuntur, & ab ea, quæ primum os maxillæ superioris separat à tertio: reliqui duo ab osse male proficiscuntur: omnesq; oblique versus labrum incedunt, quos inter vnus est, qui narium pinnæ adhærescit. et propterea hunc musculum illum esse dicebant, qui nasum dilataret. Ego vero prædictorum labri musculorum portionem voco. Tamen ne pertinax esse videar, quod semper abhorruï, si cui separare hunc libeat, & peculiaris musculi loco esse ducere: id sibi per me liceat. quo concesso quatuor erunt nasi musculi, qui omnes ipsum dilatabunt. Reliqui duo labrum inferius constituentes ab ea menti parte oriuntur, vbi quædam est in osse asperitas conspicua. horum autem quatuor musculorum fibræ variæ sunt, atque inter se commiscuntur, & implicantur. iccirco varios motus edunt: vt recte Gal. adnotauit, & plerunque cum cute ipsa confunduntur. Tamen si tibi musculosum corpus neque pingue secundum obtigerit, atq; diligenter excories, & eleganter, & perspicue satis conspici poterunt: Accedunt dictis musculis alij duo buccarum, quos quidam oblitus est describere in magno quodam volumine, de humani corporis dissectione. inter vtranq; maxillam sita sunt, à gingiuisq; nascuntur, & in gingivas

Quatuor labiorum  
musculi.

Musculus ab ali-  
quibus imperite  
nasi appellatus.  
Quatuor nasi mu-  
sculi.

Ex varietate fibra-  
rum variatur mo-  
tus.

Musculi buccarum  
duo.

Q

Musculorum buccarum exortus, & finis confundunt.

Musculorum buccarum multiplex vius.

giuas definunt. Quare vnde lubuerit initium sumas licet, vel supra, vel infra, nihil enim interest. Satis tenues, & circuli in modum sunt, fibris varijs intersecti, varijsq; ob id muneribus funguntur. Sunt enim manui instar, quæ cibum nunc huc, nunc illuc propellant: neque sunt inter loquendum inutiles, cum exsufflare, vel inflare buccas volumus, hisq; musculis tibiae, tubæq; canenti nō mediocris est vtilitas.

### De Musculis supercilium trahentibus. Cap. VII.

10

Musculi supercilii trahentes à nullo adhuc cogniti.

**B**INI adhuc in lucem reuocandi sunt muscoli ab alijs negligentia præteriti, quos in capitis posteriore parte licet animaduertere; qui à labdoide futura supra māmillares processus oriuntur. triangulares sunt, & in carnosam membranam definunt, quæ frontis etiam musculos excipit, eorumq; vtilitas non contemnenda hæc est, vt frontem, cutemq; capitis posteriora versus abducant, vt ego millies non sine voluptate contemplatus sum in capite præcellentis viri præceptoris mei Ioannis Antonij Plati, quem Lonigum nunc vocant. is enim cutem capitis vniuersam valide mouet. Sed quid ego in alijs exempla persequar, cum domestica, vel interna potius exempla non desint? Ego quoque is sum, in quo cutim capitis manifeste moueri nullo negotio cernere posses, quippe qui caluus admodum sum, absque vlla cutis ariditate, sed mollitie adeo laxa, vt nuper nati infantis cutem præferat.

### De Palpebrarum Musculis. Cap. VIII.

Musculi palpebrarum qui numero sunt sex.

Anatomicorum error in palpebrarum musculis.

**N**ON dubito, quin nostra de Musculis palpebrarum historia grata omnibus futura sit; cum illa, quæ hæctenus ab alijs tractata sunt, parum sint cum re ipsa consentanea. Ego vero dedi operam, quantum in me fuit; vt quàm verissime describerentur. Musculi igitur palpebrarum sex numero sunt, tres nempe vtrinque, quorum duo extra orbitam oculorum, reliqui intro iuxta musculos oculorum sunt siti, & propterea omnes, qui ante me scripsere, anatomici decepti sunt arbitantes hos non palpebræ, sed oculis inferuire. Primi igitur orbiculares, fibras habentes circulares quoque nascuntur in magno cantho, in futura communi capiti, & maxillæ superiori, acuto principio; & sursum versus frontem dilatantur, quo loco cum musculis frontis commiscetur. Postea versus aurem tendentes, quo magis prope minimum canthum accedunt, eo magis amplifi-



amplificatur, & deorsum circa orbitam reflectuntur, vt tandem acuto fine iuxta initium terminentur. facti sunt, vt palpebras claudant, & valide astringant; vtq; oculos ab externis iniurijs tueantur. hos Vessalius diuifit in quatuor; sed vbi ipse carnem detraxit, carnosiores sunt, quàm in reliquo deductu. Secundi erunt duo musculi recti, lati, carnosii in superiore regione oculorum, in interna orbita exorti ex neruo visorio, vt reliqui oculorum musculi. hi musculi latiusculo fine in supremam palpebram terminantur. facti sunt, vt trahant palpebram sursum, & oculum aperiant. Tertij musculi sunt 10 tereti figura, & tenues, ex eodem loco nati. qui oblique versus magnum canthum in palpebra tereti fere tendine finiuntur. in nonnullis quandoque portio huius tendinis in corneam inferitur. in his adiuuare videtur motum oculi sursum. attamen geniti sunt ob hunc vsum præcipue, vt palpebram trahant, & oculos aperiât, qui vsum, & situs cum in brutis quoque idem sit; non possum non mirari, quo pacto Galenus, Vessalius, cæteri; Anatomici hos quatuor musculos palpebræ deferuientes inter musculos oculorum numerarint, decepti forte, quòd in orbita eorum siti sunt.

Musculi oculos claudentes.

Vessalii error.

Musculi oculos aperièntes.

Musculi palpebrā trahentes.

Gal. Vess. cæterorumq; Anatomicorum casus.

20

## De Oculorum Musculis.

## Cap. IX.

30 **E**go hic diligentem lectorem postulo: nam de parte nostri corporis nobilissima agendum est: cuius cognitio & necessaria nobis est, & periucunda. Oculi igitur arbitrario motu cientur nunc sursum, nunc deorsum, nunc dextrorsum, nunc sinistrorsum, nunc in orbem. Gal. Vessaliusq; & Anatomici alij, qui omnes beluinum oculum describere: oculorum musculos quatuordecim describere, vt septem in vnoquoque oculo collocarent. Ego vero decem musculos in oculis pono, quinq; scilicet in vtroque: quatuor enim illi eodem in loco positi musculi, qui aperiendæ palpebræ conducunt, nequaquam sunt inter oculi musculos adnumerandi. Quatuor habes deinde oblongos musculos, qui versus radicem visorij nerui emergunt; rectasq; habet fibras: & in neruofas tenuitates desinunt: & membranæ corneæ in orbem adnectuntur aliam membranam constituentes, quæ ad iridem non pertingit. Positi sunt instar quatuor angulorum, quorum duo supra sunt, alij infra. hi vel sursum, vel deorsum, vel à dextris, vel à sinistris trahunt, cum scilicet quilibet ex his seorsum operatur, vel duo simul, at si omnes vna subsequenti motu operetur: motus efficitur circularis, quod nouum dictum vobis nullo pacto videri debet; cum idem fiat à quatuor mus-

Oculorū Musculi.

Oculorum motus arbitrarij.

Qui proprie oculorum musculi cōnumerandi.

Quo pacto oculorum musculi se habeât ad motus.

Qui circularis motus fiat.

Quintus musculus  
oculi nūc primū  
inuentus.

Quinti musculi  
motus coniectu-  
ralis cognitio.

Gal. & Vess. belui-  
ni, non humani  
oculi anatomem  
assequutos esse.

sculis brachiali seruientibus. Præterea facti etiam sunt, vt sistant oculum, quādo scilicet vno, & eodem tempore operantur. Quintus oculi musculus, quem ego primus inueni, atq; è rei natura describam, ita habet. situs est sub alijs quatuor oculi musculis, & inter hunc, atque illos pinguedo intercedit; situ transuerso locatur, & oculi medietatem complectitur. oritur à cornea membrana, atque in eandem definit; adeo vt qui finis eius sit, quæue exortus, non ita facile inuenias. Hunc ego musculum admirabilem iudico; nam ab oculo incipit, atq; in eundem definit. propterea difficile dictū est, quis sit huius quinti musculi proprius motus. si à nervis musculorū initia proficiscerentur; dicere auderem eius originem vere in medio esse: ibi enim ramus à secundo neruorum cerebri coniugio ingreditur insignis, crassusq; satis, si cum musculo conferatur: quem neruum fateor me quandoque suspicatum fuisse huius musculi tendinem esse. Hunc neruum si attrahas, oculus sursum vertitur, & circumagitur; quanuis musculus sub sit. forte hic fuit vsus huius musculi admirabilis, vt eius auxilio cælum, diuinæq; maiestatis fabricam intueremur, ad quod nati sumus: ad quod peragendum nō paruum est hic neruus adiumento. hic idem musculus, quem describimus, à latere (sed siue latus, siue finem, siue initium dicas: nihil nunc refert) tendine latiusculo prædatus est, quo adhærescit corneæ. Equidem magnum aliquem naturæ arcanorum perscrutatorem mihi nunc dari exoptarem, à quo huiusce pulcherrimi musculi vtilitatem edoceret: mihi nunc sat erit musculum inuenisse, & descripsisse. de humanis nunc loquor. Vessalius enim & Gal. oculi musculos beluinos, non humanos descripsisse, scire poterit, quicumque eorum historias cum re ipsa conferre non grauabitur. Inter hos, & alios quatuor pinguedinem licet cernere, quemadmodum inter hunc, & visorium neruum: sed illum musculum in hominis oculo nullo modo reperias, quem Gal. Vessalius, atque alij describere; qui ab his nunc primo, nunc septimo loco cōnumeratur; & in tres, pluresq; musculos diuidi potest; quem tamen, vt ipsi eleganter describere, in boue, equo, veruece, & alijs quadrupedibus facile inuenias. hic musculus in brutis inuentus iuxta ipsos oculum sistit; quo munere in homine illi quatuor primi tunc funguntur; cū omnes eodem tempore agere desistunt, quietiq; permanent.

De Musculis Aurium.

Cap. X.

Aurium Musculi.

Ego musculos aures mouentes non describo, nam raro, imo quàm rarissime inueniuntur: in quodam tamen ego musculum offendi,



offendi, qui à buccis nascitur, & in auris pinnam definit, eamq; mo-  
uet voluntarie versus anteriora. quandoq; etiam alium vidi muscu-  
lum in posteriore parte à mamillari processu proficiscentem; sed hi  
duo ultimi, in brutis semper conspiciuntur, in homine perraro.

Aurii musculi in  
homine raro dari

## De Musculis Maxillæ inferioris. Cap. XI.

**I**NFERIOR maxilla hominis ob faciei rotunditatem breuissima  
facta est; cui tres voluntarij motus contigere. aperitur enim clau-  
ditur, & in circulum agitur. Musculi ipsius quatuor vtrinq; sunt.  
10 Prior ex his temporalis musculus nuncupatur, validus, robustus,  
nobilisq; admodum, propterea quòd cerebro proximus est: & va-  
rios habet nervos insertos: atq; iccirco diuinus Hippocrates in lib.  
de Vulneribus Cap. dextro tempore, inquit, vulnerato sinistrum  
conuellitur. quare natura non iniuria tanta vsa est in hoc musculo  
diligentia. Oritur igitur à primo maxillæ superioris osse à cuneali,  
à fronte, à sincipite, & ab osse temporũ lapidoide dicto: partemq;  
capitis lateralem occupat vsq; ad posteriorem auris partem, & su-  
perioiorem etiam, per tres digiti apices. Initium eius latum est, &  
20 semicirculare; & licet initium, vt dixi, latum sit; tamen in acutum  
definit, in validumq; tendinem, qui in acutum illum maxillæ infe-  
rioris processum immittitur, quem coronon appellant; qui tendo  
altiuscule fatis, & intrinsecus incipit. Alius etiam est membrano-  
sus tendo, qui musculum parte exteriori liuidum reddit; deferturq;  
sub osse iugali. huius officium vnum duntaxat est, claudere scilicet  
maxillam inferiorem; neque triplex est, vt somniauit quidam, qui  
Galenum (pace illius dixerim) hisce in locis parum intellexit. Fi-  
bræ eius eiusmodi sunt à circũferentia ad centrum progredientes,  
quæ chirurgis accurate sunt animaduertendæ, dum vulnera dilatât,  
30 & abscessus hanc partem infestantes secant; ne fibras transuerfim  
incidât; nam si ita fieret, vsus ipsarum cessaret: quo amoto vita de-  
ficeret. & quoniam claudendi motus, resq; duras effringēdi robo-  
re eget: natura sagax præter temporalem, alium effinxit musculum  
in ore latitantem, (ita enim Gal. appellat, & recte) qui validus est  
fatis, & ab ea cavitae exoritur, quæ posita est in alis cunealis ossis,  
& terminum habet in interiore maxillæ inferioris parte; vbi asperi-  
tas est. eius fibræ rectæ sunt, tendinemq; satis validum habet, qui  
eodem officio fungitur, quo temporalis, & crassus, breuisq; existit.  
Tertius musculus is est, quem masseterem, siue mansorium nomi-  
nant, qui maxillam inferiorem in circulum agit. nascitur à iugali, &  
à primo

Maxillæ inferioris  
musculi.

Tres motus volũ-  
tarij inferioris  
maxillæ.

Temporalis mu-  
sculus.

Coronon proces-  
sus.

Cautio in tempo-  
rum chirurgia.

Musculus in ore la-  
titans.

Musculus massete-  
rus & mansorius  
dictus.

Galenii error.

Musculus quartus  
os aperiens.

à primo maxillæ superioris osse, non autem à quarta, & tertia vertebra colli, quemadmodum voluit. originem habet tendinosam, carnosamq; : terminum vero in inferiore maxilla pene triangularē. adhæret insuper acuto ipsius processui, ubi cum temporali coniunctus videtur esse. Quamobrem excusari non potest magnus Gal. qui in nonnullis locis scriptum reliquit temporalem musculum tendinem habere in medio sui vtrinq; partem carneam. fibras habet diuersas, atque ob id maxillam mouet ante, retro, in latera, & in orbem, crassusq; est satis. Quartus musculus os, & maxillam aperit, & est admodum elegans, cum duos carnosos vĕtres fortitus sit, initium minimum, & finem; nam media eius pars tendinosa est. ortum ducit carnosum à styloide processu; defertur sub maxilla, & sub aure; rotundæ, oblongæq; simul figuræ particeps existit, neq; est admodum crassus; carnea substantia in medium mentum definit, ubi asperitas quædam interior cernitur. hunc natura adeo crassum non constituit, vt illos, quibus claudendi partes delegauit. Maxilla enim cum suapte natura pene grauis sit, duobus illis musculis, quos superius vtrinq; sitos dixi, relaxatis deorsum inclinatur; propterea exiguo musculo cōtenta fuit. at mediam partem tendinis instar effinxit; vt ne maius spatium occuparet. locus enim angustus admodum erat, in quo multa erant organa collocanda. 10

De Musculis ossis Hyoidis, cuius ossis, & eius musculorum descriptio in nonnullis, qui scripserunt, desideratur. Cap. XII.

Musculi ossis hyoidis.

Primus hyoidis musculus.

Secundus Musculus hyoidis.

Tertius hyoidis musculus.

Quartus hyoidis musculus.

**O**s hyoides ab octo musculis mouetur, à quatuor scilicet vtrinq; qui primus occurrit, carnosus est, tenuis rectus: qui ab interna summitate ossis, quod sternon dicitur, exoritur. Iter eius est super asperam arteriam, & laryngem, & in inferiore parte dicti ossis absq; tendine terminatur; fibras rectas habet, & deorsum recta trahit. Secundus in ordine à mento exit, atque in hyoidis partem superiorem finit. expers est tendinis, sed carnosus totus fibris rectis recta sursum ducit; motumq; oppositum facit illi, quem proxime memorauimus. Tertius musculus subtilis est, & paruus, qui à styloide processu oritur, & in laterales partes hyoidis definit. situ est obliquo, partes huic demandatæ sunt sursum attrahendi. Quartus vero musculus à parte superiori scapulæ ortum ducit, & oblique subseptimo capitis musculo sursum ascendit; subtilis quidem est, & longus; tamen neque prolixior est, neque gracilior musculis alijs, vt

Leonardo



Leonardo Fuchſio viſum eſt. Terminatur in partibus hyoidis lateraliſibus. tendo illi in medio obtigit, quemadmodum quarto inferioris maxillæ muſculo: licet Gal.in xi. de Uſu Part. afferat illum tendinem in medio habuiſſe, præterea neminem; atque hanc ob rem naturam adeo admirabatur, & extollebat, quæ in eo muſculo rarum quiddam effecerit, quod alijs denegarit. Hoc equidem non negauerim, huius, quem nunc deſcribimus, muſculi tẽdinem adeo longum non eſſe. Uſus eius eſt, vt hyoidem deorſum oblique trahat motu oppoſito illi, quem tertius edebat muſculus. Gal.lib.de muſculis, hunc voluit ſcapulam attollere: cum parum animaduertiſſet fieri non poſſe, vt tam tenuis muſculus ab hyoide exortus, vt ipſe voluit, quod os mobile eſt, ingens illud ſcapulæ pondus attraheret, atque attolleret.

Galen error.

## De Linguae Muſculis.

## Cap. XIII.

**L**INGVA organum eſt, quod multas nobis præbet utilitates: nam & edendo, & bibendo, & loquendo nobis præſto eſt lingua, guſtandiſq; ſaporibus oportuna. huius ſitum neminem arbitror ignorare; eius figura oblonga eſt, lata magis, quàm profunda, in radice, quàm in fine craſſior, quod à natura longe proſpiciente iccirco factum eſt; quoniam velociter vndiq; mouenda erat. quocirca nouem muſculis prædita fuit, præter ſubſtantiam ipſius peculiarem, quæ cum mollis ſit, rara ſpongiæ inſtar, conſuſaq; carne, inter muſculos adnumeranda non videtur; etſi alia ratione, quod voluntate iubente moueatur, non videatur à muſculorum numero ſeiungenda. Quod ſi fiat, duo muſculi nouem prædictis addendi ſunt: nam videntur eſſe duo muſculi, cum lingua candidam lineam in medio habeat, quæ dextram partem à ſiniſtra diſtinguit, ſub qua ligamẽtum eſt, quod infantibus sæpe incidendum eſt; eo quod locutioni impedimento ſit. Igitur duo prædicti muſculi à baſi oſis hyoidis emergunt: atque in ſummam linguam deſcunt. Omne fibrarum genus habent adeo intertextum, vt aliud ab alio ſeiungi nequeat: veluti in alijs muſculis ſeiungitur. ambit linguã tunica quædam, in quam quartum par neruorum cerebri inferitur, quos natura guſtui præcipue deſtinauit; eorumq; pars ad palati tunicam tendit, vt ſuo loco dicemus; quæ tunica tum huic, tum œſophago, tum laryngi communis eſt. Tertium vero, & quartum linguæ muſculum cæteri anatomici non cognouere; tu vero, ſi diligenter ſecueris: horum exortum medio in mento conſpicaberis; vbi duæ adſunt aſperitates, quæ recta ad linguæ radicem proſciſcuntur. fibræ ipſorum

Muſculi linguæ.

Linguæ uſus.

Muſculi linguæ nouem, vel vt aliqui volunt vndecim.

Ligamentum linguæ in infantibus incidendum.

Duo muſculi linguæ attributi.

Tunica linguam ambiens. Vnde lingua habet at guſtus ſenſum.

Tertius &amp; quartus linguæ muſculi alijs ignoti.

forum recta sunt, ipsi musculi teretes: ad hos musculos spectat linguam extra dentes, & labia exerere. neque enim naturæ miraculo nullius ope musculi lingua exeritur, ut nonnulli credere. Quintus autem, & sextus cum à styloide oriantur processu, gracilesq; sint: in linguæ radicem & ipsi definunt; sed in ipsius lateribus. horum usum si quæris, hic est, ut cum uterq; operatur linguam versus seipsos ducant; cum vero alter tantum mouet, sursum in latus trahat.

**Quintus, & sextus linguæ musculi.** Septimus, & octauus egrediuntur è processibus ossis hyoidis, & in linguæ lateribus inseruntur eam deorsum trahentes. At nonus, decimusq; nascuntur à maxilla, & in latera definiunt. munus horum est, nunc huc, nunc illuc impellere, cum mandimus, aut deglutimus.

**Septimus & octauus linguæ musculi.** Postremum musculum carnis, pinguedinis, glandulæq; confusam miscelam rectius diceremus, quam vere musculū. positus est in radice linguæ: esui suauis admodū est, ductusq; ipsius est ab hyoide osse. Nihil fecius, posteaquam cæteri, qui ante nos de hac materia scripsere, inter musculos describere; nos quoque musculum appellemus; ne confusione locus relinquatur: quod esset, si eandem partem, quam alij musculum vocant, nos musculum esse inficiaremur.

**Nonus, ac decimus linguæ musculi.** Equidem, ingenue fateor, cum hæc particula in humano corpore perexigua sit, & nullius fere pretij; huius ne meminissē quidem, cum ad alia magis necessaria nostra festinet oratio: ut huic perutili historię finem aliquando imponamus. Itaq; præter musculos undecim, quos supra memorauimus, & præter nervos, & ligamenta, & membranam, adhuc restant venæ, arteriæ, duoq; alij nerui, quos septima coniunctio gignit, qui huic parti motus gratia addicti sunt; cumq; eorum situs in inferiore parte collocetur, summopere cauendum ne vnā cum ligamento, quoties excindendum est, hi quoque ab imperitis incidantur.

**Vndecimus ac postremus linguæ musculus.** **Linguam confidentia.** **In ligamento linguæ abscindendo quid cauendum.**

## De Musculis laryngis. Cap. XIII.

Laryngis musculi.  
Larynx quid sit.  
Vox ubi primo efformetur.

Gal. & Vesal. beluinum, non humanū laryngem scripsisse.

**LARYNX.** caput est asperæ arteriæ; estq; instrumentum, in quo primo vox effingitur; quod rerum omnium opifex Deus admirabili arte composuit. hæc in faucibus sub lingua, & hyoide osse collocatur; cuius ossa, & cartilagines cum superius suo loco descriperimus; reliquū est, ut nunc de eiusdem musculis agamus. nosq; humani laryngis musculos, non beluini describemus; ut Galenus, & post illum Vesalius descripserunt: ne erres. De quo Vesaliō ego profecto non possum non satis mirari: Quo pacto, cum is Gal. nunquam non laceſſat, reprehendatq; quod simias, & brutā, non homines



homines secuerit: ipse tamē in hoc ridiculus reprehensor beluæ laryngem, non hominis depinxit, neque admonuerit. Quod ipse forte effecit, propterea quod larynx bestiarum, cum multo maior sit, quàm humanus commodior sectio fieri potuit: quod nō modo in larynge, sed in oculis etiā egit bonus Vessalius, vt magis admirere. sed ad rem redeamus. Profecto humanus larynx exiguus fatis est, & ob hoc secatu difficilis. Quamobrem ne mireris, si cū cæteri de beluino larynge, ego vero de humano loquar, ab alijs nō parum dissenfero. neq; enim vt optimos alioqui viros oppugnem; sed vt errores veritate duce, quoad eius fieri poterit, tollam, ab eorum opinione in hoc præsertim argumento cogor abscedere. Laryngis itaq; musculos alij viginti statuunt, octo scilicet communes, proprios duodecim. Ego vero quatuordecim esse affirmo, quorū quinque communes sunt, proprij reliqui. Priores duo communes (ita dicti, quod aliunde cum oriuntur, huc tamen definunt) à summo pectore enascitur, vnde duo primi hyoidis musculi ortū ducunt; carnosī vbiq; sunt tēdinis expertes, principio acuto præditi; incessus ipsorum est super arteriam asperam; inferunturq; in inferiorem partem duorum ossium scuti imaginem referentium deorsum trahendo; apprime vtiles sunt, quod dum agunt, infra quidem astringunt, supra vero laryngem dilatant. Secundi à lateribus hyoidis proficiscuntur, ipsi quoque carnosī; terminus ipsorum prope priores accedit, fibræ his rectæ similiter contigere: ab his inferior pars dilatatur, constringitur superior; contrario prioribus motu laryngem sursum attollunt. Ex his, quos communes dixi, vltimus musculus œsophagum complectitur, opemq; cibi, & potus deglutioni præstat. Oritur ab ossium scutiformium lateribus, & transversas fibras semicirculum imitantes est nactus, quibus partem lateralem laryngis coarctat. Hic musculus me iudice, vnus est duntaxat, non duo, vt Galenus, & cum Galeno Vessalius existimauere: qui cum hoc diligenter cōsiderauerint, arbitrati sunt hos exoriri à parte posteriore œsophagi, qui membranosis, mollisq; est; voluntq; vt laryngem, rem duram, ac grauem attrahat. Quare nihil est in hoc, quod eos excusē, cum absurdum maximum consequatur, si eos musculos illinc proficisci dixerimus. Quod si vel fibras ipsas diligenter intueberis, perpetuas illas, non diuisas inuenies. Vessalius binos alios musculos communes describit, quos inquit enasci à parte hyoidis interna, atque in Epiglottidem inferi, quos in boue, bubulo, & eiusmodi animantibus haud dubie inuenire poteris; sed in homine nequaquam, quanuis perdiligens, & accuratus in secando

Vessalius ridicul' Gal. reprehēsor.

Quare ab alijs dis' sentiat de larynge.

Musculus laryngis nō viginti vt alij, volunt, sed quatuordecim vere esse. Primi duo laryngis musculi.

Musculi secundi laryngis.

Musculus œsophagum cōplectens.

Opiniō diuersa ab opinione Gal. & Vessalij.

Musculos binos laryngis à Vessalio descriptos in homine nō dari.

R fueris,

Musculi nouem la-  
ryngis, qui ipsius  
proprij dicuntur.

Glottis quid, &  
vbi sit.  
Ex nouem muscu-  
lis laryngis vnde  
duo primi exor-  
iantur.  
Os anulare.

Vessalij error de  
duobus primis la-  
ryngis musculis.

Musculi versus suo-  
rum exortu operan-  
tur.

Voces graues cu-  
jus merito emit-  
tantur.  
Tertij laryngis  
musculi.

Glottidis antero-  
ra astringentes,  
posteriora dila-  
tantes musculi.

Arythnoidis con-  
stitutio.

Musculus extremus  
laryngis omniu  
minimus.

fueris: & ita si octo communibus, quos appellant, tres detraxeris; quinque erunt reliqui. Proprij nouem sunt, ita dicti quod à larynge proficiscuntur, & in eandem desinunt, & huic vni seruiunt. facti sunt hac vna de causa, vt glottidem aperiant, claudantq;. Est autem glottis rima oblonga in media larynge posita, de qua Galenus inquit, similem substantiam in animali non inueniri. Ex his nouem musculis duo primi ab eo osse prodeunt, quod ego anulare appello; reliqui à cartilagine innominata. exigui sunt, fibrasq; habent obli-  
quas, & in ossium scutiformium inferiore parte finem habet. Vfus  
iporum est, partem inferiorem recte constringere, superiorem di-  
latando. neque hoc motus contrarij loco censendum est; nam ossa  
dura sunt, quod si infra constringas, supra dilatari cōsequitur. idem  
in brutis faciunt scutiformes cartilagines. Ex his autem musculis  
alterum dextrum, sinistrum alterum comperias; licet Vessalius qua-  
tuor hoc loco proprios musculos describat, quorum primos à scu-  
tali cartilagine oriri arbitratur, & in innominatā desinere. Quam-  
obrem nequeo satis mirari, quoniā innominatā motu caret; iccirco  
hi duo musculi, si adesent, ex ipsius sententia illam omnino moue-  
rent. musculi nanq; versus suum exortum operantur. Hi quatuor  
musculi teste eodem intercostalibus similes sunt, inquit ipse. quod  
ita falsum est, vt neque in homine, sed ne in brutis quidem inueniri  
possit. Secundi vero illi musculi in posteriore parte oesophagum  
versus collocati prolixi sunt, & perspicuitatem nescio quā praeferunt;  
oriuntur carnosa deriuatione à posteriore, lateraliq; parte  
anularis ossis, rectaq; in quartum; & quintum os per tendinem fi-  
niunt, hoc est inferiore in parte, vbi cum tertio coarticulatur. In  
hunc usum creati sunt, vt rectā trahant; nam rectis fibris constant:  
& glottidem versus lateralem partem dilatant, quæ horum duorum  
musculorū auxilio crebro reseratur. Quare horum beneficio gra-  
ues voces emittuntur. Tertij fere ab anteriore parte ossis anularis  
emergunt, cumq; obliqui sunt, in quartum, quintumq; os terminū  
habent, prope eam partem, vbi duo secundi desinunt, non autem  
in scutalem, vt Vessalius ipse voluit. hi glottidis anteriora adstringe-  
re, posterioraq; dilatare possunt. At quarti ortum habent ab in-  
teriore parte scutalium ossium, quibus cum articulantur: & oblique  
incedunt, donec in dicta ossa ingrediantur, quæ arithnoidem cō-  
struunt, hoc est in lateralibus partibus. hi quoq; cum anteriora ar-  
ctent, posteriora amplificant. Extremus musculus laryngis adeo  
paruus est, vt minorem in vniuerso corpore inuenire nequeas. po-  
situs est transuersim in radice eorum duorum ossium, de quibus  
proxime



proxime meminimus; & fibræ illius transversæ sunt, haud dissimiles fibris ultimi musculi ex communibus, qui œsophagum complectitur. ab hoc autem posterior pars constringitur, unaq; anterior dilatatur. Voluit quidem Vessalius hunc muscolum musculos esse duos, qui ab arthnoide exeant, atque in eandem redeant. Ego vero unum duntaxat esse muscolum hunc constanter affirmo, & fibras illius esse continuas.

## De Musculis scapulas mouentibus. Cap. XV.

- 10 **E**TSI de Musculis, qui caput mouent, prius loquendum videtur: tamen cum eorum magna pars sub scapulæ musculis cõtineatur; de his mihi antea, deq; humeri musculis loquendum videtur, quàm de musculis capitis verba faciam. Galenus lib. de Musculis, scapulas asserit à septem musculis vtrinque moueri. At ego in homine quatuor duntaxat vtrinque reperio. Quatuor sunt scapularum motus, sursum caput versus, deorsum, ante, retroq;.
- 20 Prioris musculi figura perelegans est; nam is cum suo pari simul cõsideratus monachorum cucullæ percommode comparari potest, aut panno, quem viduæ nostræ Cremonæ super humeros gestant. ideo cucullaris musculus nõ absurde dici poterit. egrediturq; tum ab occipite, tum ab apice spinarum vertebrarũ omnium colli, atq; thoracis, ad octauum vsq; . habet vero in occipitio lineam transversam, spatiumq; occupat, quod occiput, auremq; interiacet. Eius exortus exilis est, & procul admodum ab occipitio vsq; ad octauam thoracis vertebram: terminum in Acromio ponit iuxta totum maioris scapulæ processum, & clauiculæ partem; & cum varijs sit constructus fibris, motus etiam edit varios. superioris partis ope fibris obliquis scapulã sursum oblique trahit: medijs autem versus dorsum adducit: inferioribus autem fibris deorsum trahit, cuius vero figura huiusmodi est. Galenus hunc cucullarem muscolum in duos diuisit, superioremq; partem trapetiam vocat, qui licet in homine vnus sit, in simijs tamẽ duo sunt. Nam à maiore processu acromio dicto vsque ad occipitium vnus est; ab hoc ad octauam vertebram musculus alius est. Cucullaris hic musculus in homine à Vessalio pro secundo describitur, qui scapulæ deseruit. Secundus musculus scapulæ dicatus primo humeri musculo subiacet enascens à secunda, tertia, quarta, & quinta, raro autem à sexta costa: vbi in cartilagine degenerat, & sursum oblique ascendens in angustum cogitur, & in ancyroidem minorem scilicet scapulæ processum, tum carnosus, tum tendinosus terminatur. In hũc vsum à natura genitus fuit,

Musculi scapulas mouentes.

Musculos scapulas mouētes quatuor non septem, vt Gal. voluit, esse.

Musculus cucullaris, primus scapulæ est musculus.

Musculi cucullaris varij motus.

Cucullarem muscolum in homine vnum esse, non duos vt in simijs, quicquid Gal. dixerit. Musculus secundus scapulæ.

Secundi scapulæ

musculi vñs cõ-  
tra Galenum.

Tertius scapulæ  
musculus.

Tertij musculi be-  
neficio scapula  
attollitur.

Quartus scapulæ  
musculus.

vt scapulam ad anteriora versus sternon adducat. Galenus autem exstimauit hunc muscolum humero famulari, cum tamen nullo pacto famuletur. Musculus hic, quem nos secundum dicimus, à Vesalio primo loco describitur. Tertius prodit à transuerso processu secundæ, tertiæ, quartæ, quintæq; ceruicis vertebræ; & cum carnosus descendat, crassescit, validus fit, & in superiorem, atq; interiorem scapulæ partem inferitur. Fibræ illi rectæ sunt fere omnes; sunt enim aliquæ etiam obliquæ. Vtitur hoc natura ad scapulam attollendam, prioriq; auxilium ferendum: nam scapulæ os satis graue existit. Quartus latus est musculus, tenuis, quadrangularis; pro-  
greditur à spina quintæ, sextæ, septimæq; vertebræ colli, & à tribus primis, superioribusue thoracis; carnosus incipit, & partim tendinosus, fibris obliquis; terminus ipsius est iuxta vniuersam scapulæ longitudinem, quam dorso adducit, hoc est retro trahit. 10

### De Musculis humerum mouentibus. Cap. XVI.

Musculi humeri  
mouentes.  
Humeri plures  
motus.  
Humeri musculos  
septem non vn-  
decim esse vt Ga-  
leno placuit.  
Primus scapulæ  
musculus.

**H**UMERVS voluntario omni motu genere mouetur: sursum scilicet, deorsum, ante, retro, & circulari motu; eius musculi septem sunt, nõ vñdecim, vt Gal. placet lib. de Musc. Primus magnus est, carnosusq; qui anteriorem thoracis partem occupat; à media clauicula versus sternon progreditur, & longitudinem totius fere ossis pectoris sequitur: & à cartilaginibus septimæ, & octauæ costæ, cui māmilla innititur. Principium huius amplum est, & magnum; semper tamē imminuitur: fit acutus, tandemq; in tendinem breuem quidem, sed latum definit, qui in interiorem humeri partem sub ipsius ceruice inferitur. habet musculus hic fibras varias, humerumq; multifariā ad pectus adducit: supra scilicet, in medio, & infra. habet insuper hic musculus quinq; latera. Illud obiter adnotato, in inferiore huius musculi parte nonnunquam in quibusdā hominibus reperiri portionē quandam in acutum tendentem: ita vt musculus alius esse videatur; cum tamen non sit. Gal. lib. de Musc. ex vñico hoc musculo ternos, si Dis placet, effecit; huicq; absurdo aliud absurdius addit. Nam in animum induxit suum brachium oblique huius ope moueri; quod in simia quidem inuenire potest, at in homine nullo prorsus pacto. Secundus humeri musculus triangularis est, crassus, fibris varijs intertextus, ab Anatomicis epomis dictus, & deltois, & humeralis: è media clauicula, ab acromio, totoq; maiori scapulæ processu enascitur. initium ipsius latum est, tendinosumq; definit tamen in acutum. supra humeri caput fertur: & me- 20 30

Galeni inconue-  
niens.

Secundus humeri  
muscul' epomis  
deltois & hume-  
ralis.



- & medio in humero in validum, transuersumq; tendinem definit. qui tendo mediam humeri crassitiem amplectitur; multiplicibus fibris constat, quibus brachium attollit, & supra, & ante, & in medio, retroq;. Tertium vero musculū humeri carnosum, teretemq; conspicies, qui ab inferiore parte scapulę egreditur carnea origine; fibris à principio ad finem vsq; rectis, situq; obliquo est, super gibbam, anterioremq; scapulę partem progreditur, & in tendinem validum latum exit, qui in posteriore humeri parte implantatur. partes huius musculi sunt, vt brachium deorsum versus posteriora trahat. At quartus musculus ingens est, & latissimus: oritur ab apice spinę sextę vertebrę thoracis, descenditq; iuxta apicem omnium vertebrarum inferiorum vsque ad osis sacri dimidium. hoc adeo prolixum principium neruosum est vndique, sed gracile: deinde sursum ascēdit, in angustum redigitur, & in validum tendinem breuem, latumq; definit; sub humeri caput prope eum locum, cui musculum primum pectus brachio adducentem adhærere diximus, inter quos Axillę cavitates relinquitur. Varias hic musculus habet fibras, propterea brachium vario modo deorsum trahit, idq; tamen obliquius potius, quàm alio positionis genere. Tribus angulis inæqualibus præditus est: nam ex his vnus brevis est, duo vero prælongi. origo ipsorum ita se habet. brevis est à sexta vertebra, vsq; ad ipsius finem, ex longis, alter ab hac vertebra vsque ad osis sacri dimidium, alter ab hoc loco ad ipsius terminum pertingit. Quintus musculus eam omnem cavitatem occupat, quę inter summam scapulam, & maiorem ipsius processum posita est; & à posteriore parte ipsius enascitur: carnosus est, in validumq; tendinem definens: cum sub eo ligamento deferatur, quod humerum cum scapula annectitur. in caput humeri superioris finit, multumq; scapulę ipsi adhæret. Sextus musculus ambit vniuersam scapulę partem gibbam; emanat autē è parte posteriore iuxta ipsius longitudinem; carneus est, scapulę admodum inhærēs, definitq; in tendinem crassum quidem, sed latum; in caput humeri inseritur versus posteriora. Septimo interna cavitates scapulę vniuersa dicatur, vbi costis inhæret; nascitur à tota posteriore scapulę parte. Situs ipsius est inter costas, scapulamq; & finis vero tendo est satis latus, & in interiorem humerum inseritur. Vfus horum trium musculorum, quos vltimo loco memorauimus: est brachij circumactio.

Tertius humeri musculus.

Quartus humeri musculus.

Quintus humeri musculus.

Sextus humeri musculus.

Septimus humeri musculus.

Brachium à quinto, sexto, &amp; septimo humeri musculis circū agi.

## De Musculis Capitis. Cap. XVII.

Musculi capitis.  
Caput primo, &  
secundario motu  
mouetur.  
Capitis motus  
proprius.

Gal. casus.

Musculi proprio-  
rum motu cap-  
itis septē vtrin-  
que sunt.  
Primi caput mo-  
uentes musculi.

Secundi musculi  
caput mouentes.

Tertij musculi ca-  
put mouentes.

Quarti musculi ca-  
put mouentes.

Quinti caput mo-  
uentes musculi.

CAPUT primo, tum secundario mouetur. primario cum dicimus, intelligimus de motu cum prima, secundaq; vertebra; secundario autem cum toto collo. Motus ipsius proprii tres mihi videntur esse, vnus ante, retroq; alter ad latera, tertius cum id circumagunt: licet ad duos reduci haud incommode possint, ad rectū scilicet, & obliquum. rectus super prima fit vertebra, sub secunda obliquus, quicquid Gal. in hoc asserat, qui longa errauit via, adeo vt neque mathematicen, neque anatomem in hoc calluisse videri possit. Musculi vero propriis motibus deseruietes septem vtrinque sunt. primi oriuntur à spinis quinque superiorum vertebrarum thoracis, sursumq; à colli vertebris ad tertiam vsque ascendentes; postmodum seiunguntur, & oblique versus occipitium incedunt; vbi desinunt inter posteriorem partem, & aures. fibræ vero iam inde ab origine sua, donec diuidantur, rectæ sunt; deinde sursum spectantes obliquæ sunt. prædicti musculi sunt satis carnosī. Vfus illorum est, vt caput ad posteriorem partem tunc attrahant, cū ambo vnà operatur, at cū alter duntaxat agit, caput in latus circulariter vertunt. his musculis tria sunt latera, vnum ab initio vsq; quo à coniuge diuiditur, aliud inde ad occiput, tertium ab occipitio ad exortū vsq;.

Secundi musculi varij admodum, qui multas figuras, & impresiones varias habent, partibusq; multis tendinosīs, carnosīsque etiam compluribus constant; ita vt plures quàm quinque musculi videantur esse. Tamen par vnum duntaxat est, dextrum inquam, & sinistrum. initio acuto à transuerso processu quartæ, quintæq; thoracis vertebræ exoriuntur; cumq; sursum ascendant, tandem medio in occipitio figuntur. rectus est ipsorum situs, munus vero caput ad posteriorem partem recta attrahendi. Tertij musculi sunt graciles, qui oriuntur à spina secundæ vertebræ cervicis, demumq; desinunt in occiput; sed aliquantulum disuncti incedunt. fibris rectis constant, caputq; posterius recta ducunt. At quarti sub tertijs occultantur, carnosiq; omnes sunt, quemadmodum tertij, sed breues, à posterioreq; parte primæ vertebræ oriuntur, vbi illi vertebræ in spinam definendum fuerat, qua cauit, ne tertios musculos læderet. medio in occipitio finis ipsorum est, & ipsi quoque recta caput retrahunt; neque cuiquam mirum videri debet naturam tot musculos collocasse, qui caput retraherent: nam ita necessarium fuit, propterea quod anterior pars grauis admodum erat, quippe cui facies, maxillæq; inferior coniuncta est. Quinto pari musculorum capitis obliquus



obliquus contigit situs, atque hi à secundæ vertebræ spina exoriuntur, & in primæ transversum processum terminantur; caput in orbem vnâ cum prima vertebra trahunt, carnosiq; omnes sunt, licet graciles. Sexti item obliqui, sed contrarij sunt, triangulumq; efficiunt; è medio occipitio desinunt, emerguntq; ex primæ vertebræ processu, & versus anteriora trahunt. Itaq; hi duo ante dicti, quintus inquam, & sextus proprij musculi sunt, qui caput in orbem ciēt à primis tamen, atq; ab extremis, quos mox describemus, adiuti. Septimo loco musculi occurrunt longi, teretes, validi, quiq; vel  
 10 nondum excoriato cadauere apparent, imo vel in viuētib; conspicuntur: quos maiores nostri in numismatibus tanta diligentia obseruauere; obliquo sunt situ; eorum autem fibræ à summo pectore, atque à clauicula oriuntur. duo habent principia, inter quæ cavitatis adest; neruei sunt, in exortu lati; carnosi fiunt, & in processum mamillarem implantantur, quem & amplexantur. cum vterq; operatur, caput antèius inclinant: verum quoties vnus ex his mouetur, caput in latus agitur. Validi admodum sunt, atque hi satis idonei fuere, vt caput in prouum flecterent. Illud est insuper obseruandum, hos musculos vna cum quarto hyoidis musculo magnâ  
 20 crucem in collo efficere.

Sexti caput mouētes musculi.

Quinti, & sexti musculi proprie caput in orbem mouentes.

Septimi caput mouentes musculi.

### De Musculis Ceruicis. Cap. XVIII.

**L**OQVVTI iam sumus de musculis, qui primo caput mouent; nunc de ijs loquemur, à quibus secundario mouetur: qui quidē ceruici deseruiunt, qua mota, caput etiam ipsum non moueri non potest: cum ceruix capiti articulata, atque annexa sit. Ceruix igitur tum ante, tum retro, tū ad latera mouetur; & eius musculi sunt octo, quatuor scilicet vtrinq;. Primi in anteriore parte positi sunt  
 30 recti: à corpore quintæ thoracis vertebræ prodeunt, prope locum illum, in quo cum costâ connectitur, ascendensq; vniuersis vertebrarum corporibus annectitur. Sed mediam partem, qua œsophago iter præbatur. detectam relinquunt. suntq; hi musculi, quos sub œsophago latitantes appellant: tendine acuto in anteriorem primæ vertebræ processum finiunt, vbi illi in corpus (vt vocant) desinendum erat. Eorum vsum si petas, ego dicam tibi; flectunt ceruicem versus anteriora. Verum illud est obseruandum musculos, quos proxime memoraui, occipitio etiam quandoque, sed raro annecti, vbi foramen est, per quod spinalis medulla descendit. Secundi à prima costâ carnosi, ampli; nascuntur; ascendentes ita arctantur, vt trian-

Musculi ceruicis.

Secundarij capitis motus.

Ceruicis musculi octo.

Primi ceruicis musculi.

Musculi sub œsophago latitantes

Secundi ceruicis musculi.

In inspiratione in  
feriores thoracis  
partes dilatant,  
superiores vero  
comprimuntur; in  
expiratione cō-  
tra se habet.

Primi thoracis mu-  
sculi.

Secundus thoracis  
musculus.

Tertius thoracis  
musculus & eius  
usus.

Secundi thoracis  
musculi usus.

Quartus thoracis  
musculus.

Quintus thoracis  
musculus.

Sextus thoracis  
musculus.

Musculi intereo-  
stales sunt vtrin-  
que trigintaqua-  
tuor.

tamen thoraci quoque famulantur. sunt ergo omnes octoginta no-  
uem. Animaduertendum est autem hoc, quod est pulcherrimum;

Quum inspiramus, inferiores thoracis partes dilatari, superioresq;  
comprimi. Contra cū expiramus, constringi inferiora, superiora  
dilatari. Primi, qui occurrunt, bini sunt, vtrinque vnus, ab inferio-  
re clauicula prodeuntes, initio, sineq; item oblongo sunt & in  
partem primæ costæ superiorem inferuntur, quam dilatant. Se-  
cundus musculus magnus est, latus, carnosus totus, qui à basi  
scapulæ emergit, incessus eius est inter ipsam, & costas; inseriturq;  
in primam, secundam, tertiam, quartam, quintam, sextam, septi-  
mam, & octauam costam, & quandoq; in nonam. proxime vero eā  
partem, qua in cartilaginem desinunt fines ipsius sunt digitorum in-  
star. factus est octo costas dilatandi gratia. Sed tertius exilis est, &  
paruus; à spinis trium vertebrarum colli, quæ extremæ sunt, & à  
prima thoracis enascitur: principium latum, membranosumq; est,  
terminant hunc primæ thoracis costæ, & interdum in quartæ poste-  
riorem partem definit; hoc vsu à natura constructus fuit, vt hæc  
costas dilataret.

Quartus musculus & ipse exilis, & quadrangu-  
laris, prodit à spinis extremarum vertebrarum duarum extremarum  
thoracis, & nonnunquam à prima lumborum. principiū eius latum  
est, nervosum, membranosumq;: deinde carnosum efficitur, & in  
tres infimas costas terminum habet; finis vero est in digitorum mo-  
rem: & eas costas dilatat. Quintus carneus prodit à parte poste-  
riore, superioreq; ossis sacri, & ab interno osse ilij. adeo pertinaci-  
ter secundo dorsi musculo adhæret, vt illius portio non iniuria esse  
videatur. Nihilosécius, quum primum ad costas peruentum est:  
plane patet hunc à musculo dorsi diuersum esse. Quo magis ascen-  
dit, eo tenuior euadit; demum nervosarum ansularum adminiculo  
inseritur omnibus costis posteriore in parte, non procul admodum  
à transuersis processibus vertebrarum, vbi costæ asperitatem emi-  
nentem habent. constringunt partes posteriora thoracis. Sextus  
positus est interna in cauitate thoracis secundum sternon, & car-  
tilagines septem verarum costarum; oblongus est, carnosus totus,  
sed exilis. hunc in vsum natus est, vt anteriora thoracis coarctet.

Sequuntur deinde intercostales musculi ita dicti, propterea quòd  
costarum occupant interualla: qui vtrinque sunt triginta quatuor;  
nam vndecim sunt interualla, verarum costarum sex, quinque autem  
notharum; in his duo sunt in quolibet interuallo, in illis quatuor.  
hanc differentiam efficit, quòd cartilagines versus pectus vertantur.  
in his enim fibrarum deductus voluitur. hi sunt exteriores, interio-  
resq;

10

20

30



resq; fibris obliquis, sed contrarijs, adeo vt exteriores cum interioribus x literam efficiant. exteriorum ortus est ab inferiore parte costarum; ac definunt in superiora subsequendum, versus dorsum cum incipiant; in os pectoris demum inferuntur. Interiores vero initium sumunt à parte superiori costarum: & in inferiorem supra positæ terminantur. Fibræ exteriorum à dorso oblique versus pectus ita procedunt; vt à supernis ad inferna ita descendere videantur. Interiorum vero fibræ contrario se habent modo, adeo vt in crucis morem coniungantur; subtiles quidem sunt, sed longi, non  
 10 altiore loco siti: quod enim interest spatij inter costas, perbreue est. Illud ne te effugiat, moneo candide lector, anatomicos omnes in horum musculorum vsu deceptos fuisse. Vessalius inter reliquos, qui Gal. reprehendit, reprehensione non vacat; nam ipse certo asseuerat interiores non secus, ac exteriores genitos esse, vt costas constringant solum; neque sensit motum illum dilatare, quem ipse opinatus est adstringere; costam enim à costa seiungit, atq; hunc in modum agit exterior musculus. motum hunc dilatationis tunc edunt, cum soli operantur: hoc est vel interiores, vel exteriores seiunctim; cum vero omnes vnà mouent, coarctant valide. Exteriores enim  
 20 sursum trahunt, interiores deorsum, atque ita trahunt costas simul, valideq; constringunt. nam vis constringendi in thorace valida esse debebat, eo quod foras expiramus, & vociferamur. & hunc motum ego sæpius in viui canis sectionibus obseruaui, sectionibus, inquã, quæ domi fiunt, non quæ palam: ibi enim omnia, vt in priuatis sectionibus, exquisitè considerari nequeunt ob auditorum, spectatorumq; frequentiam. sæpe enim tercentis, & amplius auditoribus in Academia Patauina, & Pisana, & Romæ denique, vbi iam decem annos profiteor, me circumdatum vidi. Causa quamobrem Vessalius in hoc allucinatus fuerit, hæc fuit; quod existimauerit in hoc  
 30 motu primam costam immotam permanere. Verum aliter se res habet. erigitur enim à primo musculo thoracis, qui à iugulo emergit; quæ cū attollitur, costas ordine trahit: quibus sui intercostales musculi opem ferunt: atq; ita sursum versus extenduntur, exterioribus auxiliantibus; cōtra vero deorsum inferiorum adminiculo. quoniam vltima costa deorsum trahitur à musculo abdominis oblique ascendente: atq; hoc, quo diximus ordine, dilatantur. Quum vero simul  
 vtriq; operantur, tunc vniuersa thoracis  
 constrictio sequitur, vt iam  
 explicauimus,

Musculi intercostales exteriores.

Musculi intercostales interiores.

Anatomicorum omnium in intercostaliū musculorum vsu error.

Vessalii erroris causa in intercostaliū musculorum vsu.

Primam costam moueri.

Quomodo costæ moueantur.

De septo transuerso.

Cap. XXI.

Diaphragma.

Falsa opin. Arist.

Phrenca.

Partes septum trā  
suerum ingrediē  
tes.Septum thoracis  
esse musculū in-  
spirationi, expi-  
rationi seruens.

**D**IAPHRAGMA musculus est membra vitalia à vitalibus diuidēs: vt inquit Diuinus Plato, qui animam irascibilem à concupiscibili diuidebat. Aristoteles diuisionem hanc à natura genitam existimauit, ne qui vapores à cibo attolluntur, cor læderēt; in quo duas prædictas virtutes, atque alias etiam plerasque collocauit. Quod falsum esse, suo loco dicemus. sed, quamuis hoc non adesset septū, aio hos vapores cor non offensuros fore; nam per œsophagum progrediuntur. Quod si hoc fuisset, quemadmodum ipse in animum induxit suum; quo pacto se volatiliū corda haberent, cum septo careant? hic musculus à reliquis omnibus differt situ, figura, nobilitate. Situs enim est in vltimo thorace: & corpori nostro transuersus manet. Figura ipsius orbicularis est: in medio nerueum tendinem habet; partibus tamen carnosus circumdatur, fibris à centro ad circumferentiam tendentibus, re contemplatu pulcherrima. Nobilitas vero eiusmodi est, vt veteres medici phrenes illud, quasi mētem dixeris; appellauerint. hoc etenim læso, raro euadimus. Sed præter neruosum, quem diximus, tendinem, qui multi sensus est particeps, venæ adsunt, arteriæq; nō paruæ. amplius multis quoque neruis refertum est septum, qui quidem à spinali medulla emanantes inter costarum interualla ad diaphragma properant. Inter quos neruos, duo sunt, qui inter quartam, quintamq; ceruicis vertebam incedentes inferius supra pericardium inferuntur; vbi carnosā pars septi in tendinem degenerat: seu maioris vbi in carnosam naturam desinit tendo. & hanc sane ob causam Gal. de exortu ipsius varius admodum fuit, sibiq; dissidēs: nunc enim hunc inquit à costarum notharum cartilagine, nunc à spina exoriri. Septum hoc, de quo loquimur, thoracis est musculus, qui expirationi, inspirationiq; ministrat. cum enim suō munere fungitur; retrahit sese versus vertebra; ascēdensq; extrema thoracis ad se trahit, inferiorēq; partem vniuersam constringit; atq; hæc, cum expiramus. at cum inspiramus relaxatur: descēdensq; permittit inferiora thoracis dilatari. Atque hæc est septi transuersi vtilitas, quam in viuā sectione spectare licet. Hic musculus tum supra, tum infra, quasi veste tegitur, supra quidem à pleura, infra verò à peritonæo. à vertebribus exoritur. Alij principium ipsius partem neruosam esse existimant. Ego vero duas eius partes esse dicerem longiusculas illas, quas Vesalius ligamenta nuncupauit; quæ corpuscula prodeunt è latere corporis vertebræ duodecimæ thoracis, & à superioribus lumborum: atque



atque inde postea pars ipsius neruosa initium sumit, quæ cartilagini, quam gladialem vocant, coniungitur. gladialis vero cartilago, ut suo loco latius explicatum fuit. iccirco genita est, ut septi prædicti propugnaculum foret. non oris ventriculi, ut vulgus medicorum arbitratur; & huic etiâ parti cor innititur. fit carnosum vtrinque septum, & in cartilagine costarum, quas mendasas dicunt, demum implantatur vltimam costam amplectens. Sed hoc idem septum, licet nobile admodum sit, ut diximus: nihilominus necesse fuit, ut alijs nostri corporis partibus cederet, accommodareturq;. **I**ccirco duobus præditum est foraminibus, quorû in dextra vnû, alterum in sinistra situm est. Per dextrum vena caua ascendit, quæ in thoracem progreditur; per sinistrum œsophagus descendit, cuius terminus in ventriculum est. cum œsophago autem incedunt nerui bini, quos sextum par neruorum cerebri constituit. Atque hæc propria sunt septi transuerfi foramina. Vessalius præter hæc, tertium ponit proprium diaphragmatis foramen; per quod arteriæ a horti dictæ iter sternitur. At ego hoc foramen esse nego; nam ipsa arteria a horti transit corporibus vertebrarum adhærens. Itaq; septum dum vertebrae amplectitur, arteriâ quoq; amplectitur; non tamen propter ea perforatur. **20** Non negauerim equidem Hippocratem diuinum hominem, nec non Gal. post ipsum scriptum reliquisse per idem foramē, quo aditus œsophago patet, magnæ etiâ arteriæ iter præberi. sed profecto pace tantorû virorum sensus aliter esse aperte ostēdit.

Gladialis cartilago.

Duo septi transuerfi propria foramina.

Tertium foramen in septo contra Vessalii opinionem non dari.

Hippocr. & Gal. error.

### De Musculis Abdominis. Cap. XXII.

**A**BDOMEN ea pars est humani corporis, quam nos ventrem inferiorem dicimus; Græci epigastrium, Arabes mirach appellauerunt, in quo tum nutritionis, tum generationis membra continentur; in cuiusq; medio situs est vmbilicus. **30** Musculis octo præditum est abdomen, qui ipsius ministerio addicti sunt: licet thoraci opem quoq; ferant; nam illud dilatant: quod si comprimât, fecum vrinæ, & foetus expulsionem auxiliantur præsertim à septo transuerso adiuti. Quid? quod hi musculi detinendis omnibus ijs, quæ à natura in hac regione sita fuere, magno sunt vsui? Sed vt ad ipsorum descriptionem descendamus; sunt vtrinque quatuor. Primi duo musculi obliqui descendentes ob id nuncupantur; quod è superioribus originem ducentes in inferioribus desinunt partibus. fibras habent obliquas, & propterea obliquorum nomē illis inditum fuit, lati admodum sunt, positiq; in lateralibus partibus. Emergunt à sexta

Musculi abdominis. Abdomen. Epigastrium. Mirach.

Musculi abdominis octo nempe vtrinque quatuor.

Primi duo abdominis musculi descendentes dicti.

sexta, septima, octaua, nona; costa, antequàm in cartilaginem desinere incipiant, deinceps; à subsequentibus costis, & ab apice transuerforum processuum vertebrarum lumborum, & à dimidia ossis ilij appendice. latissimum habent principium, & carnosum, digitorum vt plurimum instar, qui inter eos fines secundi musculi thoracis ingrediuntur, qui octo costas dilatant. Postea vero quàm non parum progressi sunt; in latum tendinem, neruosum, membra nosum; degenerant; qui tendo reliquæ parti appendicis ossis ilij, de qua dicebamus, & pubis adhæret: non autem coxendici, vt male Leonardus Fuchsius opinabatur; in medio ventre finiunt, à mucronata scilicet cartilagine, recta vsq; ad os pubis; quo loco candidam lineam cernere est, vbi horum musculorum tendines vna cum obliquis ascendentibus, & transuersalibus coniunguntur. hæc autè pars ideo albicat, quòd illi caro non subiaceret. Igitur candida linea terminus est prædictorum musculorum; non in osse pubis, quemadmodum Vessalius voluit. Nam os pubis non mouetur; quocirca munere suo qui fungi potuissent obliqui descendentes abdominis musculi, si in os pubis inserti fuissent, & religati; qui præterquam quòd & intestina, & quæ diximus, alia premunt; inferiora thoracis etiam constringunt, & septo auxilium ferunt? scito; eam esse illorum tendinis vnionem, vt musculus vnus duntaxat esse videatur; cui duæ carnosæ partes contingere. Verum si quis terminum fibrarum diligenter animaduernerit; duos esse musculos planè cõperiet, qui in medio vniuntur; & alios sex vëtris inferioris musculos supereminet.

Secundi sunt obliqui ascendentes, quorum fibræ opposito modo se habent, ac primorum fibræ; nam illæ deorsum, hæ vero sursum oblique spectant; & quemadmodum intercostalium musculorum fibræ, cruciantur, vt dicunt, idest crucis, vel x literæ figuram imitantur. Oriuntur igitur hi carnosi ab appendice ossis ilij, & transuerforum processuum vertebrarum lumborum initio membranam imitante; sursum quidem carnosi neuntur inferioribus costis: deinde in latum, neruosum, membranosum; tendinem desinunt, qui vbi ascendit, rectis; musculis occurrit, in duos scinditur; quorum alter supra rectum musculum, alter sub ipso incedit. Qua in re nō poteris studiosè lector naturæ sagacitatem, atq; admirabilem sapientiam satis obstupefcere: nam recti musculi hoc complexu robustiores efficiuntur, & in medio trium constituuntur. Et nisi tendo iste scissus fuisset, recti musculi in medio collocari nullo modo poterat: sed vniuntur denuo hi tendines, vbi lineam candidam sitam esse diximus; atq; hic, eo modo, quo descendentes, finiunt, & quibusdā neruosis

Fuchsi falsa opinio.

Vessalii error.

Secundi abdominis musculi ascendentes vocati.

10

20

30



neruosis rectorum musculorum partibus adhærescunt. Vfus eorum est, vt intestina comprimant, & costas deorsum trahant; quo thorax dilatetur. Tertij musculi abdominis sunt recti; ita dicti, quod secundum corporis rectitudinem siti fuerint, rectisq; fibris cõsent. Incipiunt ab osse pubis, quanuis Galeno sexto Metho. in quinto de Vsu part. & in quinto de Aggrefs. Anat. aliter videatur. Arbitratur enim ipse illos à pectore, si Dis placet, emergere; cum in illud potius supra mucronatam cartilaginem desinant. Duo principia vt plurimum habent, neruosum alterum, alterum carneum, à superiore parte ossis pubis; quandoque tamen vnum solum habent carnosum initium. terminantur in sternon, vt dixi, & in cartilagine vltimarum costarum verarum, idq; lato fine; tendinis expertes sunt; tribus tamen tendinosis, neruosisq; interfectionibus non caruere, quibus musculi obliqui ascendentes adhærent. Tuq; adnotato Galenum, quas diuisiones supra memorauimus, nullo modo adnotasse; licet vel in fimijs ipsis reperiantur. At quorsum hæ interfectiones, inquis. horum musculorum roboris gratia effectæ fuere, néue admodum in profundum abdomen contraherentur, vt véter magis sphæricus relinqueretur. Sunt in exortu proximi, sed quò magis ascendunt, eo magis seiunguntur. Crassi sunt satis, validiq; hac vtilitate à natura facti, vt anteriora abdominis comprimant. Sed euidentior eorundem vsus est, thoracem deorsum trahendi, vt supra dilatari posset. Vltimi sunt transuersales; hoc nomen sortiti sunt, quoniã transuersim in corpore collocantur, à transuersis processibus vertebrarum lumborum neruosi prodeunt, deinde carnosi euadunt, & ossi ilei, costisq; inferioribus cohærent; fibras quoque transuersas habent. finis vero illorum tendo est latus, neruosus, membranosusq; in linea cãdida, & ossi pubis hærentes fiunt, quem admodum obliqui ascendentes, & descendentes, licet non ita adhæreant. hærent etiam peritonæo. partes eorum sunt abdomen comprimere, & hypochondria constringere. Animaduertendum insuper est, tendines musculorum obliquorum descendantium, ascendantium, & transuersalium perforatos esse. Primo vbi vmbilicus positus est: secundo prope os pubis; & per ea foramina descendunt vasa semen testibus præparantia, ascenduntq; deferentia, quæ in glandulas parastatas tandem inferuntur. atq; hæc foramina sunt per quæ herniæ fiunt. sunt etiam in mulieribus perforata, quanquam Vessalius hoc nunquam animaduernerit, quemadmodum dicemus vbi de matrice verba faciemus. Inuenies etiam alios ætatis meæ Anatomicos, qui & ipsi aliquid inuenisse videri volunt, decemq; muscul-

Ascendētium, & descendētium musculorum vsus.

Tertij abdominis musculi recti appellati.

Galeni error de rectis musculis.

Musculorū rectorum interfectiones à Gal. descriptæ.

Musculi transuersales.

Transuersalium musculorum vsus.

Tendines obliquorum, ascen. descen. & transuersalium perforatos esse.

Vasa semen præparantia. Vasa deferentia semen.

Error posteriorū anatomicorum.

Vulvam motu voluntario nō moueri.

Improbatur opinio de decem musculis abdominis

musculos in abdomine constituunt. Sed hi mehercle falluntur; nā carnosum rectorum musculorum principium musculus esse distinctum volunt; quod nullo pacto est; neq; enim musculi definitio illis accommodari potest. Quod si musculi essent, vt illis placet, aliquo munere sibi fungendum esset; vt quod Priapo ad illum erigendum præsto sint, quod agere nequeunt, eo quod illi nō adhæreant, sed osi pubis superius affixi sint. Quod si penis illis sursum trahendus esset, sursum quoque esset ab iisdem vulua trahenda. Nam in fœmella non secus, atq; in mare deprehenduntur; quæ vulua voluntarie non mouetur. sibi in animum induxerunt prædictos ab ipsis 10 vocatos musculos rectis opem ferre. quod verum esse neutiquam potest. Nam adeo validi sunt recti abdominis musculi, vt auxilio nō egeant. sin autem velint suos musculos vesicam comprimere: tantundem est. nam ab omnibus octo comprimitur, quod verum duntaxat ex his officijs fungendum esset sibi: quoniā nihil superest agendum præter hæc. absurdum aliud non minus sequitur, quod hæc carnosæ origines, quas distinctos musculos isti vocant: in omnibus nō inueniuntur: quos sequeretur his vtilitatibus carere, ob quas geniti sunt dicti musculi. Quare vanum hoc dictum est: & hæc de decem musculis abdominis sententia defendi nullo modo potest. 20

### De Musculis Testicularum. Cap. XXIII.

Musculi testicularum.  
Dartos membrana.

Cremasteræ musculi, ac suspensores dicti.

**B**INI sunt, tennes, oblongiq; musculi, qui testibus deferuiunt. 30  
Siti sunt in Darto membrana; eorumq; origo est supra os pubis, vbi foramen videre est, per quod seminaria vasa descendunt eadem membrana inuoluta. Profecto, si verum fateri licet ingenue, veri musculi formam vix præ se ferunt. Sunt enim fibræ quædam carnosæ, rectæq; in hac Darto positæ. hos musculos antiqui cremasteras, quasi suspensores dixeris, appellauerunt. Hanc enim ob causam effecti à natura videntur, vt testes suspenderent: ne temere dilaberentur. Alijs placet hos non modo testes detinere, ne prolabantur; verum etiam testes ab hisce attrahi, idq; voluntarie, dextrū à dextro, atque sinistrum à sinistro.

### De Musculis Penis. Cap. XXIIII.

Penis descriptio.

Quatuor penis musculi.  
Sphincter.

**P**ENIS præter eius substantiam, quæ rara est, porisq; referta spongiæ instar, & crassam, qua circumuoluitur, membranam, quatuor insuper musculos habet. quorum primi à sphinctere ortum ducunt,



ducunt, orbiculari scilicet musculo, qui extremo recto intestino adiacet; longiusculi sunt, subtus incedunt; & media ipsius parte plus minus in meatum urinarium implantantur; qui meatus semini quoque communis existit; hunc amplectuntur; subtiles sunt, in hunc usum producti, ut cum lotium nobis vel semen emittendum est, hunc meatum dilatent. reliqui duo musculi à coxendicis appendice oriuntur, sub ipsius penis exortu, qui ab inferiori parte ossis pubis initium sumit; sunt hi quidem breues, at prædictis crassiores, in ipsum quoque penis corpus desinunt, in meiendi munere ipsi quoque magnam opem ferentes, maiorem vero in coeundo afferunt; nam penem sustinent, erectumque detinent, donec opus absoluantur.

Primi duo penis musculi.

Primorum duorum penis musculorum usus.

Duo posteriores penis musculi.

Posteriorum duorum penis musculorum usus.

### De Musculis Vteri. Cap. XXV.

**A**NIMADVERTENDUM est in lateralibus vteri partibus, ubi adsunt seminaria vasa, duas etiam adesse membranas duarum alarum instar, quæ diuisionem ab hisce vasibus factam continent. Quibus in membranis non in omnibus quidem, sed in quibusdam duntaxat mulieribus certæ sunt carneæ fibræ, velut in virorum darto. has carneas fibras Vesalius ita describit, quasi musculi sint, qui vterum sursum sensim attollant. Ego vero, si quis paucas hasce fibras, quæ neque etiam in omnibus foeminis reperiuntur, voluerit pro vteri musculis accipere, non multum morarer. parui enim refert, has ne musculos vocet, an musculos esse deneges.

Musculi vteri.

Membranae in vteri lateribus alarum instar positæ.

### De Vesicæ Musculis. Cap. XXVI.

**I**N hominis Vesica, cum in collum euadit, natura duas glandulas parastatas dictas, collocavit, quæ quidem semine continenter refertæ sunt, nisi vel puer sit, vel senex, vel macie consumptus. In harum glandularum fine natura prudens musculum tenuem posuit orbicularem, circularibus fibris, qui vesicæ collum constringit, ne vrina nobis inuitis exeat. Etenim nisi hic adesset musculus: in horas singulas lotium exire cerneret, quemadmodum in quibusdam cõspicimus, quibus hic musculus relaxatus est: & ut ijs euenit, quibus miseri empirici quidam, qui lapides euellere profitentur; transuersum dictum musculum incidere: qui, cum huius situm prorsus ignorent; hunc nolentes secant, & pro morbo morbum inducunt. nam quibus hic musculus præcisus est, semper vrina exit, nunquam colligitur; quamobrem femoralia vrina aspersa, foetentiaque habent

Vesica.

Parastatæ glandulae semen continentes.

Musculus vesicæ collum cõplectens.

Error contingens imperitis in lapide & vesica extrahentibus.

T semper

semper, quo nihil quicquam fœdus dici, excogitariq; potest. Adeo vt plane videas ab hoc musculo detineri vrinam, qui, cum meiere volumus, relaxatur; atq; ita lotium exit. hic musculus & in mulieribus etiã reperitur quanuis afsistentes glandulas non habeant.

Mulieres carẽt glã  
dulis parafatib.  
cum tamẽ muscu  
lum ibi existentẽ  
habeant.

## De Musculis Ani.

## Cap. XXVII.

Anus.

Ani tres musculi.  
Musculus orbicu  
laris recti intesti  
ni sphicter dicitur.

**A**NO tres musculi contigere, ex quibus vnus orbicularis est, qui sphicter appellatur in extremo recti intestini positus. hic latus potius, quàm crassus dici meretur; fibris transuersis constat, & cum cute admodum vnitur, à coccyge ligamentis mutuo acceptis. Eodem munere fungitur, quo fungi vesicæ musculus diximus. fœces scilicet hic detinet, ne nobis inuitis exeant, vt ille vrinã. Reliqui duo lati quidem sunt, sed subtiles: cumq; ab oſis sacri ligamento, atque ab ileo initium sumpserint, in partem sphicteris superiore terminantur. hoc vsu à natura producti sunt, vt rectum intestinum sursum trahant, si forte quibusdam conatibus, vt quandoq; fit, in excernendo exierit.

Duo reliqui recti  
intestini musculi  
corumq; vsus.

## De Musculis femur mouentibus. Cap. XXVIII.

20

Musculi femoris.

Femoris motus.

Musculi femur mo  
uẽtes decem sunt

Primus musculus  
femur mouẽs na  
tes constituit.

Secundus femoris  
musculus.

Tertius femoris  
musculus.

**C**VM Gal. in lib. de Vsu Part. diffuse satis loquatur, quo pacto fiat deambulatio, ego ab huius rei tractatione nunc vestra pace lubens abstinebo. Dico itaq; femur & flecti, & extendi, & in orbem agi, intro, forasq; ferri; & vt breui omnia complectar, femur vndeque verti. Decem vero sunt musculi, à quibus mouetur: ijq; magni satis; propterea quod cum membrum tum crassum, tum oblongum mouendum esset, validis musculis opus erat, à quibus hoc efficeretur. Ex his primus ille est musculus, qui nates constituit, satis crassus, carnosus: exoritur à dimidia oſis ilium appendice, ab oſse sacro, coccygeq;. Principium huic latum est, & semicirculari, sed ita semper arctatur, vt tandem in acutum desinat. Definit autem in maius trochantirium, & adhuc inferius in femur, per latum autem tendinem coxendicis articulum supereminet. 30  
Secundi femoris musculi maior pars sub primo latet, liuetq; oritur à tota ilij appendice carnosã, semicirculariq; origine. eundem articulum superequitat, & in tendinem latum, & validum finit summo magno trochantirio adhærescens, quod & amplectitur. Tertius vero totus sub secundo latitat, liuidus & ipse, carnosusq; & semicirculari initio, vt de secundo dictum proxime est. exit ab oſse ilij, & quem-



quemadmodum de duobus alijs diximus, in progressu imminuitur in tendinem desinens, quo magno trochantirio adnectitur, sed in summitate illius interiore, vbi is non nihil inuertitur. Vfus horum trium muscutorum est, vt femur extendant, sursum attrahant, & ad exteriora ducant. Quartus est obliquo situ; oritur autem à tribus inferioribus ossibus sacri dicti ossis, principio carnosio, quod & teres videtur; finis ipsius est in tendinem teretem, quo in apicem maioris trochantirij, posteriora versus definit, femurq; ad sese trahit, & eius circumactioni auxilio est. Quintus musculus lumbalis est

Quartus femoris musculus.

10 in abdomine situs, teres quidem, sed carnosus, & crassus, & validus; situs eius aliquantulum obliquus est; totus liuet. Initium vero sumit ab vndecima, duodecimaq; thoracis vertebra à tribus superioribus lumborum, quà corpus vertebrarum est, descēdit supra pubis os, & in teretem tendinem finem habet, quā minus trochantirium inseritur. At sextus ossis ilij concavam internam partem vniuersam occupat; oritur à tota illius appendice: positus est in abdomine principio semicirculari; descēdit supra os pubis; totus carneus est; itaq; fere ad eius extremum progreditur, vbi in tendinem degenerat, qui in minus trochantira implantatur. Vfus tum quinti,

Quintus femoris est musculus lumbalis.

Sextus femoris musculus.

20 tum huius, quem nunc memorauimus, est, vt femur flectant. Septimus exit ab osse pubis iuxta ipsius cartilagineum latum origine, situq; obliquo; definit tandem in interius femur sub minori trochantire, exiguo tendine. eius vtilitas est, vt femur vnum versus aliud trahat, & femur femori superimponat, si quis recte consideret; nō autem flectendi causa, quemadmodum in hoc deceptus voluit Vessalius. Octauo musculo femoris, qui Gal. Vessalioq; est quintus: nullus in humano corpore maior est, tanta fibrarum varietate refertus, vt si quis decipere cupiat, non docere, tres, quatuorū musculos pro hoc ostendere facile possit. Oritur ab osse pubis par

Septimus femoris musculus.

Octauus femoris musculus omnium muscutorum maximus.

30 te nimirum eius interna, & à coxendice minorem trochantira amplectitur; deorsumq; tendit, femori adhærescens sua illa oblonga, aspera q; linea. posteriora carnosā. Tandem tendinem efficit, qui quidem in caput femoris interius inseritur. Dicti musculi vsus est femur erigendi; neque hæc vtilitas parui pendenda est; huius enim munere femur erigimus: femoris autem rectitudine à brutis animalibus differimus: nam nos erecti incedere possumus: illa vero in terram prona perambulant. Ad hanc vtilitatem illud insuper accedit, quod octauus huius musculi beneficio septimo auxilium præstetur: vt femur femori, cum volumus, superimponamus. Nonus totum illud foramen occupat, quod in osse pubis, & coxendice positum

T 2 est ex-

est exteriori in parte. Principium eius latum, carnosumq; est; exteriorem partem versus incedit. transuersus manet, & semper arctatur; adeo vt in satis validū tendinem tandem tendat, qui tendo definit in cavitatem quandam in maiori trochantirio positam.

Decimus, & vltimus femoris musculus interiore in parte est, dictūq; foramen ipse quoque occupat. Musculus hic non modo aspernandus non est, sed est summopere animaduertendus; admirabilis enim est, & in quo summi opificis prouidentiam cōtemplari licet. Nam carnosus oritur, latusq; vt supra de Nono memorauimus, quiq; ab intus ad extra feratur supra coxendicem, vbi cavitatis ad trochleæ imaginem efformata. hic musculus, cū sibi incessus flectendus est: tres sæpe tendines efficit, quandoq; quatuor, & quinque: qui postremo vniuntur, vnumq; tendinem duntaxat nerueum, perpulchrum constituunt, cuius terminus in posteriore maiori trochantirij parte sistitur. Sed hoc, quæso, priusquam ab hoc musculo discedimus, animaduertite, quod est pulcherrimū. Quum primū tendinescit, tendinisq; substantiam sapere videtur; natura statim prudentissima

Marsupii carneū,

carneum marsupium parauit de industria, in quo tendinem hunc collocat, vt tutus incedat, neq; ab ossis duritie vllō pacto lædatur: quod os ab hoc musculo amplectitur. Non desunt, qui carneum marsupium, quod diximus ad decimi musculi, cum tendinescit, propugnaculum paratum; musculum peculiarem à dicto seiunctum esse contendunt: Quod mihi nullo pacto probatur, cum decimi musculi portionem esse plane perspiciam.

### De Musculis Tibiam mouentibus. Cap. XXIX.

Tibia.  
Musculi tibiæ,

Tibiæ motus à decem sunt musculis.

Primus tibiæ musculus.

**T**IBIA flectitur, extenditurq; secundum rectitudinem, quemadmodum palam cernitur: mouetur etiā oblique versus exteriora, licet obscurus sit motus iste. Quamobrem Vessalius deceptus, qui motū hunc obliquum pernegat. Hi motus, quos dixi, à decem musculis perficiuntur, quorum quinque flectunt, quatuor extendunt, vnus vero duntaxat sub poplite latitans oblique mouet. Ex his primus tum neruosus, tum carnosus ab interiori appendice ossis ilei exoritur. Idem tamen deinceps carneus euadit, & fasciā præ se fert; oblique incedit per femoris interiora delatus: cum autem ad internum caput femoris peruenit, procedit, & in neruosum finit tendinem, sed qui vere non est teres (vt Vessalius autumat) sed latior: finit vero in anteriorem tibiā. Hunc musculum voluit Gal. tibiā supra tibiā deferre: vt pueri ludentes, facere consueuerunt,



uerunt, quod falsum est, si de homine intellexit; quanquam in simia verum esse deprehendatur. nam hic musculus in simia, vel in media tibia definit. Secundus tibiæ musculus enascitur ab anteriore parte ossis pubis prope cartilaginem; initiumq; illius latum est, iuxta longitudinem commissuræ ossis pubis. carnosus descendit, rectis fibris, fit teres apud internum femoris caput; & in nerueum tendinem definit, qui pene est teres; tamen deinde dilatatur, & terminus eius est in anteriore tibiæ parte, quam *ἀντικνήμιον* Gal. vocauit, penes primo loco dictum musculum. Tertius vero ab infima coxē-

Secundus tibiæ musculus.

10 dicis appendice nerueo principio oritur, longo, & tereti: Deinde circa medium femur carnosus efficitur; sed multiplicibus fibris: defertur per posterius femur; quum primum autem ad genu peruenit, tendinem nerueum efficit, quo in posteriorem sed anteriorem tibiam implantatur. Quartus ab eodem loco oritur prope tertiū; verum eius origo tum carnea, tum neruea est, deorsumq; tantum non teres existit. Incessus vero est per posterius femur; fibris constat rectis. prope genu in nerueum tendinem exit, qui priusquam finiatur, dilatatur: finitq; tandem parte tibiæ anteriore inter primum, ac secundum. Quinti origo est ex appendice coxendicis

Tertius tibiæ musculus.

Quartus tibiæ musculus.

20 penes exortū tertij, quarti; eaq; acuta primo, deinde fit crassior, & progreditur per posterius quidem, sed exterius femur; quum vero medium illius attingit, notatu dignam carnis molem sibi asciscit à medio femore enascentem, quam forte aliquis musculum vnum censeret: sed profecto non est ea caro distinctus musculus à quinto quem describimus. Tamē si cui post hac libuerit dictam carneam quinti musculi partem pro nouo musculo numerare, quem alij non animaduernerint; vt aliquid adnotasse, videri possit: id per me sibi liceat, mihi sat sit, quid ingenue sentiam, admonuisse. hoc eodem in loco extrinsecus incipit in tendinem degenerare, qui cum ea carne, quam dixi, vnà in finem vsque descendit, in termino ipsius in capite fibulæ collocato. Si vero petas causam, quamobrem natura illam carnis portionem huic musculo affixerit: ego dicam; propterea factum esse, vt musculus validior efficeretur; voluit, vt è medio femore exiliret, vt illi magis proxima esset. nam in extrinseca parte vnicus hic duntaxat adest musculus; cum interius quatuor adsint.

Quintus tibiæ musculus.

30 Vñ in finem vsque descendit, in termino ipsius in capite fibulæ collocato. Si vero petas causam, quamobrem natura illam carnis portionem huic musculo affixerit: ego dicam; propterea factum esse, vt musculus validior efficeretur; voluit, vt è medio femore exiliret, vt illi magis proxima esset. nam in extrinseca parte vnicus hic duntaxat adest musculus; cum interius quatuor adsint. Vñ in finem vsque descendit, in termino ipsius in capite fibulæ collocato. Si vero petas causam, quamobrem natura illam carnis portionem huic musculo affixerit: ego dicam; propterea factum esse, vt musculus validior efficeretur; voluit, vt è medio femore exiliret, vt illi magis proxima esset. nam in extrinseca parte vnicus hic duntaxat adest musculus; cum interius quatuor adsint. Vñ in finem vsque descendit, in termino ipsius in capite fibulæ collocato. Si vero petas causam, quamobrem natura illam carnis portionem huic musculo affixerit: ego dicam; propterea factum esse, vt musculus validior efficeretur; voluit, vt è medio femore exiliret, vt illi magis proxima esset. nam in extrinseca parte vnicus hic duntaxat adest musculus; cum interius quatuor adsint.

Quinq; primorū musculorum tibiæ vsus.

Quintus in ordine tibiæ musculus pro quarto à Vessalio annumeratur.

minus

minus velocius currere poterat. Quæ res profecto Gal. medicæ artis princeps (Hippocratem semper excipio) indigna non esse nõ potest. Nã si hunc musculus, quem exterius solum esse diximus, demas è crure; flexionem rectam efficere nullo pacto poteris; at in cursu rectam fieri flexionem Gal. admonuit secundo de Administrat. Anat. Immo vero oppositum re ipsa cõperi: saucios scilicet in hoc musculo, quem nos quintum, Gal. quartum vocauit; neque magno vulnere, qui licet in sanitatem redacti essent, non sine labore tibiam flectebant. Quod si Gal. de vno ex intrinsecis quatuor intellexisset ego ne verbum quidem de hac re fecissem; quippe qui maxime om-  
nium à contradicendo principibus in arte viris abhorreã. Vos ob-  
secro, qui nostra hæc qualiacunq; legitis: huius musculi magnitudi-  
nem cõsiderate: vsum illius animaduertite; & Gal. in hoc longe de-  
cipi facile iudicabitis. Flexionis musculis absolutis, reliquum est,  
vt ad musculos tibiam extendentes deueniamus, qui quatuor nume-  
ro sunt. Sextus igitur tibiæ musculus ( iam enim quinq; absoluti-  
mus) dignus est, quem diligẽter consideres, & admireris. Oritur  
è media appendice ilium ossis. principium illius tum nerueum est,  
tum carneum, breuis quidem est musculus, sed tamẽ crassiusculus, &  
maiori trochantirio coniungitur. ibi eius caro definit. sed tendo la-  
tus, membranofus, neruosusq; sequitur, quo tendine maiorem in  
vniuerso corpore nullum videbis, amplectitur omnes fere muscu-  
los, qui circũ femur positi sunt, rectæ sunt illius fibræ; tendo, quẽ  
dixi, maxime est nobilitatis; propterea chirurgi animaduertant, ne  
illum transuerse fecent: rotulam genu complectitur, & in antero-  
rem partem tibiæ, fibulæq; tandem inferitur. Septimus exit è  
magno trochantirio principio nerueo: & totum trochãtera circun-  
dat: femori adhærescit superius, & exterius. crassus admodum est  
hic musculus, totusq; liuidus, ad patellam vsque carnosus rectis fi-  
bris progreditur. deinde in latum, membranofumq; tendinem de-  
finit, qui patellam complectitur. Octauus, neruosus emergit è  
cervice femoris, & à magno trochantirio, quasi duabus cõstet ori-  
ginibus: sed immediate fit carnosus; femori adhærescit; progressus  
illius est anterus, & interius, carnosus vt dixi ad patellam vsq; pro-  
greditur, varijs fibris; finis eius est tendo, qui genu & ipse comple-  
ctitur. Nonus vero ortum habet ab anteriore parte ossis ilium su-  
pra articulum coxendicis. egressus huius musculi acutus, nerueusq;  
primo est; deinde fit carnosus, & teres. figura est huius musculi,  
qua musculus esse decet; rectus enim incedit supra anterius femur  
inter septimum, octauumq; musculus priusquã ad genu perueniat,  
tendinem

Sextus tibiæ mu-  
sculus.

Tendo sexti tibiæ  
musculi omnium  
tendinum maxi-  
mus.

Septimus tibiæ  
musculus.

Octauus tibiæ mu-  
sculus.

Nonus tibiæ mu-  
sculus.



tendinem gignit nerueū, validum, qui ex angusto fit latior; coitq; cum septimi, & octauī tendinibus, vnaq; patellam amplexantur, ac in anteriorem tibiā suis finibus inferuntur. Quatuor hi muscoli, quos proxime memorauimus, tibiā per rectā lineam extendunt; veluti ab alijs quinq; recta quoq; linea flectebantur, quicquid Gal. de horum vfu dixerit tertio de Vfu part. qui ita in hoc deceptus est, quemadmodum in ea sententia, qua à coxendice quatuor musculos exoriri opinabatur: cum re ipsa (si de homine loquamur) tres duntaxat exeant à coxendice. Decimus sub poplite latitans, origine

Musculi tibiā recta extendentes. Gal.error.

10 neruea, teretiq; emanat ab externo femoris capite, extra sub ligamento delatus; postea vero carneam naturam induit, situ est obliquo, fibris obliquis; & carnosus in posteriorem, interioremq; tibiā implantatur. Hic musculus tibiā oblique mouet versus exteriora, licet hoc Vessalius inficietur, qui hunc musculum in genu articulatione minus quā recte perpēdit; laxa etenim est. & quamuis velit ipse articulationes illas per ginglymum rectā duntaxat flectere, & extendere: agere præterea nihil; ego tamē affirmo ab hoc occultato musculo, quem verbis descripsi, tibiā oblique moueri.

Decimus tibiæ Musculus.

20 De Musculis extremo pedi deferuentibus, qui in tibia siti sunt. Cap. XXX.

EXTREMVS pes flectitur, extēditur, moueturq; ad latera suorum musculorum adminiculo, qui in posteriores, & anteriores diuiduntur; sunt vero numero duodecim, vel summum tredecim. Primus emergit ab interno capite femoris supra genu retro. carnosus quidem incipit, & angustus; verum progrediens dilatatur, & circa mediam tibiā plus minus in tendinem cessat latum, ac nerueum, qui postmodū semper angustus efficitur, & in posteriorem, 30 superioremq; calcem definit. Secundus priori similis est, nā etsi exeat ab externo femoris capite, in reliquis tamen eadem agit, quæ prior; adeo vt vnus duntaxat musculus esse videatur duobus principijs; nam corpus vnum est, tendo vnus. Quod si illud me euitare posse considerem; ne hoc lectorum mentes perplexas haberet: equidem hos duos musculos vnum solum musculum esse profiterer. Hi duo muscoli, quos in vnum cogere merito possemus; ventrem tibiæ posteriorem construunt, quam suram appellamus. Tertio occurrit musculus exiguus, ipse quoq; exorians ab externo capite femoris prope articulum. sui exitus initio acutus est. deinde in ventrem prominet; brevis est: sed in tendinem teretem, atq; nerueum

Pes extremus.

Musculi extremi pedis 12. seu 13. Primus pedis extremi musculus.

Secundus pedis musculus.

Musculi suram confluentes. Tertius tibiæ musculus.

Tendo longissim'  
humani corporis

Quartus tibiæ mu-  
sculus.

Tendo quarti ti-  
biæ musculi est  
omniū robustis-  
simus.  
Musculi pedem ex-  
tendentes.

Quintus tibiæ mu-  
sculus.

Sextus tibiæ mu-  
sculus.

Pedis perforati te-  
dines.

Tendines quatuor  
digitorum pedis fle-  
ctentes.

Primus musculus  
anterioris pedis.

ueum definit, quo tendine inter teretes longiorem in humano cor-  
pore non inuenies. latet hic musculus sub duobus, quos antea dixi-  
mus. Situm habet obliquum, obliquas quoq; fibras. A parte ex-  
terna internam versus progreditur, tendini supradictorum adhæ-  
rens: tandemq; interno calci implatur. eius vsus est pedem in in-  
teriora evertendi. hic musculus in simijs latum tendinem producit,

vt Galeno placuit; at in nobis in calcem cessat. Quartus maior  
est tibiæ musculus, liuetq; nascitur sub appēdice fibulæ à postero-  
ri parte, principio nerueo, & valido. Postea carnosus euadit, &  
fibulæ adhæret, tibiæq; latitudine ossa excedit. Quum vero me-  
diam tibiā attigerit, tum in angustum tendit, & versus calcem in

tendinem terminatur, quo nullus omnino robustior in homine in-  
uenitur: qui tendo cum priorū tendine vnitur, & in posteriore cal-  
ce definit. Munus primi, secundi, & quarti est pedem extenden-  
di, in terramq; figendi; cui rei tamē quatuor alij musculi auxiliares  
copias subministrāt. Cum Hector raptaretur: hoc tendine vinctus  
fuisse dicatur necesse est: nuncq; in dies videmus lanios integra bru-  
ta hoc tendine suspensa in macello proponere: quæ res huius tendi-  
nis robur maximum testatur.

Quintus à tibia, & à fibula originē  
ducit; ligamentoq; illi adhærescit, quod tibiā, & fibulam interia-  
cet, anteriores musculos à posterioribus seiungens. Carnosum  
conspicies fere ad extremā tibiā, prope internum malleolum de-  
finit in robustum, nerueum, & teretem tendinem: incedit tum sub  
interno malleolo, tum sub nauiculari dicto osse: demum sub planta  
pedis in tarso moritur. hoc vsu natura hunc musculum genuit, vt  
pedem versus interiora trahat; neque ligamenti expers existit.

Sextus à posteriore tibia effluit longo exortu, & carnosus, etsi post-  
modum in tendinem teretem degeneret, incedit sub interno mal-  
leolo; & sub calce ligamento præditum est ab appendice tibiæ ex-

orto. Diuiditur dictus tendo sub planta in quatuor tendines tere-  
tes, perforatos, qui procedunt, donec in tertium articulum qua-  
tuor digitorum, pollice excepto, inferantur. Vtilitas non medio-  
cris est; nam quatuor digitos flectunt, eosdemq; valide adstringūt.  
Septimus vero longus, carnosusq; inchoat à fibula emergēs sub ap-  
pendice spatio trium digitorum, vt nunc loquuntur; carnosus est,  
donec ad calcem perueniat, vbi in tendinem teretem commutatur,  
qui sub ligamento, sub malleolo, sub planta præterlabitur, & in os  
pollicis inferitur, quod flectit. Hactenus de posterioribus muscu-  
lis extremi pedis verba fecimus; nunc de anterioribus loquamur.

Ex his primus à tibia egreditur, idest ab appendice penes fibulam:  
ipsiq;

10

20

30



ipsiq; admodum adhæret. satisq; crassus est, & hisce anterioribus maior existit. Vbi mediam tibię longitudinem præterijt, angustus redditur; desinitq; in tendinem teretem, nerueum, & validum, cuius incessus est per superiorem tarsum, detinetur à ligamento, quod emanat ab appendice inferiore tibię, fibulęq;. Hic ille est tendo, qui adeo attollitur, itaq; euidens est sub pelle. finis eius est in osse pedij pollicis præposito. Vsus est extremum pedem flectendi.

Tendo in pede sub pelle apparet.

Tendo extremum pedem flectens. Secundus musculus anterioris pedis.

Secundus exit acuto initio ab appēdice tibię, adhæretq; ligamēto, quod tibiā, fibulamq; interiacere diximus; deinde fibulę ipsi ad  
10 finem ipsius fere. carnosā quidem est huiusce musculi radix: Veruntamen in quatuor teretes tendines desinit, qui detinentur sub eo ligamento, quod à tibię, & fibulę appendice exoritur. Quatuor hi tendines ampliantur, postremoq; in omnium digitorum superiorem partem inferuntur. pollicem hic quoque excipio; vsus est, vt digitos illos extendāt. Tertius à media fibula carnosus exilit prope ligamentum; deinde in tendinem teretem degenerat, qui sub transuerso itidem ligamēto defertur: & in vltimum pollicis articulum inseritur, quem & extendit. hic tendo in duos diuiditur, quorū alter finem habet, vt dixi; alter vero inseritur in os pedij, pediq;

Tendines superiores quatuor digitorum pedis.

Tertius musculus anterioris pedis.

20 flectendo auxilium præstat. Secundus hic tendo à musculo quoq; oritur, quę portio in quibusdam, raris tamē hominum corporibus, alius musculus videtur esse. Ego tamen vnum solum musculum dicerem: licet non magnopere ægretulerim, si cui hunc duorum musculorum loco habere videatur: tunc duodecim, quos diximus, tertiusdecimus addetur; itaq; vt initio huius capitis attigimus, tredecim erunt numero secundum quosdā musculi extremo pedi deferuientes. Quartus nascitur ab appendice superiori fibulę versus exteriora; etsi quis omnia adiuuū refecaret; musculus hic, neque posterioribus, neque anterioribus adnumerandus esse videretur.

Musculus pedis & tertius decimus annumeratur.

Quartus anterioris pedis musculus.

30 Sed vt ne lectoribus obscuritatis tenebras effundamus; inter anteriores adnumerabitur. Exortu carneo, nerueoq; constat; fit carnosus deinde; postremo exit in teretem tendinem, & sub plāta suis finibus in pedij ossa immititur. hic musculus pedem ad exteriora euertit, & ligamento constat transuersali. Quintus & ipse à fibula prorumpit exortu oblongo; exterius carnosus est, quemadmodum de quarto diximus: itemq; sub externo malleolo incedit, vbi vna cum quarto in tendinem teretem finit, qui in os pedij inseritur, quod minimo digito præponitur. pes exteriora versus ab hoc musculo trahitur. Illud est insuper animaduertendum, licet ex his musculis omnibus dixerimus pedem vel extendi, vel flecti, vel intro,

Musculus ad exteriora pedē euer tens. Quintus anterioris pedis musculus.

Quo pacto humi  
pes affigatur.

vel foras, ferri; nihilominus, si omnes vna contineant, atq; in vna  
actione concurrant; tunc idem ab hisce omnibus humi affigetur.

De Musculis in extremo pede positis. Cap. XX XI.

Musculi extremi  
pedis digitis de-  
seruiens sunt 18.

Musculi digitis pe-  
dum famulantes  
sunt viginti duo.  
Primus musculus  
pedis digitis in-  
seruiens.

Quatuor perfora-  
ti tendines, & eo-  
rum usus.

Latus tendo pedis  
acutissimi sensus  
Plantam non esse  
depilem tendinis  
lati causa.

Secundus pedis mu-  
sculus digitis in-  
seruiens pollicem  
ab alijs digitis  
deducens.

Tertius musculus  
digitis pedis in-  
seruiens.

Tendo abducens  
minimum pedis  
digitum ab alijs.

Quatuor musculi  
pedis digitis in-  
seruiens.

Musculus pforas.

**M**usculi positi in extremo pede sunt decem & octo, qui  
omnes digitis deseruiunt; quanuis quatuor alios supra descri-  
pserimus, quorum alios flectere, alios extendere monuimus. Ita  
vides quo pacto musculi, qui pedem digitis famulantur, sint viginti  
duo. Primus igitur ex his decem & octo propositis, sub media plā-  
ta iacet; initio sumpto à parte calcis inferiore, idest ab eius appendice,  
superstat huic tendo latus, quem (vt supra admonui) Gal.  
existimauit oriri à tertio musculo, qui à nobis inter posteriores ti-  
biæ tertius, à Gal. quartus numeratur lib. de dissect. muscul. huic prin-  
cipium neruosum, carneumq; contigit; sub pedij osse diuiditur, &  
in quatuor tendines teretes, perforatosq; euadit, qui in secundum  
articulum quatuor digitorum inseruntur, mirabile dictu, visu vero  
admirabilius. Quis enim obsecro, incredibile opificis nostri pro-  
uidentiam non admiretur, atque suspiciat, cum in vno musculo tot,  
tantaq; contemplari possit? Vfus est flectendi secundum articulum  
illorum digitorum, quos dixi. latus, qui huic musculo superstat,  
tendo sensus est acerrimi; tanto vero sensu dedita opera à natura  
donatus est, vt quàm citissime externas iniurias perferret. Aiunt  
quidam plantam propterea depilem esse: quod ego falsum credi-  
derim: cum lepori non desit hic tendo, cuius planta nihilo secius  
pilis referta est. Secundus & ipse à calce prodit penes primum,  
sed interiore ipsius parte; teres fere existit; osi pedij quod pollicem  
præfertur, colligatur; tendinemq; producit, quo in pollicem im-  
plantatur. hoc vsu fabrefactus est, vt pollicem ab alijs digitis abdu-  
cat. Tertius quoque ab eodem calce exoritur prope primum. iter  
ipsius est exteriorem partem versus; & osi pedij minimo digito præ-  
posito affigitur; vbi processum illius videre est. deinde finit tan-  
dem tendinosa substantia in eundem minimum digitum; abducitq;  
illum à reliquis. Cum ab his tribus discesseris, sequuntur alij qua-  
tuor, qui sub pedis planta tibi occurrunt sub ossibus pedij, quorum  
exortus emanat à tendinibus musculi perforantis, qui in tertio arti-  
culo quatuor digitorum cessat. sed hi musculi cum parui, teretesq;  
sint: carnis portionem sibi admouet, quâ à calce mutuo accipiunt.  
De his musculis Gal. & Vessalius scribunt, vsu horum esse, vt quatuor  
digitos à pollice diuellant; quoniam desinunt in quatuor tendines  
teretes,



teretes, ac nerueos, qui procedunt per externam partem quatuor digitorum, & alligantur tendini superiori, quem extendere diximus. progrediuntur autem vsque ad extremos digitos: neq; desinunt in primo articulo, quemadmodum hoc in loco voluit Vessal. qui in hoc parum diligens fuit; cum his musculis obliquum duntaxat motum concedat. Sed scitote lectores cãdidissimi, meum esse inuentum hoc; neque quenquam ex his, qui de Anatome ante nos scripsere, hunc vsum agnouisse. Non enim mouët hi musculi obliquo motu, sed quatuor digitos vere extendunt; atq; ita extendunt, vt ab his magis extendãtur, quàm ab alijs tendinibus; vt sensu oculorum à quouis in secando perito deprehendi facile potest. Post hos decem sequuntur musculi in plantæ ossibus: nam singulis digitis bini musculi inditi sunt, qui ab initio pedij proficiscuntur; sinẽq; habent in primo articulo omnium quinq; digitorum, carnosi sunt, itaque à natura efformati, vt flexioni promptius obtemperarent; quod agunt, quando bini vnà mouent eodem tempore. cum vero alter ex his duntaxat agit, digitos oblique trahunt intro, & extra. Postremus musculus extremo in pede positus, idest decimus octauus positus supra tarsum, & pedion, ortum ducit à ligamẽto, quod tibiam, & fibulam cum pede connectit. Est musculus latus, & subtilis definens in quinque tendines, nonnunquam in quatuor. inseritur in omnes digitos externa in parte; digitos mouet oblique ipsos extendens.

De Musculis, qui cubito deseruiunt. Cap. XXXII.

**C**UBITVS flectitur, & extenditur recte, quidquid Galeno videatur de motu obliquo, quem nunquam in homine inuenies: neque ego hac de re longo sermone cõtra Gal. disputabo; cum sensui pateat cubitum recta extendi, flecti q; & obliqui motus prorsus expertem esse. quod cum mihi in mentem venit, non possum satis mirari, quo pacto Gal. vir alioqui diligentissimus rem adeo absurdam, atque à veritate abhorrentem affirmauerit, cum in se ipso periculũ facere nullo negotio potuisset. Musculi flectentes duo sunt, totidemq; extendentes. Primus musculus est validus, qui sub cute conspicitur: & vulgo ab Italis dicitur Il pescetto. situs est in parte humeri interiore; exoritur à scapula duobus inijs distantibus, quorum alterum nerueum est, ac teres, quod originem ducit à parte suprema supercilij acetabuli, quod in scapula cernitur. Incedit supra caput humeri, & per illam rimam præterlabitur, quæ sita est in hac parte superiori, quam rimam natura huius tendinis gratia

Quatuor musculo rum quatuor pedis digitos extendunt vltus nõ alijs cognitus.

Decem musculi singulis digitis pedis bini inseruntur.

Postremus musculus pedis.

Decimi octauus pedis musculus vltus.

Musculi cubito seruientes.

Cubitus.

Musculi cubiti duo sunt extendentes, & totidem flectentes. Primus musculus cubiti flectens.

finxit. Alterum vero huius musculi initium egreditur ab ancyroide processu, qui partim nerveus est, partim carnosus; carnosâ vero pars humero adhærescit, videturq; conniuentibus distinctus musculus, & separatus, qui humero opem præstet, illum versus pectus trahens. Deinde hæ duæ origines dicti musculi sub capite humeri vniuntur, & musculum crassum efformant propemodum teretem, validum, fibris rectis constantem, qui apud cubiti articulum in tendinem nerveum cessat: qui dum fini proximus est, dilatatur, radioq; annectitur, vbi is tuberculum internum habet ob insertionem huius musculi fabrefactum. Secundus exit ab osse humeri carnosus totus, fibrisq; rectis; sub priore latitat, carnosus deferitur supra cubiti articulum, & in cubitum, ac radium infigitur. Horum duorum musculorum utilitas est, vt cubitum recte flectant. Tercius è scapula prodit parumper sub illius ceruice: per humeri posteriora deferitur, tendineq; constat supra lato; carnosus suo cum tendine in olecranium tendit: atque illud etiam præterit. fibræ eius sunt rectæ. Quartus duobus initijs exit à ceruice humeri, cui multum adhæret; & cum tertio admodum vnitur, adeo vt tertius cum quarto vnus solus musculus videatur multiplici origine constans. Tamen duo reuera sunt. Demum hic quartus musculus ibi definit, vbi tertium definere diximus; fibras rectas habet. Munus amborum tertij inquam, & quarti est cubitum recte flectendi.

Secundus cubitum  
flectens musculus.

Tercius cubiti  
musculus.

Quartus cubiti  
musculus.

Tertij, ac quarti  
musculi cubiti  
usus.

Musculi manum  
mouentes.

### De Musculis summam manum mouentibus. Cap. XXXIII.

Manus.

**M**ANVS (vt Aristo. & Gal. inquiunt) organum est organorū: cuiusq; structura admirabilis est summum artificium præ se ferens. Hanc Deus opt. Max. homini concessit: vt huius ope omnes artes exercere, seq; ab externis iniurijs tueri posset. de qua cū Gal. vir eloquentissimus tā longo processu primo de Vsu part. loquutus fuerit; hoc argumentum lubens præteribo. Ego de summa manu mouentibus musculis postremo loco verba facturum sum hanc vnam ob causam, quòd, cum illorum compago miraculi instar esse videatur; in calce de his loquendum existimaui; vt memoriæ magis inhæreant, quæ in libri calce leguntur. Cum autem Gal. qui & ipse miram hanc compagem vidit, & animaduertit: statim in initio rem hanc tractauerit; non iniuria quispiam huius mei ordinis causam quæret. Ne existimetis me in finem hanc materiam reiecisse, quòd illius oblitus fuerim, vt Gal. contigit libro de Vsu part. de musculis femoris

Quare in calce de  
extremæ manus  
musculis dedita  
opera tractauit.



emoris, quos obliuione præterijt; sed vt superius attigi, dedita ope  
ra hæcenus distuli, vt res pulcherrimas, & maxime viles lectorum  
mentibus magis hærent: Immo vero consulo, vt dum publice in  
scholis secantur corpora, hic ordo seruetur: nam hi muscoli diutius  
in corrupti perseverant, tum quòd, dum viuimus, hos musculos  
magis exerceamus, tum quòd minus pinguedinis contineant.

Hos musculos Gal. more in internos, & externos diuidam, vt eos,  
qui pedem mouent supra diuisi. Interni octo sunt, de quibus prius  
agemus: nouem externi. Interiorum summæ manus musculorum

- 10 primus perelegãs est: exoritur ab apice interni tuberculi, quod est  
in humero, exortu acuto, nerueoq; deinde carnosus euadit, & par  
uus, musculiq; veram formã refert; nam illi caput paruum est, ven  
ter latus, cauda (vt ita dicam) longa & angusta vsque ad brachiale.  
hic musculus parum oblique versus manum incedit; desertur per  
medium cubitum retro magis, quàm sit longitudinis cubiti medie  
tas. definit autem in tẽdinem teretem, atque oblongum, qui supra  
ligamentum brachialis internum ambulat; quo prætergresso tendo  
latus efficitur, qui per volam extenditur, relictis tamẽ duobus mon  
tibus maioribus detectis; postremo in quatuor digitos inseritur.

- 20 Verus vsus huius musculi est digitis flectendis auxiliari, & vt acuto  
sit sensu. Ergo si quid nocuum nobis manum constringẽtibus oc  
currat: id dictum, ac factum abijcimus, priusquam læsio procedat;  
non autem est vsus, vt vola depilis fiat, quemadmodum aliqui vo  
luere. obseruaui in quibusdam furibus, ac latronibus magni nomi  
nis ob præclara ipsorum facinora, eos hoc musculo caruisse; licet  
tendo adesset, qui exortum ducit à ligamento brachialis interno.

- Hoc primum Patauij obseruaui in illustri fure Cotola dicto, dum  
Anatomen publice profiterer. Idem Pisis animaduerti in Tym  
panista Certaldensi, si recte memini: & superioribus annis Romæ  
idem vidi, & spectatores admonui in præbytero Lucensi, qui furũ  
Rex merito dicebatur; & propterea aureo torque, diadema gestãs  
aureum suspensus est; vt suarũ præclarissimarum virtutum præmia  
cerneret, antequam ex hac vita migraret: exemploq; suo alios ad  
furta alliceret, qui furum regem viderent in tantum honorem.

- 30 Secundus egreditur ab interno tuberculo humeri, principio in acu  
tum tẽdente, tum nerueo, tum carneo; cubito adhæret, & per eius  
longitudinem progreditur vsque ad radicem brachialis: puluinaris  
instar cubito præsto est: quum primum ad brachiale peruenit, in  
tendinem degenerat; & in quartum os brachialis implantatur car  
neo, & nerueo fine. Tertio origo est ab eodem loco, & incessus  
obliquus

Musculi extremæ  
manus in inter  
nos, & externos,  
diuiduntur.  
Musculi man' in  
terni sunt octo.  
Primus musculus  
manus interior.

Vola.

Primi musculi in  
terioris manus  
vsus.

Latrones carẽ vt  
plurimum primo  
interiore muscu  
lo manus.

Secundus muscu  
lus interior ma  
nus.

Tertius interior  
manus musculus.

obliquus iuxta radij longitudinem. cum vero ad brachiale aduētat, in tendinem teretem, & validum exit; qui inseritur in os illud post-brachialis, quod indicem fulcit. Vfus duo musculi, cū vterq; agit, brachiali flectēdo dicati sunt, idest extremæ manui; cum vero alter tantum agit, oblique mouet nunc sursum, nunc deorsum, duobus tamen musculis opem ferens, qui in exteriori parte siti sunt.

Quartus man<sup>us</sup> interior musculus.

Quartus musculus exortum habet admirabilem: nerueus etenim, acutusq; nascitur ab interno humeri tuberculo, carnosus postmodū fit: & iuxta cubiti, radij q; longitudinem deferitur. vbi medium cubitum præterijt, in angustum tendit, terminaturq; in quatuor tendines teretes, nerueos, ac perforatos: qui sub ligamento brachialis deferuntur, sub quo tamen tres primi musculi non deferuntur. terminum habent hi tendines in secundo articulo quatuor digitorū, quos flectunt. & quoniam tendinibus quinti musculi ad tertium articulum quatuor digitorum penetrandū erat; propterea natura hos perforauit, qui neruei sunt, pulchri, pellucidi; resq; est & spectanda, & admiranda. hoc autem natura sagax effecit, vt digiti ordine quodam sese consequerentur.

Quintus manus musculus interior.

Quintus musculus quarto multo validior est, neq; mirum: quoniam huic maior etiam motus futurus erat, maiorisq; momēti; etenim quatuor digitos flectit, nō quinq; vt Gal.lib. de Vsu Part. primoq; de Anatom. adm. & lib. de musc. voluit. quos & optime constringit: nascitur prope quartum, sed maiori parte à superiore, interioreq; cubito. latet sub quarto, arcatur pedetentim, & cubito adhærescit, antequam ad brachiale perueniat. exit demum in quatuor teretes, nerueosq; tendines, & perforantes, qui deniq; inferuntur in tertium articulum quatuor digitorum, pollice excepto. tametsi Gal. primo de Administ. Anat. vnum ex huius musculi tendinibus ad pollicem tendere dixerit. Quod tamen verum esse in simijs deprehenditur, in hominibus nequaquā. Nam hominis pollex à proprio musculo flectitur, quem mox describemus. Quintus hic musculus (vt ad illum redeamus) hæret ligamento, quod diuidit musculos anteriores à posterioribus, quemadmodum in tibia. Sextus oritur à radio; ligamentoq; illi adhæret, quod interiores ab exterioribus musculis seiungit: per radij longitudinem iter habet; prope brachiale definit in tendinem teretem, & nerueum, qui transit sub copula carpi, vna cum quarti, & quinti musculi tendinibus: deinde in vltimum pollicis articulum inseritur, quem flectit. Septimus carnosus emergit ab interno tuberculo humeri, & à superiore, interioreq; cubito; obliquus repit, & in media longitudine radij terminum eius videbis partim carneum, partim

Sextus manus interior musculus.

Septimus manus interior musculus.

10

20

30

tim



tim nerueum; fibris obliquis constat. Octauus musculus quadratus est, positus prope brachiale, carnosus exoritur à cubito; & carnosus item in radium definit; fibras transuersas habet, situmq; transuersum. Munus duorum musculorum, quos supra memorauimus, septimi inquam, & octauus, est radium in pronum vertendi.

Octauus manus posterior musculus.

Musculi radii in pronum vertentes.

De Musculis externis, qui manui famulantur.  
Cap. XXXIII.

Musculi manus externi.

- 10 **E**x his, qui primo occurrit carnosus, & nerueus; prodit ab externo humeri tuberculo; deinde carnem induit, & crassescit; inter cubitum, & radium incedit, donec ad brachiale accedat; nunc in quatuor, nunc in tres tendines teretes, & nerueos tendit, qui per sinum pertranseunt, qui est in appendice radij; colligantur vero ab vno ex ijs ligamentis, qui à dicta appendice oriuntur. Hi tendines, quos dixi, procedendo lati euadunt; & finiuntur à primo vsque ad tertium articulum quatuor digitorum, idest in indice, medio, anulari, atq; auriculari. Quum vero tribus tantum tendinibus præditus est, auricularem digitorum tendinum expertem demittit. sed frequentius quatuor tendinibus munitum inuenies hunc musculus, quàm tribus: qui tendines vsq; ad extremos digitos sub unguib; progrediuntur; neque tamen eorum radicibus inseruntur. atq; hæc illa causa est, quamobrem tantus dolor excitetur, si quid carnem, & ungues intercedat, vt vetus est verbum; sed dolor carnem, & ungues non interiacet, sed inter tendines, carnemq;. Idem fit ab alijs tendinibus extendentibus. Atq; hoc à nobis primo scito fuisse animaduersum. Vñus huius musculi est, vt quatuor digitos extēdat. Secundus ab eodem tuberculo emergit prope primū principio acuto, nerueoq;, defertur inter primum, & cubitum iuxta eius longitudinem, & versus brachiale. Terminatur autem in tendinem teretem, nerueumq;, qui nonnunquā bifidus est; defertur supra brachiale inter radium, & cubitum; inseritur in minimum digitum vsq; ad extremum eius. hic musculus est admodum teres: eius vsus est minimum digitum à reliquis abducendi, nobisq; vsui est non mediocri ad palmam gignendam. Tertius carnosus prodit medio cubito plus minus, quo loco cubito inest linea oblonga, & aspera, facta vt tribus musculis exortum daret. situs huius musculi tertij obliquus est: terminus eius est tēdo teres, qui in indicem inseritur, vt indicet, idest indicem oblique extendat. at tendo, quem dixi, à radij appendice ligamentum sortitur; atque hic tendo bifidus est in nonnullis

Primus manus exterior musculus.

Primus manus exterior musculus mittit tendines ad tres tantum medios digitos;

Causa doloris ingentis in solutione cōiunui inter carnem, & ungues alijs ignota.

Secundus manus exterior musculus

Musculus minimus manus digitorum à ceteris deducens. Tertius manus exterior musculus.

Tendo manus bifidus.

Quartus manus  
exterior muscu-  
lus.

Quintus manus  
exterior muscu-  
lus.

Musculus pollicis  
extendens.  
Sextus manus ex-  
terior musculus.

Stylois processus.

Septimus manus  
exterior muscu-  
lus.

Tendo bicipitis, &  
bicornis dictus.

Musculi extremæ  
manum extendē-  
tes.

Motus manus sur-  
sum, & deor-  
sum.

Motus manus in  
orbem,

Octauus manus  
exterior muscu-  
lus longissimus  
nuncupatus.

nonnullis. Quartus principio carneo à cubito egreditur penes tertium, qui & ipse est obliquus; deferitur supra radij appendicem; definit in teretem tendinem, nerueum: inseritur in tertium articulū pollicis, quem extendit, atque ab alijs multum abducit; hoc enim vsu constructus fuit. Quintus profilit ab eadem cubiti linea prope quartum longo, carneoq; principio, cuius progressus obliquus est pollicem versus. hic musculus varias habet inscriptiones, & in varios tendines definit. Quamobrem, si quis ex multiplici muscu-  
lorum numero voluptatem perciperet, (vt complures hoc ingenio sunt) posset ex hoc vno musculo tres, & quatuor efficere. sed pro-  
fecto, vt libere dicam quod sentio; vnus mihi musculus videtur  
esse, qui supra musculum bicornem deferitur: dehiscit vero in qua-  
tuor, & quandoq; in quinque tendines, quorum vnus ad tertium pol-  
licis articulum procedit, alius ad secundum, alius ad primum, quar-  
tus ad os brachialis, quo pollex fulcitur; & nonnunquam hoc loco  
præter prædictos tendines alij duo inueniuntur. Vnus est extendē-  
di pollicem. Sextus ortum ducit à radice externi tuberculi hume-  
ri: cubito connectitur, quem & amplexatur, & per eius longitudi-  
nem perrepat; quum vero ad carpum peruenit, degenerat in ten-  
dinem teretem, nerueum, & validum, qui deferitur supra cubiti ap-  
pendicem in sinum quandam iuxta styloidem (est autem stylois cu-  
biti processus.) ab hac suum ligamentum suscipit, quod transuersum  
est; inseritur deinde in os illud postbrachialis, quod minimum dig-  
gitum sustinet, & non multo procul à brachiali. Septimus, quem  
bicornem appellat, carnosus longa linea ab inferiori humero supra  
articulum oritur: & supra radium repit; circa medium radij definit  
in tendinem validum, crassum, bifidumq; cui propterea bicornis  
nomen impositum fuit; qui postquam supra brachiale iter fecit, in-  
seritur in ossa postbrachialis, à quibus index, & medius fulciuntur,  
Hi duo musculi, quos proxime dixi, extremam manum extendunt,  
vel ita dicamus, brachiale tunc extendunt, cum vterq; operatur.  
Cum vero septimus vna cum secundo ex internis agunt, alijs duob.  
cedentibus, manum oblique deorsum ferunt. at sexto vna cū tertio  
ex interioribus mouente, tunc manus sursum oblique fertur. atque  
hic primarius est eius vsus: secundarius autem extremam manum,  
vel carpum circumuertendi: quem motum edunt, quando ita con-  
ueniunt, vt vnus alium immediate in agendo subsequatur. quanuis  
hic vsus ab alijs prætermisus fuerit: propterea quod illis ignotus  
extiterit. Octauus musculus, cui nomen longissimus, qui profi-  
ciscitur ab humero, origine carnea, supra exterius tuberculum  
incedit



incedit supra radium oblique; membraneoque tendine in radij appendicem inferitur. Nonus prodit à copula, quæ cubitum humero connectit, & è superiori parte cubiti, quam olecranon vocat obliquus progreditur; totus carneus est; immittitur in medium radii. Hi duo musculi manum supinam reddunt: mouentque radii exterius.

Nonus manus exterior musculus. Olecranon.

Musculi manum supinam reddentes, ac radium exterius mouentes.

De Musculis in extrema manu positis. Cap. XXXV.

10 **M**USCULI extremæ manus sunt vnus, & viginti, neque plures vnquam; pauciores tamen aliquando sunt, decem scilicet, & nouem, quorum septem (si vniuersi essent viginti, & vnus) pollicis deferuiunt: si nouem & decem, quinque duntaxat: minimo digito quatuor famulantur, reliquorum vero vniciq; tres opem ferunt, vnusque lato tendini. Primus est musculus paruus, transuersus, supra Veneris montem positus, à membrana carnosa exorians fibris carnosis refertus est; & inferitur in tendinem latum, quem ut dilatet, constructus fuit. hunc musculum animaduertas; nam neque ex veteribus quisquam, neque Vessalius hunc musculum nouit.

Musculi extremæ manus vnus & viginti.

Primus extremæ manus musculus scriptoribus ignotus. Veneris mons.

20 Quatuor alij sequuntur longiusculi, graciles, teretes, qui egrediuntur à tendinibus quinti musculi interioris, qui flectit tertium articulum quatuor digitorum. Hi positi sunt in vola, penes primum quatuor digitorum articulum. Desinunt autem in teretem & nerueum tendinem; & per internos digitos delati iuxta eorum longitudinem, adhærescunt tendinibus primi musculi exterioris, à quibus quatuor digiti extendebantur, & in tertium articulum suis finibus immittuntur, non autem in primum, quemadmodum Gal. & Vessalius voluerunt, qui musculos quidem cognouere; sed illorum insertionem, & usum ignorarunt; nam inquirunt adduci ab his quatuor digitos, pollicem versus. Ego vero assero ab his ipsis, licet in interiore parte

Quatuor extremæ manus musculi.

Gale. & Vessalij incisita.

30 positis, nihilosecius quatuor digitos extendi, melius quam à priore exteriorum, vel tantundem, quemadmodum in sectione deprehenditur. Interius autem siti fuere, eo quod natura periculum imminens eorum viderit, qui exterius sunt. Vnde sæpe euenit, ut exterioribus digitorum tendinibus incisis digiti adhuc extendantur. Quod cum accidit medicis quibusdam Anatomicæ artis ignaris, vsusque priuatum horum quatuor musculorum; se mire efferunt, quippe quibus miraculi instar illius vulneris curatio successisse videatur. Sextus exit à ligamento brachialis, & à quarto insuper osse eiusdem; Venerisque montem constituit: per inferiorem metacarpij partem progreditur. est fere teres, in tendinem finit, qui in primum os

Musculi quatuor manus digitos extendentes.

Sextus extremæ manus musculus.

Metacarpium.

Musculus auricularis digiti implantatur. Eius usus est, ut paucis absoluiam, hunc digitum ab alijs abducendi.

Septimus extre-  
mæ manus mus-  
culus.

Octauus extre-  
mæ manus musculus.

Nonus extre-  
mæ manus musculus.

Musculi Martis  
montem dictum  
constituunt.

Musculi pollicem  
flectentes, exten-  
dentes, ac ab alijs  
efficientes.

Septimus pollicis  
musculus.

Musculus pollicem  
versus indicem  
trahens, illiq; su-  
perponens.

Octo alij musculi  
manus digitis in-  
seruietes, quoru  
nullus datur pol-  
lici.

Musculi manus di-  
gitos & recta, &  
oblique flectentes

auricularis digiti implantatur. Eius usus est, ut paucis absoluiam, hunc digitum ab alijs abducendi. Septimus oritur à brachiali, pos-  
itus est in superiori parte, musculus est carnosus totus, & in secun-  
dum os pollicis desinit. Octauus prope septimum emergit carno-  
sus & ipse; volam versus positus est, tendine per exiguo inferitur in  
secundum os pollicis. Nonus sub septimo oritur ab eodem carpi  
ligamento, totus carneus est, & in primū articulum pollicis finem  
habet. Hi tres musculi eam carnosam pollicis partē constituunt,  
quam Chiromātiā profitentes montem Martis appellāt; trahunt  
pollicem versus ipsorum originem. Tres alij sequuntur, qui pro-  
deunt ab ossibus postbrachialis indicem medium, & anulare ful-  
cientibus: sicut obliquo sunt, vel transuerso potius, siti sub linea vi-  
tali dicta. hi desinunt in secundum pollicis articulum. principium  
vero illorum semicirculare est. De his tribus dico ego, posse quē-  
piam eos vnum duntaxat musculum dicere, quod lato esset princi-  
pio, fine acuto; fibrisq; varijs esset intertextus. Sed ne data opera  
toties à Vessalio dissentire videar: ego quoque tres esse aio; liceat  
tamen cuique per me hos tres vnum dicere. horum, vel huius usus  
est pollicem flectēdi volam versus; aliorum vero trium, quos antea  
memorauimus, munus est eundē extendēdi, & procul ab alijs effe-  
rendi. Septimus pollicis musculus scaturit ab osse metacarpij, cui  
ossi index innititur, spatiumq; illud occupat, quod est inter pollicē,  
indicemq;. transuersum situm obtinuit, & in os pollicis inferitur.  
partes huius musculi sunt hæ, ut pollicem versus indicem trahat,  
atque indici superponat. Octo insuper alij musculi præter dictos  
inueniuntur ab ossibus postbrachialis exorti, illisq; adhærentes, qui  
in primos articulos quatuor digitorum demum insertionem habēt.  
Ex hisce musculis duo vnicuiq; digito contingere, præter pollicem,  
in quem nemo ex his octo inferitur. Usus eorum est, cum duo  
ex his agunt, simul, ut primum articulum, in quo inferuntur, recte  
flectant. Sed cum vnus duntaxat agit: motū obli-  
quum efficiunt flectendo. Hos musculos fatetur  
Galenus ingenue primo de Anat. administ.  
se diu ignorasse, & tandem in eorum  
cognitionem deuenisse.



# REALDI COLVMBI CREMONENSIS

DE RE ANATOMICA  
LIBER VI.

DE IECORE, ET VENIS.

10



ECUR, siue Hepar inter principes nostri corporis partes adnumerari nemo sanæ mentis ambigit. Sed illud scitu dignum est, iecur primum esse membrum, quod in nobis gignatur. Cum primum enim nata est umbilicalis uena, illi tum primum hepar adhærescit. Situm est aut in dextro abdominis latere sub mendosis

Iecur, seu hepar.

Iecur primum omnium membrorum in animali generari.  
Iecoris situs.

Iecoris ligamenta duo.

20

uerſo affigunt iecur, quod quanquam in dextro sit latere (vt iam dictum est) nihilo secius magnâ quoque sinistri partē occupat, ubi validi ligamēti ope diaphragmati connectitur. Si hepatis figurā quæris, tantum non exacte sphaerica est. & in homine integrum existit, non in lobos diuisum, vt Galeno placuit, licet illiusmodi in quadrupedibus reperias. Causa vero quamobrem in nobis integrum, in illis diuisum sit hepar, ea est, quod cum recta figura à Deo opt. Max. donati simus, caua sui parte ventriculum immediate tegit: nam à dextra in sinistram tegens vniuersam anteriorem regionem occupat: effecitque ne ventriculus algeret. Quocirca qui cartilagini

Hominis iecur non diuidi in lobos.  
Galenus error.

Quare nostrum iecur non diuidatur.

30

mucronatæ calida admouent unguenta existimantes oris ventriculi intemperiem frigidam hisce præfidijs sublatam iri, viderint, quam prudenter id agant, iecoris præcalidi membri xiphoidi substrati feruorem adaugentes. Sed ad rem redeamus. Sectum fuit iecur quadrupedum in lobos complures, vt illorum ventriculum instar digitorum manus amplexarentur: quod, si integrum esset, illis pronis incedentibus effici nullo pacto posset. In auibus autem, quippe quæ rectæ potius stant, quam in terram sint pronæ, in duas duntaxat partes secatur. In homine igitur nusquam diuiditur iecur, nisi anteriore in parte, atque in extremo iecore: idque necesse fuit obve nam umbilicalem tantisper diuidi, vt illi aditum præberet. sub hac,

Topica remedia cartilagini mucronatæ temere adhiberi.

Quare quadrupedibus animalibus diuisum iecur datum sit.

Auibus iecur in duas tantum partes secari.

Vnica diuisio he-

patris humani  
quare facta sit.  
Eminentie duz  
sub caua uena.

Membrana iecur  
inuestiens, cuius  
merito iecur sen-  
tit.  
Que sit iecoris sub-  
stantia.

Concupiscibilis  
virtus in iecore.  
Naturales spiri-  
tus in iecore non  
gigni.  
Sanguinem in ie-  
core tantum, &  
non in corde con-  
tra Arist. senten-  
tiam gigni.  
Iecur sanguinis  
fons.

Venæ portæ origo  
Falsa Vesalij opi-  
nio.

Portæ venæ ab  
Hip. appellatæ.  
Prim' venę portę  
ramus ad supe-  
riorem ventri-  
culum deferitur.

Coronalis vena.  
Secundus venæ  
portę ram' qui ad  
inferiorem ventri-  
culum deferitur.

Ventriculum non  
nutriri chylo sed  
sanguine.

Lienem tantum  
excrementis ali-  
am verò par-  
tem nullam.

Tertius venæ por-  
tę ramus, ad o-  
mentum.

Quartus venæ por-  
tę ramus, ad lie-  
nem.

Vena à liene ad  
utrūcūq; humo-  
rem acidum ad

vbi vena porta exit, binæ, exiguæq; adsunt eminentiæ, ne vena à  
vertebrarū corporibus comprimeretur, pernecessariæ. has autem  
eminentias neque lobos, neque fibras, neq; pinnas dixeris. habet  
hepar partes duas exteriorem scilicet, & interiorem: gibba exterior  
est, & lenis, interior caua, & aspera instar rupis: idq; quoniam ei  
gibbus subest ventriculus. tenuissima peritonæi membrana, in quā  
sextæ neruorum cerebri coniugationis ramulus inseritur, circunda-  
tur hepar. Propterea superficietenus non est sensus expers. Sub-  
stantia eius nihil aliud est, quā concretus sanguis venis compluri-  
bus, quibusdamq; arterijs intertextus. membrum est permagnum, 10  
& veluti in abdomine rex. in hoc concupiscibilis virtus residet. ali-  
qui credidere ibi generari spiritus naturales; quam tamen sententiā  
non approbo: membrumq; est sanguificationi dicatum: neq; enim  
sanguis alibi gignitur: quicquid de corde scripserit Peripateticorū  
princeps Aristot. Est igitur iecur omnium venarum caput, fons,  
origo, & radix. huius caua parte vena oritur *venæ porta* à Græcis, quam  
portam Latini dicunt: quæ cum vena vmbilicali continua est; licet  
Vesalio secus videatur esse. Portæ itaq; venæ radices caua in par-  
te iecoris per illius substantiā vario disseminantur, quæ crassæ sunt  
fatis, præsertim quo ad tunicam attinet, & in vnicam duntaxat 20  
nam tandem coeunt, atq; crassum truncum cōstituunt: quæ postea  
quam inter perexiguas illas eminentias integra exijt: quas magnus  
Hippocrates portas appellauit, in multos ramos sub ventriculo di-  
uiditur; quorum primum ad superiorem mittit ventriculum, cuius  
rami pars eius longitudinem perreptat. alius vero orificium eius  
superius amplexatur coronę in morem; Iccirco coronalis hæc vena  
dicta est. Secundus portæ ramus inferiorem ventriculum petit,  
ibiq; per eius longitudinem secatur. Huc vero missi sunt hi venarū  
rami, vt illorum sanguine ventriculus nutriretur. neque enim nu-  
triri chylo posset vnquam vētriculus, quod crassus nimium existat, 30  
omneq; excrementorum genus in se contineat. excrementis autem  
ali nulla pars corporis potest: lienem tantum excipio, qui atrabila-  
rio humore alitur. Tertius portæ ramus ad omētum alendum per-  
git, ibiq; varie scinditur. Quartus ad lienem se confert, vt sangui-  
nem melancholicum ab hepate ad ipsum deferat, estq; ramus satis  
insignis, & sub vētriculo fluit, quo loco natura multas illi glandulas  
substrauit, easq; vnā, ne corpora vertebrarum attingeret: ne ue hic  
comprimeretur, sursum attollitur, splenisq; longitudinem secat,  
eamq; ingreditur. Ab hac autem vena alia exoritur exigua in ali-  
quibus, in alijs maior, atque adhuc in alijs maior. hæc superius vē-  
triculi



tricoli orificium versus scandit, atque hic finem habet. Illud sciendum hanc quandoque adeo in altum non ascendere. Vfus eius est, vt humorem acidum suscipiat, qui in liene gignitur, dum nutritur, atque huc demandatur, vt in nobis famem excitet, quo cibum capiamus, cuius multis sæpe, magnisq; negotijs præpediti obliuisceremur. Quocirca quibus vena hæc exigua est, hi facilius inedia ferunt: quibus vero maior, minus ferunt. Immo nonnullos inuenias, qui si edendi tempus, quanuis minimo interuallo præreant, in syncopim incidunt. Quintus portæ ramus ad intestinum colon demittitur. Sextus, qui omnium est maximus, ad intestina gracilia. Septimus ad rectum intestinum; atque hi præcipui sunt venæ portæ rami. Ex quibus tres illi, quos ad intestina ferri diximus, cum in mesenterium peruenere, in mesaraicas dictas venas innumeras, ac pene infinitas scinduntur; quæ intestina nō modo amplectuntur, sed etiam ad internam vsque cavitatem perforant: quo loco natura sagax extremæ unicuiq; harum membranam apposuit, qualem in vesicæ cavitare extremis vteris apposuit: quæ lotio ad vesicam descendenti aditum præbent, prohibentq; ne ad superiora amplius reuertatur. Idem in extremitate harum mesaraicarum, quas innumeras diximus, effecit natura. Quod à nemine, quod sciam, adhuc animaduersum est: licet omnes vno ore dicant factas fuisse mesaraicas, vt chylum ab intestinis exurgerent: in eo tamen parum diligentes fuere, quod finem earum persequi neglexerint: vt magnam naturæ industriam facile perspicerent: quanta scilicet arte effecerit, vt hæ venæ chylum facile suscipere possent. ne autem egrediatur, membranulæ illæ prohibent. Est autem chylus cōuersio cibi, potusq; in materiam lacti persimilem, qui posteaquam vetriculum prætergressus est, per intestinorum anfractus traditus descendit, donec exugant quidquid est succiplenum. & quoniā huic muneri neque quatuor, neque decem venæ sat erant, eas natura innumerabiles genuit, atque hæ in superioribus intestinis multo ampliores, ac frequentiores existunt. descendentes autem sensim rariores, minoresq; euadunt. neq; enim tanta erat in vltimis intestinis necessitas, quoniam chylus in fæces, (hoc est in durum excrementum) iam redactus erat. Adhuc describendus est ramus alius, qui tamen inter venæ portæ ramos connumeratur; at ab eo originem ducit, qui lieni dicatur: qui parte læua per mesenterion descendēs extremum rectum intestinum petit, venasq; gignit hæmorrhoidales, quibus duntaxat potest à melancholico humore vindicari. Atque hæc de venæ portæ origine, atque descriptione facti sunt. Vfus vero tum

famem excitandam deferens.

Quamobrem aliqui facilius, aliqui difficilius famem ferant.

Qui pro diuturniore fame in Syncopim incidunt.

Quintus venæ portæ ramus ad intestinum colon.

Sextus ramus omnium maximus ad gracilia intestina.

Septimus ad rectum intestinum.

Singulas venas cavitatem intestinorum ingrediens singulis membranis operientibus esse præditas in extremitatibus. Quod nemo adhuc cognouit.

Quid sit chylus.

Quo pacto chyli distributio fiat.

Quare venæ in superioribus intestinis plures, ac maiores constitutæ sint.

Hæmorrhoidales venæ.

Venę portę eiusq;  
ramorū ulus est  
chylum ad iecor-  
is cauū deferre.

Bilis vtriusque ge-  
neratio, & sepa-  
ratio.

Venarum duplex  
vſus.

Quę venę sangui-  
ficādi virtute ca-  
reant.  
Gal. error.

Omne alterans in  
ſui colorem alte-  
randum alterat.

Omnia cibaria à  
uentriculo alba  
reddi.

Teſtes ſanguinem  
cōuertūt in albū  
ſemen.

Mammillas com-  
mutare ſanguinē  
in lac.

Vena concaua chy-  
lis, & magna di-  
cta

Quid ſit vena

Omnes corporis  
partes ſanguine  
ali.

ro tum venę portę, tum ramorum eius eſt, vt chylum ad iecoris cō-  
cauū deferat, ac per eius ſubſtantiam diſpergat, vt ab ea coqua-  
tur, & in rubrum ſanguinem, qualis ipſa eſt, conuertatur. qua in  
coctōne duo gignuntur excrementa, bilis inquam tum citrina, tū  
atra. Ex quibus flaua bilis, cum ſit igni ſimilis, à veſicula, quam in  
Iecoris concauo natura locauit, ſuſcepta eſt. ſed melancholicus ſuc-  
cus per quartum ramum demiſſus eſt ad lienem, vt nutriatur. Et  
quamuis ob chylum deferendum hę venę genitę ſint, tamen fuit  
alius inſuper vſus non minus neceſſarius, vt ſanguinem ſcilicet de-  
ferrent, qui meſenterio, ventriculo, inteſtinis, omentoq; alen-  
dis eſſet. Sed illud adnotes velim hiſce venis ſanguificādi virtutem  
nequaquam adeſſe, vt Galeno placuit quarto de Vſu Part. meę au-  
tem ſententię is facile ſubſcribet, qui tenuem venarum tunicam,  
albamq; ſubſtantiam diligenter animaduernerit. Quo enim pacto  
ſua ipſarum tenuitate, atque albedine chylum album, craſſumq; in  
rubrum, tenuemq; ſanguinem verterent? Cum præſertim illud na-  
tura comparatum ſit, vt vnumquodq; corporis noſtri membrum,  
quum aliquid conuertit in ſui ipſius colorem tranſmutet. Iccirco  
ventriculus, licet alba, rubra, flaua, viridiaq; & aliorum colorum  
dapes eſitemus, nihilominus in colorem vnum; eumq; cādidiffimū  
omnia conuertit; idq; propterea quòd is eſt ſubſtantię ſuę color. 20  
Ita in teſtibus cōſpicaberis, qui rubrum ſanguinem, quod albi ſint,  
in album colorem conuertunt. ita & mammillę ſanguinem rubrum  
in album lac tranſmutant. In parte vero iecoris gibba, vbi maio-  
rem, craſſioremq; ſubſtantiam eius videre eſt, vena enaſcitur,  
quę concaua dicitur, chylis, magnaq; eſt enim aliarum omnium  
noſtri corporis venarum mater. huic varię ſunt radices craſſę, &  
magnę, quę in huius ſubſtantiam à ſummo ad imum inferuntur, quę  
amplam, quam diximus, venam tandem conſtituunt: ſupra caput  
verſus, infra ad pedes extenditur, & vt ita dicam, ramificatur. 30  
Huic eidem venę fluminis quoque ſimilitudo accōmodatur. quem  
admodum enim è flumine riuulos manantes ſępe videmus, ita  
complures riuuli ab hac vena deriuantur, ſeu varii ab hoc trunco  
rami, qui quidem per vniuerſum corpus panduntur, vt ſanguinem  
iam à iecore paratum, atq; elaboratum deferant. Nam venę nihil  
aliud ſunt, quàm vaſa concaua ex tenui quadam ſubſtancia conſtata,  
vt ſanguinem ad ſingula membra deferant, fabrefacta: nam ſanguine  
alitur omnis pars noſtri corporis. Sed ad rem redeamus. Hęc  
vena concaua dum ſupra iecur caput verſus aſcendit, tranſuerſum  
ſeptum perforat, quo loco diſtat à corporibus vertebrarum, eoq;  
loco

10

20

30



- loco duas emittit venas, quæ in ramos scissæ per ipsum diaphragma distribuuntur. quod postquam effecit, vena caua immediate fere dextræ cordis auriculæ occurrens panditur, cum hac connectitur dextri cordis ventriculi orificium superficietenus vndiq; complexa: neque in illum intro fertur. Quo loco venam parit, quæ cor circumdat, ramificatur, atque illud coronæ instar amplexatur. Propterea vena coronalis appellatur. Caua vena ascendens versus caput supra pulmonem scilicet fertur, ibiq; à vertebra distat, & supra cor non exiguo intervallo (non prope cor, vt Galeno visum est secundo de ratione vict. in acutis) *ἀξον. i.* venam sine pari, ac cõiuge nuncupatam parit, quæ quanuis in dextro sit latere, tamen è media parte, siue ex centro concauæ venæ initium sumit; quæ reflectitur iuxta corpora vertebrarum, & vsq; ad extremum thoracem descendit; sed per intervalla costarum dextra, læuq; suos mittit ramos earum partium nutriendarum gratia. & licet in dextro sit latere truncus, tamen sub pulmone, œsophago, magnaq; arteria ramos ab eo trunco exortos ad sinistram partem alendam dimittit. Ab eodem dextro trunco, dum reflecti incipit: ramus alius exit, qui sursum ascendens ramos mittit superioribus interuallis supremarum costarum alêdis dicatos; neque solum in dextris, sed in sinistris quoque; aliquos tamen excipio, sed per paucos, quibus sinistra parte ramulus adest ab axilla ortum ducens, qui nunc ad duo, nunc ad tria costarum intervalla, & quandoque ad vnum duntaxat deferretur. Ex hisce venis omnibus intervalla nutrientibus aliæ oriuntur venæ, quæ inter vertebram, & vertebram ingrediuntur; vbi adsunt foramina ob neruorum exortum. alunt autem hæ venæ spinalem medullam, & vertebra: deinde foramen ingrediuntur, quod post vertebrarum corpus situm est. Ab his, anteaquam spinalem ingrediatur medullam, vt eam nutrant, ad dorsales musculos, & ad cutim venæ mittuntur. Supra venam sine pari ascendit caua super asperam arteriã vsque ad iugulum recta: atque ibi duas magnas emittit venas axillares dictas, quod sub axillam transeant, quæ thoracis cauitatem inter iugulum, & primam costam prætereunt. Deinde ex se venam promit humeralem, vel cephalicam, & capitalem dictam, quæ tamen summum humerum non ascendit: sed potius ad internã regionem deferretur, inter primumq; & secundum humeri musculum transiens ad externa tēdit, ibi superficialia efficitur: nam vbi membranam carnosam præterijt, inter hanc, & cutim ad cubitum vergit, delata extrorsum prope primum musculum, qui cubitum flectit; apud cuius flexuram in duos ramos secatur, quorum alter internum cubitum

Coronalis vena cordis.

Venæ sine pari exortus.

Venæ intercostales.

Venæ à vena sinè pari ad sinistram latus alendum demissæ.

Venæ vertebrae, ac spinalem medullam nutrientes.

Axillares venæ.

Venæ cephalicæ, humeralis dictæ origo.

Quo loco cephalica cum basilica uniatur.

Venæ communis vera constitutio.

Error Arabum, de venæ saluatellæ sectione in lienis affectibus.

Venarum in foeminis in axillis nutrimentum exortus.

Vena basilica, iecoraria, hepaticaque dicta, interna ab Hip. appellatur.

Vena communis quare dicta. Mediana vena.

Prope humerariam venam minime, verum prope basilicam esse neruum.

Vena in capitis affectibus secari solita.

Duarum magnarum venarum ductus.

cubitus petit, & ubi à flexura eius discessit, cum alio id genus basilicæ ramo vnitur. ex quibus duabus fit vera communis vena. alter vero ramus humerariæ in externo cubito superius & exterius ramulos quidem multos propagat: sed tandem præcipuus ramus supra brachiale, extremamque manum inter minimum digitum, & anularem tendit, atque hic diuisus ad vtrumque digitum fertur ad summum usque ipsorum. Hanc venam tum Arabes, tum qui praxim exercent fere omnes saluatellam nuncupant, cuius sectionem in affectibus lienis mire aiunt prodesse. Sed quantum missio sanguinis è saluatella in splenis morbis auxiliari possit, ego sanæ mentis lectori iudicandum relinquo. Posteaquam axillaris vena è cavitare thoracis emerfit, & quam dixi, venam genuit, sub iugulo apud Anchiroidem scapulae processum profunde immergitur: quo loco ramos complures profert, qui primum brachij musculum enutrient; neque hunc solum, sed scapulae secundum, secundum quoque thoracis, quartumque, & septimum humeri, & scapulam ipsam, & usque ad abdomen. Præter hos in foeminis alij rami ad mamillam alendam se conferunt. Hæc axillaris vena ad humerum delata sub primo musculo cubiti flectente, tres in venas, atque illas insignes diuiditur, quarum una basilicam dicunt iecorariam, hepaticam ve. Hippocrates cubiti internam vocat. hæc, quam altius penetrare diximus, fit sensim superficialis, & extremo humero accedit: ac ubi cubitus flectitur, humerariæ instar in duos diuiditur ramos, quorum vnus interno cubito cum humerariæ ramo vnitur: quo loco efficitur communis vena. communem autem dicunt, quod vtriusque venæ sit particeps. qui illam constituunt rami medianæ appellatur, quos semper fere vulgo secant. Sed hic animaduertendum est, prope humerariam, atque eius medianam, neruum adesse nullum, quemadmodum prope basilicam. Alius ramus & ipse per exteriorem partem diffunditur, varieque coniungitur: nunc enim cum humerariæ ramo: nunc cum communi anastomosim efficiens: tandem vero supra brachiale, post brachialeque ramos mittit, tum ad medium, tum ad indicem. Alia superficialis vena, quæ communis appellatur medio, & interno cubito oblique supra radium fertur, varie scinditur, ramumque inter indicem, & pollicem, atque inter indicem & medium mittit, ac in ipsorum finibus cessat. Hunc ramum in capitis affectibus secare consueuerunt. Aliarum verum duarum magnarum venarum axillarum, altera profunde satis, quinque nervos subit: parumque abest, quin os humeri attingat; & ramulos emittit, qui duos musculos cubiti flectentes alant, deinde deorsum flectitur inter primum, ac secundum



secundum muscolum: & supra flexuram cum transijt, in tres secatur ramos: atque hinc ad internos cubiti musculos ramulos mandat: dein altius penetrans ad brachiale inclinatur. hi sub ligamento vbi ad manus volam peruenere, furculos promunt ijs musculis alendis dicatos, qui in extrema sunt manu, deinde singulis digitis venulas binas distribuunt, quæ à lateribus ad eorum extremitatem feruntur. alius autem ramus apud flexuram id ligamentum præterit, quod inter cubitum, ac radius positum est, & ad exteriores musculos distribuitur. Alia axillaris medio humero plus minus reflectitur ad  
 10 posteriore partem, ad duos musculos cubitum extendentes ramos relegans. Postmodum deorsum magis tendit ad muscolum longissimum, ad bicornem, nec non ad musculos, qui ab externo humeri tuberculo, ortum ducunt, atq; inter hos musculos disperditur. Eadem in regione sub iugulo, vbi est ortus axillarium, quatuor tenues venas exoriri videbis, easq; descendentes, quarum duæ descendunt sub osse pectoris, à partibus lateralibus penes costarum cartilaginem, hæ deorsum vergunt: Thoracemq; prætereuntes per rectos abdominis musculos descendunt, quæ in nonnullis mulieribus cum alia vena coniunguntur. quæ ex inferiore loco ad dictos musculos scandit.  
 20 Hæ inter quartam, ac quintam costam nunc altius, nunc declivius descendentes exteriorem in partem se conferunt, in viris anteriores musculos nutrientes, in foeminis autem non modo ob hoc, sed ob lactis quoque generationem cum in mammis dispersantur. Reliquæ duæ deorsum latæ supra concavum pulmonis iusta mediastinum supraq; pericardiū feruntur vnà cum nervis duobus, qui ad tendinem diaphragmatis feruntur. Altius aliquantulum emergunt quatuor iugulares venæ: ex quibus binæ internæ sunt, externæ reliquæ. Externæ supra iugulum immediate pullulant venæ ad muscolum epomida delatæ. & post scapulam truncus  
 30 per colli latera oblique assurgens ramulos mittit ad musculos capiti inseruientes, ac post occipitium sursum ad capitis cutem apud eam partem iugularis externæ, quæ reliqua erat: supra inferiorem maxillam se effert ante masseteram, & oblique per mediam faciem fertur ad maiorem oculi angulum: quosdam etenim ramulos ad faciei musculos distribuit, in angulum vero venam supra orbitam mittit, idq; per muscolum palpebram constringentem; & quod reliquum est, inter supercilia per frontem ad cutim capitis ascendit. Illud adnotabis dextram venam in quibusdam inter supercilia cum sinistra iungi, deinde rursus seiungi. Alia iugularis vena est satis insignis, quæ sursum attollitur versus calvaria basim p anteriora processuum trans-

Quatuor venæ ab axillarium venarum exortu ad ab dominis musculos tendunt.

Venæ quæ in viris anteriores abdominis musculos alit i foeminis vero etiam lac generant.

Venæ capitis musculis inseruientes ac in reliquis capitis, ac faciei partes se diffeminantes.

Venas superciliorum in aliquibus dextram cum sinistra iungi, si inuicem seiungi.

Venę iugularis ver-  
sus caluarię ba-  
sim procellus .

Vena musculos ,  
glandulasque la-  
ryngis nutrens .  
Vena quę in angina  
secatur .  
Vena quę ad durā  
matrē inferitur .

Venę cerebri sub-  
stantiam alentes .

Lirion, seu torcu-  
lar .

Vena mirabilem  
sinum cōstitues .

Venarum in durā,  
ac tenuem mem-  
branam cerebri  
ramificatio , ac  
in cerebri substan-  
tiam ingressus .  
Venas, ac arterias  
cerebri substan-  
tiam ingredi ne-  
mini hucusque  
cognitum .

uerforum vertebrarum colli penes asperā arteriā . Hęc, quam dixi-  
mus, vena sub larynga ramum profert notatu dignum , cuius ra-  
mulis glandulę musculiq; laryngis aluntur . Eadem vena sub inferio-  
re maxilla varie diuiditur, tamen minor est diuisio huius cum acced-  
dit ad glandulas, quę sunt sub aure, ad musculos hyoidis seruientes  
& ad linguam ipsam: idq; inferius . Medici iubent hanc secari in  
angina . reliquum venę tum ad Pharynga distribuitur, tum ad eam  
tunicam, quę os inuestit . Maior dictę venę truncus caluariam in-  
greditur per inęquale foramen, per quod sextum par neruorum ce-  
rebri descendit . Vbi vero ingressus est, ad posteriora conuertitur, 10  
atque in duram matrem immittitur . Verum suam secum tunicam  
portat: & per occipitium ad summum pene labdalis futurę ascen-  
dit: quo loco dextra cum sinistra iungitur: & quā dura mater du-  
plex efficitur à posteriore parte ad frontem ducitur parte suprema  
cerebri, in orbiculareq; foramē inferitur inter frontē & ithmoides  
situm parte capitis posteriore, vbi in vnum venę coibant, in durę  
matris quadruplicationem admittitur . Inde q; duę venę per vni-  
uersam superiorum ventriculorum longitudinem progrediuntur .  
huiusce ramuli cerebri alunt substantiam . Quadruplicatio autem  
durę meningis, quam supra memorauī: & lirion, & torcular appel-  
latur, iacetq; inter cerebrum, ac cerebellum . Vena vero per supe-  
riorem cerebri longitudinem vergens admirabilem sinum consti-  
tuit: nam supra semicirculum prę se fert, infra vero tres angulos ha-  
bet, qui hoc in loco nunc paulo ampliores, nunc arctiores sunt . va-  
rio se modo diffundit; eiusq; rami postquam duram membranam  
perforarunt, per tenuem lati nunc sursum, nunc deorsum varijs  
modis per illam totam ramificantur . at vbi tenuem prætergressi  
sunt ipsam substantiam cerebri ingrediuntur . quod dictum nō du-  
bito quin vobis nouum esse videatur; cum nemo istuc ipsum antea  
obseruauerit . Ego enim primus ( absit verbo inuidia ) obseruauī ve-  
nas atque arterias cerebri substantiam introire . sub hac substantia 20  
cerebri iugularis interna antequam cranium ingreditur, venulas  
per laterales partes ad musculos mittit temporales, in craneo vero  
ipso ad durę matris latera iuxta iugulum . Hęc vena, venam aliam  
paruulam parit dum ascendit per transuersos processus vertebra-  
rum ceruicis, ac ramulos emittit, qui ceruicis musculos alant: ea in  
aliquibus ab axillari exoritur . Vbi vero inter ceruicis vertebrae exe-  
unt nerui, hęc vena ad spinalem medullam ac vertebrae nutriendas  
properat: primam vertebrae eadem superequitat occipitium ver-  
sus, vbi foramen cernere est, quod ad auditus organum penetrat,  
edq;

10

20

30



eòq; ingreditur, vt hoc organum omne nutriat. Ab hac iugulari interna omnia ossa capitis, maxillæq; tum superior, tum inferior dentesq; omnes nutriuntur. Quare nihil est quod alium venæ peculiarem ramum describendum expectes, qui dentes ipsos alat.

*Venæ, capitis ossa, vtranz; maxillâ, dentesq; nutritis descriptio.*

Caua vena, postquam sub diaphragmate ab hepate tanquam à proprio exijt fonte, corpori vertebrarum dexteræ partis adhæret, quæ post exitum paulo infra hepar venulam ex sese procreat, quæ partes ibi adiacètes alit, & varie scinditur. Postmodum truncus deorsum inclinans duas venas, quas emulgentes dicunt, parit; quæ in

*Cauæ venæ ductus.*

10 renes terminantur. hæc solas semper esse caue existimes; in tres enim, quatuor etiam, & quinque nonnunquam diuisas esse comperies, licet hac de re scriptorum nullus adhuc meminerit. Sunt autè emulgentes tam in dextris, quàm in sinistris. Galenus longo verborum apparatu causas reddit, quibus natura dextram sinistra altiore voluerit esse. Sed cum sensus contrarium prorsus attestetur, omnes illius rationes protinus corruant, necesse est: cum ingeniosè potius, quam veræ existant. Equidem in brutis animantibus situm emulgentium venarum homini contrarium deprehendi; ita vt de brutis locutum fuisse Galenum tam perspicuum sit, quàm quod ma-

*Venas emulgentes in plures ramos scindi solitas à nemine animaduersum.*

*Galenum frustra i rationibus inueniendis de emulgentium situ laborasse quantum ad corpus humanum spectat.*

20 xime. Nos igitur hominis emulgentes venas describentes ita dicamus. A sinistra igitur parte cauæ venæ sub ventriculo scaturit vena ampla satis, & longa, emulgens dicta; quæ supra vertebrarum corpus, arteriamq; aorti fertur, per mediumq; sinistrum renem fluit (est autem is in homine nò parum dextero superior, & hoc ob lienis paruitatem) quæ illi non obstat, cum iecori magnitudo plus loci occupans dextrum renem cogat esse inferiorem. postea vero quæ ad renè peruenit eo, quo dictum est, pacto, eius corpus ingreditur. ibi amplificatur, atque in ramos secatur, qui per renis substantiam distribuuntur. Noli tamen existimare confici ex his cribrum illud magni

*Emulgentium venarum descriptio.*

*Renum situs.*

30 nominis, de quo Galenus tam multa: per quod lotium percolari existimabat: hoc vero dilatato sanguinem mingi. Hic natura membranas apponere poterat, quemadmodum mesaraicis, atque vterum finibus: sed, quoniam hoc illi commodius visum est; ex ipsa met renis substantia quasdam eminentias procreauit, quæ in dictos ramos ingressæ, obstant, quominus sanguis, qui ad renes vnà cum serosa parte deducitur, naturaliter delaberetur. Hoc tamen obseruato, quod est pulcherrimum: cum natura lapillus aliquis deorsum trudendus est, id plerumque tanta vi fieri, vt magnam vim sanguinis cum vrina demittat. vsus harum venarum est, vt sanguinis serui, & pro renibus nutrimentum deferant. Ab huius venæ concauo vas

*Cribrum ab alijs fictum in renibus non dari. Galeni error.*

*Qui lapillus è renibus ad vesicam deorundatur. Emulgentium venarum vsus.*

Vrinarium vas vre-  
ter appellatur.

Veng feminalis or-  
tus.

Falsa opinio ali-  
quorum de ratio-  
ne ortus semina-  
riæ venæ.

Quamobrem non  
à caua venâ, sed  
à sinistra emulge-  
te feminalis fini-  
stra oriatur.  
Dextrâ feminalē  
à caua nasci.

Differentia vena-  
rum feminalium  
inter virum, &  
mulierem.

Venæ caux i quar-  
ta lumborum ver-  
tebra i duas scin-  
ditur partes.

Distributio veri-  
usque rami caux  
venæ ad inferio-  
res partes.

oritur, vreter idest vrinarius dictus; vt proprio loco fufius dicitur. oritur inquam in ipfius renis corpore: hic vrinam fufcipit, & ad veficam fert. In dextra parte eadem emulgēs fita est finiftra inferior, & breuior multo; nam inter cauam venam, & dextrum renem parum quid intereft: inferitur autem eo pacto, quo in finiftra dictum est. Oritur à finiftra emulgente vena feminalis nuncupata, quæ oblique sub peritonæo descendens fupra os pubis deducta in testiculum inditur: quemadmodum apertius explicabitur, vbi de partibus genitalibus agemus. fed interim diligenter adnota ortum feminaræ venæ ab emulgente non effe, vt humor ferofus ad finiftrum testiculum deferretur, quo maiorem in coitu voluptatem pareret, ficuti plariq; anatomici in hoc parum prudentes credidere: fed vera caufa est ipfa venæ exiguitas, quæ fi ex venæ caux corpore emeriffet, vt dextra, quoniam illi fupra arteriam tranfeundum erat, periclitabatur, ne in magnis dilatationibus, ita vt fit, difrumperetur. quocirca prudens natura non à corpore venæ caux, fed à finiftra emulgente finiftræ feminalis originem trahi voluit. at sub dextra emulgente apicis duorum digitorum interuallo ab ipfo venæ caux fonte effluit vena feminalis dextera, quæ primo oblique descendit: deinde sub peritonæum fertur: deinde fuper os pubis: poftremo in testiculum definit: quod in viris intelligas oportet: fecus enim contingit in mulieribus. licet enim origo fit eadem, & finis, tamē longitudo non est tanta, neque summum ofsis facri præterfluit: & in abdomine cessat. Illud vero magis miraberis sub feminali dextera ad quartam vſq; lumborum vertebam nullam venam mitti ad fuperiora, fed ad inferiora duntaxat. à iecore namq; ad hunc vſq; locū, inter vertebbras, vbi exeunt nerui, vena caua venas profert, quæ tum fpinalem medullam, tum vertebrarum corpus nutriant. Quum primum autem ad quartam vertebam lumborum caua peruenit, in duos inſignes ramos diuiditur, qui oblique fuper os ilij, pubisq; delati ad dextrum, ac finiftrum crus iter habent. A qua diuifione primo venæ fatis magnæ oriuntur, quæ deorfum latæ, primo verſus anum fe conferunt: vbi namq; illa adhæſit ofſi facro, ramos per ipſius foramen transmittit ad fpinalem medullam, ad ipſum os ſacrū & ad mufculos in lumbis ſitos, qui ab hoc ſacro originem ducunt. mittit inſuper ramos ad natium mufculos, qui femori deferuiunt. Ab iſſdem ramis venæ illæ proficiſcuntur, quæ in extremum rectū inteſtinum implantantur. Ab hac eadem vena prodeunt illæ venæ, quæ ad veficæ latera proficiſcuntur, vt ipſam, mufculosq; recto inteſtino deferuientes enutrient; idq; in viris; nam in ſœminis petunt ceruicis

10

20

30



- cervicis vteri principium . ex quo loco menstruæ illis effluunt purgationes , vt latius capite de vtero explicabimus . Idem ramus , qui vesicam; vteri cervicem alit . & ipsa nonnunquam principalis diuissio venam gignit , quæ descendit , deorsumq; lata eo foramine excipitur , quod in osse pubis , coxendicisq; collocatum est : & ad nonum , decimumq; musculum femur circumagentes se recipit : vt eos nutriat . deinde ad septimum , deorsumq; per internum femur spargitur , & terminum habet . Animaduertendum tamen est vasa seminaria in mulieribus non finiri in testium capite ; sed deorsum effundi , vt matricis substantiam alant . Ab his venis ortum ducit vmbilicalis vena , cui nostræ generationis exordia accepta ferenda sunt . Eadem venæ cauæ diuissio duas parturit venas dextram inquam , & sinistram , quæ sursum caput versus reflectuntur . Progressus earum est inter peritonæi diuisionem , supraq; id sub rectis musculis ad secundam vsq; ipsorum intersectionem in ramos , ac ramulos degenerantes distribuuntur dictis musculis peritonæoq; alimentum ferentes . Hæ sunt illæ venæ , quarum ope ( vt magnus Hippocrates , & post eum Gal . scriptum reliquere ) tantus est vteri cum mammis consensus in mulieribus : quas quandoq; inuenies cum illis duabus venis vniri , quæ deorsum descendentes sub sternum collocantur in rectorum musculorum sine . in quibusdam parte vna duntaxat , aut duabus ramulo perexiguo coniunguntur . Illud vero reticere nullo pacto possum , me in nonnullis mulierum cadaueribus quacumq; diligentia adhibita , nunquam tamen harum venarum vnionem inuenire potuisse . Hoc insuper assero , has non proficisci ab vtero , sed ab ea diuissione , vbi eius venæ oriuntur , quæ nõ ad vteri substantiæ alendæ dicatæ sunt , sed cervicem illius nutriunt . Per eas menstrua expurgantur : quemadmodum sæpenumero vidi hisce oculis in aliquibus mulieribus , quæ violenta morte periire , dum adhuc illis menses fluere . neque in his modo , sed etiam in alijs quibusdā quibus instabant , & mox fluxuri erant , idq; præsertim Pisis accidit , dum mulierem eiusmodi in publico Theatro secarem . aderat discipulorum , ac doctorum magnus numerus . mulieri , cuius anatomē profitebar ; Sanctæ nomen erat , quæ cum ante mensem geminos peperisset , eosq; miseros vix in lucem proditos luce priuasset , ac suffocasset : eā iusti iudices suffocandā iusserunt . nam vt inquit poeta ille ,

Non est lex iustior vlla ,

Quàm necis artificem arte perire sua .

In hac igitur muliere Sancta nomine , reuera autem demoniaca potius , & venefica , huiusmodi venæ , quæ in alijs non admodū magnæ esse

Ex quo loco menstrua egrediatur.

Vasa seminaria in mulieribus quomodo constituta sint .

Venæ vmbilicalis ortus .

Venæ duæ peritonæum alentes .

Venæ per quas cōpatitur vterus cū mammillis .

Per quas venas menstrua purgantur .

Membrana cordis  
inuolucrum ap-  
pellatur.

Diafoles & systo-  
les cordis mo-  
tus.

Pericardium.

Humor aqueus in  
pericardio.

*ne exsicce-  
tur*

*Suius aquei pulsi-  
mum Galenus nisi  
lib. 8. de locis affectis,  
cap. 1. agens de tra-  
mbe et palpiratione  
cordis.*

Curtij Papiensis  
hesitatio.

Cordis alia a peri-  
cardio propria tu-  
nica.

Cordi pinguedo.

Gal. & Arist. fal-  
sa opinio.

Portius Neapoli-  
tanus Aristotele  
defendens expe-  
rientia victus.

Pinguedinis vsus.

Cordis humani fi-  
gura.

Cordis substantia.  
Cordis fibræ.

Corn non est mu-  
sculus vt Hippo-  
criti placuit.

uorum, aut venarū principiū esse. situs cordis in homine est in tho-  
racis cauitate: isq; obliquus, & si in brutis rectus existat; in homine  
supra septum transuersum iacet, & illud tangit: sed in brutis nō pa-  
rum distat. basis eius est tantum non in dextro latere; at cuspis fini-  
strorsum. membrana inuoluitur satis crassa, nerueaq; , quam cordis:  
inuolucrum appellant: cuius vsus est, vt cor contineat, colligetq; ,  
ne decidat, neue os pectoris, costasq; , dum mouetur attingat. Ap-  
pellant autem cordis motus, tum diafolem, tum syfolem, quod  
scilicet & dilatetur, & constringatur. Pericardiū igitur hoc, quod  
diximus, à corde aliquantulum distat. quo loco aqueum quendam 10  
humorem natura collocauit: vt eo cor humectaretur; periculum et-  
enim imminebat, ne absq; hoc præsidio ob frequētes, ne perpetuos  
dicam, ipsius motus, qui etiam nobis fiunt inuitis, cor exsicce-  
retur. quem humorem non modo in uiuentibus, sed in mortuis quoq; de-  
prehendes: licet de hoc Curtius Papiensis dubitauerit; at ego hoc  
ita esse, non semel, sed sæpius in publicis, priuatisq; viui canis le-  
ctionibus aperte ostendi ita, vt nullus amplius dubitationi locus re-  
linqueretur. Hoc inuolucrum, indumentumūe in homine septi  
transuersi tendini valide cohæret. Scito præterea cor præter inuolu-  
crum, quod dixi, propria tunica præditum esse, quæ ipsius substantia 20  
tiam immediate contingit. sed inter cor, & pericardium non parua  
oritur pinguedo, quæ manifeste conspicitur, & cordi adhæret: quæ  
uis Aristoteles, & Galenus asserant, neque circa cor, neque circa  
aliam quamuis calidā particulam pinguedinem vllam nasci. Dice-  
bat autem Portius Neapolitanus Physicus, qui in Aristotelis verba  
nimis iurauerat: hanc, quam diximus, pinguedinem circa cor pin-  
guedinem nullo pacto esse: huius rei testimonium locupletissimum  
esse, quod ipsa non eliquatur. Ego vero in theatro, dum Pisis pu-  
blice profiterer, nihil respondens pinguedinem eandem candelæ, 30  
quæ præstabat, eliquaui. quo viso cum mutire amplius nō auderet,  
tacitus abiit, ac pene explosus. Erat autem ob continentem motū  
pinguedo ibi valde necessaria; itaq; pinguedinem in compluribus  
corporis nostri partibus cernimus, præsertim circa oculos, tempo-  
ralesq; musculos, ne partes exiccentur. Humani cordis figura py-  
ramidem prorsus nō præ se fert, quemadmodum in brutis; sed de-  
pressum est potius cor in homine. eius substantia dura admodum,  
densaq; est, eiusmodiq; facta est, vt ne in validis motibus disrumpere-  
tur. Tribus generibus fibrarum cor præditum est, hoc est rectis,  
obliquis, & transuersis, vt & traheret, & contineret, & expelleret.  
nullo autem pacto potest cor inter musculos connumerari: quam-  
uis di-



uis diuinus Hippocrates in libro de corde ipsum muscolum esse dicere non erubuerit. Vndiq; vena coronali circumdatur, vt eius sanguine alatur: cui arteria coronalis quoque dicta se fociâ præbet, & nonnunquam binæ: idq; vt eius ope substantia vitalis caloris viuificetur. quare dubitare aliquis posset, atque ex dictis argumentum elicere satis validum, non in corde, sed in pulmonibus vitales spiritus gigni. Ego vero magnis philosophis huiusmodi difficultates discutendas relinquo: mihi etenim satis fore puto, si partes corporis quomodo se habent, earumq; vsum, quantum in me erit, vere descripsero. sed, vt ad cordis historiam redeamus: Duæ insunt cordi cauitates, hoc est ventriculi duo, non tres, vt Aristoteli visum est. ex his alter à dextris est, à sinistris alter: dexter sinistro multo est maior. in dextero sanguis adest naturalis, at vitalis in sinistro. illud autem obseruatu perpulchrum est, substantiam cordis dextrum ventriculū ambientem tenuem satis esse, sinistram vero crassam: & hoc tum æquilibri causā factum est, tum ne sanguis vitalis, qui tenuissimus est, extra refudaret. Inter hos ventriculos septum adest, per quod fere omnes existimant sanguini à dextro ventriculo ad sinistrū aditum patefieri. id vt fiat facilius, in transitu ob vitalium spirituum generationem tenuem reddi. sed longa errant via; nam sanguis per arteriosam venam ad pulmonem fertur, ibiq; attenuatur; deinde cum aere vnā per arteriam venalem ad sinistram cordis ventriculū defertur: quod nemo hactenus aut animaduertit, aut scriptum reliquit: licet maxime sit ab omnibus animaduertendum. Præter hæc omnia, quæ hactenus dicta sunt, adsunt quoque circa cor duæ aliæ particulæ, quas auriculas vocant, quæ tamen auditus sensui nullo pacto sunt dicatæ. Sunt igitur eminentiæ binæ, membranosæ, anfractuosæq; ex quibus altera dextra est, sinistra altera; & rursus altera maior est, altera minor; rursusq; harum altera ad cauam venā, altera ad arteriam venalem apposita est. harum igitur auricularum in cordis motibus non paruus est vsus. ne scilicet dum cor mouetur, vena caua, venalisq; arteria, quæ ipsa quoq; venarū instar, disrumpetū, cōstructa est: nimis enim quādoq; sanguine opplētur. Circa cordis basim, quæ lata admodū est, quatuor vasa conspicua sunt: duo ad ventriculū dextrum, duo item ad sinistrum: in dextero est vena caua, venaq; arteriosa; at in sinistro adest arteria ahorti, & arteria venalis. Neque tamen existimes id, quod multi sunt opinati; venam cauam hinc exoriri, vt iam dictum est in tractatu de venis. illa enim cor non ingreditur, vt falso arbitrantur; sed cum scissa sit eo loco, lataq; dextri ventriculi orificio duntaxat adhærescit. Vena

Cor coronalis  
venæ sanguine  
nutritur.  
Coronalis arteria.

Cordis ventriculi  
duo, nō tres sunt.  
Indextro corporis  
ventriculo sanguis  
naturalis, in sinistro  
vitalis continetur.  
Substantia vtriusque  
cordis ventriculi.

Cordis septum.  
Vitalis spiritus generatione  
nemini adhuc animaduertit.

*sanguis attenuatur in pulmone*

Cordis auriculæ.

Auricularum cordis vsus.

Quatuor in cordis basi vasa.  
Vena caua.  
Vena arteriosa.  
Arteria ahorti.  
Arteria venalis.

Vena caua cor non  
ingreditur.

Vena arteriosa à  
- iecore nō a cor-  
- de oritur.

Quare vena arte-  
- riosa dicatur.

Arteria ahorti ar-  
- teriarū omnium  
- mater.

Arteria venosa  
- quare dicatur.

Anatomicorū opi-  
- nio erronea.

Diversa à cæteris  
- anatomicis de ar-  
- teria venali sen-  
- tentia.

na item arteriosa non à corde oritur, sed à iecore. quod verum esse facile perspicies, si animaduverteris. nam, dum in vtero matris fœtus latitat, si eius introspiciamus, comperiemus cauam venam cum vena arteriosa continuam esse. Igitur quatenus vena, ab hepate ortum ducit: at quatenus arteriosa, ex corde; est enim cor arteriarū omnium principium. Hæc ad pulmonem incedit, vt ad illum sanguinem ferat, quo nutriatur, quemque pro corde alteret. Vena arteriosa hæc, quam diximus, magna est satis; immo vero multo maior quàm necesse fuerit: si sanguis ad pulmones supra cor exiguo intervallo deferendus duntaxat erat. Diuiditur duos in truncos tū ad dextrum, tum ad sinistrum pulmonem; deinde varios in ramos, quemadmodum tunc dicemus, cum de pulmone agemus. Verum enimvero vena illa, quam diximus, seu membrana euanescit post infantis egressum ab vtero: idq; propterea quòd incipit cor suum officium præstare. Arteria ahorti, quæ est aliarum omnium arteriarum mater, à sinistro oritur cordis ventriculo, sursumq; assurgit. Sed antea quàm huius arteriæ iter persequamur, de arteria venosa dicendum videtur, quæ sinistro vetriculo apposita est. Dicitur autem arteria quoniam spiritibus, arteriosoq; sanguini deseruit; at vena etiam appellatur eo, quòd venæ corpus, hoc est substantiam habet. vas est satis insigne, quod per pulmones instar venæ arteriosæ difficatur. Scribunt Anatomici in hoc (pace eorum dixerim) parum prudentes harum vsum esse, vt aerem alteratum ad pulmones ferant, qui stabelli instar ventulum cordi faciunt, idq; refrigerant, non cerebrum, vt Aristoteli visum est: existimantes ijdem eas tunc fumos nescio quos capinosos (ita enim ipsi vocāt linguarum ignoratione) excipere à sinistro ventriculo profectos. quod commentū non dici posset, quàm ipsis placeat; quippe qui certo existimant in corde ea fieri, quæ in caminis affolent; quasi in corde viridia ligna existant, quæ dum cremantur, fumum edant. atq; hæcenus de harum vsum iuxta aliorum Anatomicorum sententiam. Ego vero oppositum prorsus sentio: hanc scilicet arteriam venalem factam esse, vt sanguinem cum aere à pulmonibus mixtum afferant ad sinistrum cordis ventriculum. Quod tam verum est, quàm quod verissimū; nam non modo si cadauera inspicias, sed si viuā etiam animalia, hæc arteriam in omnibus sanguine refertam inuenies. quod nullo pacto eueniret, si ob aerem duntaxat, & vapores constructa foret. Quocirca ego illos Anatomicos non possum satis mirari, qui rem tam præclarā, tantiq; momenti non animaduverterint: quanuis præcellentes haberi velint: immo vero à compluribus sui similibus habeantur.



beantur. Sed illis hoc satis est Gal. dixisse quasi Pythagoræ discipulis. Quid? quod aliqui nostro tempore in Galeni Placita de anatome iurarunt; vt hoc audeant affirmare, Galenum Euangelistæ more suscipiendum esse, nihilq; in eius scriptis esse non verum. mirumq; dictu est hoc dicto quantopere se efferant, ac Anatomi staru principes popello iacent. quod quàm sit reprehendendum nemo nõ videt. etenim quis est qui nunquã offendat? sed de his satis superq;. Obseruandum est itaque orificio quatuor vasorum, quæ sunt ad cordis basim, vndecim membranas astare, quæ trifulcæ, vel tricuspidæ appellantur: tres inquam ad cauam venam, tres item ad venam arteriosam, tres ad arteriam ahorti dictam, duasq; ad arteriam venalem: quarum figura non est eadem: nam quæ ad venã cauam, & arteriam venalem positæ sunt: diuersa sunt forma à membranis magnæ arteriæ, & venæ arterialis; hæ namq; instar trium literarum, quæ C à Latinis dicuntur; aliæ verò sunt instar sagittarum. admirabilis autem harum vsus est; & ipsæ sunt: quarum ope multa discimus ex his, quæ ad cordis, & pulmonum vsus cognitionem spectât. scito etiã quemadmodum harum figura varia est, ita vtilitatem diuersam esse. Ostiola itaq; cauæ venæ, necnon arteriæ venosæ ab interiore situ foras feruntur, vt sanguinis emissioni seruiant: aliorum vero duorum vasorum ostiola cõtra ab exteriori intro vt ad inclusum sanguinem continendum facta esse uideantur. Illud insuper adnotato ea ostiola, quæ intus foras panduntur, quibusdam filamentis referta esse hæc, illacq; per uentriculos dispersis: quæ propterea facta sunt, ut ipsas contineant, firmentq;. quibus forte deceptus est magnus Aristoteles, qui filamenta hæc, quæ dixi, neruos esse opinatus est; hincq; factum est, ut Aristoteles cor neruorum principium esse scriptum reliquerit, & per consequens sensus, motusq;. sed, ut ad supradicta quatuor uasa redeamus: duo ex his cõstructa sunt, ut intro ad cor deferant; hoc autem euenit dum cor dilatatur; duo uero alia, ut, dum cor constringitur, foras deferant. iccirco quando dilatatur, sanguinem à caua uena in dextrum uentriculum suscipit, necnon ab arteria uenosa sanguinem paratum, ut diximus, unã cum aere in sinistrum. propterea membranæ illæ demittuntur, ingressuiq; cedunt: nam dum cor coarctatur, hæ clauduntur: ne quod susceperunt, per easdem uias retrocedat: eodemq; tempore membranæ tum magnæ arteriæ, tum uenæ arteriosæ recluduntur; aditumq; præbent spirituoso sanguini exeunti, qui per uniuersum corpus funditur, sanguiniq; naturali ad pulmones delato: res itaq; semper habet, cum dilatatur, quas prius memorauimus,

Fieri potuisse ut etiam Galenus falsus sit nec omnia nouerit.

Membranæ trifulcæ, & tricuspidæ appellatæ in orificio quatuor cordis vasorum vndecim.

Vndecim membranarum vsus.

Cordis filamenta, pro neruis ab Arist. habita. Quamobrem Aristoteles cor principium neruorum statuerit.

Quatuor vasorum vsus.

Sanguinem in dextrum cordis ventriculum ingressum non retrocedere in cauam venam.

Nervus membranam cor inuolucem ingrediens.

In hominis corde os non reperitur cum tamen in brutorum inueniatur.

Galenus error.

Quod in hominis corde reperitur non os sed portio quædam cartilaginis.

A corde arteriæ, iecore venę, cerebro nervi nascuntur.

Ahorthi arterię exortus.

Arteria non per se sed à spiritu mouetur.

Coronalis cordis arterię origo.

Coronalis cordis arteria aliquando gemina.

Diuiditur arteria ahorthi in duos truncos.

Ascendentis trunci distributio.

Axillaris sinistra arteria.

Trunci axillaris arterię distributio.

recluduntur clauduntur reliquæ. itaq; comperies sanguinem, qui in dextrum ventriculum ingressus est, non posse in cauam uenam retrocedere. ex hac doctrina collige cor nullo pacto id membrum esse, in quo sanguis gignatur; quemadmodum sensit Aristoteles; cum à uena caua sanguis distribuatur. estq; hoc admirabile, maximaq; arte fabricatum. ad membranam autem cordis substantiam inuoluentem peruenit neruulus à sinistro recurrente neruo profectus. Hoc insuper velim certo scias nullum os in hominis corde inueniri: quamuis in bobus, bubalis, equis, atque id genus magnis animantibus osseum nescio quid ostendatur; quod in nobis neutiq; est. sed substantia duntaxat radicis magnæ arteriæ uenâ arteriosam uersus, quæ cartilaginea uidetur: licet os nullo pacto appellari queat, quicquid Galenus dicat, qui ridendus in hoc est, dum ueteres ridet, qui os cordis non describere: quod iudicium ipsi maxime faciendū erat. Hoc uero axioma in anatome existimato arterias omnes à corde proficisci, quemadmodum ab hepate uenas, necnon à cerebro neruos. A sinistro itaq; cordis uentriculo exoritur arteria illa, quam ahorthim uocant, aliarum omnium arteriarum mater, quæ satis magna est. substantia uero tum crassa, tum alba; crassa quidē primo ne sanguis spiritu refertus facile euanesceret, deinde ne suis in motibus disrumperetur; mouetur enim arteria continuo nō per se, sed propter spiritus. posteaquam ahorthi cor ipsum prætergressa est, paruam arteriam coronalem dictā, eo quod cor ipsum circumdet, immediate parit, quæ eius substantiam uiuidam reddit, in qua uarie diffeminatur. illud insuper scito coronalem hanc arteriam in nonnullis non esse vnicam, sed duas: deinde ascendens altius duos in truncos scinditur, quorum alter maior, minor alter existit: maior descendit, ascendit minor; maior autem factus est ille truncus, quem descendere aiebam: quoniam maior corporis pars illi uiuificanda erat. truncus ascendens à sinistris arteriā emittit, quam axillarem sinistram vocant, quæ oblique uersus axillam tendit, & ad superiores costas arteriolas mittit, & egrediens ad brachium iter tenet per internam partem, & cum basilica interna iungit se sociam, ramumq; sursum mittit, ramulos autem alios ad omnes eos musculos, qui sunt circa humerum, scapulam, eius cavitatem, necnon ad anteriora thoracis, & ad eas glandulas, quæ sunt sub ala. Truncus vero axillaris recte per internam regionem humeri descendit usque ad cubiti flexuram; & anteaquam regionem hanc pertrāseat, arteriolum mittit sociam quarto neruo brachij ad musculos cubitū extendentes distributam: cum autem flexurā cubiti præterijt, in duas,

sæpe in



sæpe in tres arterias secatur. sed prius arteriolas ad eos musculos re-  
legat, qui sunt in humero, & cubito; & ramus vnus penes id liga-  
mentum incedit, quod inter cubitum, & radium positum est: & e-  
gressus foras ad externos musculos graditur. quod reliquum est,  
cubiti longitudinem sequitur: postea uero quàm sub interno trans-  
uerso brachialis ligamento præterfluxit, in palma ipsa varijs secatur  
modis, & ad extremos vsq; digitos extenditur: at alter ramus ten-  
dit radium versus iuxta eius deductum: & vbi medium cubitum præ-  
terijt, assurgit inter musculos: & ad cutim subit per internam par-  
tem radij. atq; hic ille est ramus, cuius motum digitis persentiscere  
medici solent: cum manum in carpo apprehendunt, vt pulsum con-  
sulant. Illud præterea scias velim, ramum, quem dixi, in aliquibus  
vario situ locatum esse, vt dubites an is sit, quem hætenus memo-  
raui, eo quòd foras versus feratur. quòd si quis medicus rei ana-  
tomica ignarus huius pulsus, dum ægrotat præsertim, loco con-  
sueti duntaxat quærat, neque inueniat, nã is hunc morti proximũ  
esse falso iudicabit, & prædicet falso. Non equidem negauerim  
perraro arteriam huiusmodi situm obtinere; nam partem internam  
plurimum occupat. hæc vbi à brachiali discessit per partem exter-  
nam, vsque ad digitorum extremitatem procedit. alter ramus iuxta  
ligamentum fertur. Truncus iste ascendens postquam arteriã axil-  
larem peperit; in arterias binas dissecatur carotidas, hoc est sopora-  
rias appellatas, quæ per partes colli laterales rectæ feruntur vsq; ad  
caluariæ basim, asperæ adhærentes arteriæ, venisq; iugularibus in-  
ternis affixæ. quam caluariam priusquam ingrediuntur, duas arte-  
rias ad faciem mittunt, & sub maxilla inferiori subdiuisæ ramulos  
mittunt ad musculos tũ colli, tum capitis, tum laryngis, tum hyoi-  
dis, tum linguæ. sed duo ramuli, ijq; maiores ad linguam ducti per  
eius longitudinem ad extremum vsque feruntur: quo peracto itine-  
re ascendunt sub aurem, & tum ante, tum post ipsam sursum attol-  
luntur ad temporales musculos, ad frontemq; necnon ad capitis  
cutem: & ad faciem, hoc est, ad eius musculos distribuuntur. alter  
eius ramus, quem retro ferri diximus, disseminatur ad duos illos  
musculos, quos nos primi, pace aliorum dixerim, inuenimus: qui  
positi sunt in parte capitis posteriore. fertur etiam ad cutem, & ad  
musculos capitis. Ab eodem loco, & aliquantulum altius etiã ar-  
teriæ duæ ortum ducunt maxillam inferiorem ingredientibus sub au-  
re in foramen ibi dedita opera situm, iuxta maxillæ longitudinem,  
quibus cum arterijs & vena, & neruus quoq; adiunguntur; disper-  
guntur aut ad omnes radices dentium inferiorum: pars vero egre-  
ditur

Arteria tangenti-  
bus medicis bra-  
chiũ se offerens.



Carotidæ arteriæ  
scilicet sopora-  
riæ dictæ, earũq;  
distributio.

Duo musculi po-  
sterioris capitis  
nunc primum co-  
gniti.

Arteriæ dentium  
radices ingredi-  
entes.

Dexterarū axilla-  
rum arteriarum  
inter se diuerfi-  
tas.

Vessalij lapsus.  
Arteriæ ad supe-  
riora thoracis co-  
stiarum interval-  
la.

Dux arteriæ sub  
sternon.

Arteriæ per tran-  
suerfos colli pro-  
cessus.

Membranæ utriusq;  
cerebellique ar-  
teriæ.

Posterior capitis  
pars nō vacat ar-  
terijs.

ditur per foramen ad mentum positum, & per labrum incedit. Huius arteriæ Vessalius oblitus est prorsus, ita vt illius ne memine-  
rit quidem. Sed anteaquam illas arterias describo, quæ in caluaria  
continentur, aliquæ aliæ prius describendæ sunt, quarum pars à cal-  
uaria quoq; fuscipitur. Animaduertendum igitur est, dexteram ar-  
teriam axillarem è loco minus humili exoriri, quàm sinistram. præte-  
rea oblique nō incedit, vt illa. est autem origo eius à carotide dex-  
tera in iuguli regione; & recta incedit per axillam sub iugulo ad bra-  
chiū dexterū: vbi diuiditur, & progreditur instar sinistræ. at vnde  
hæ carotides arteriæ, & axillaris arteria ortum ducunt, ab anterie-  
re parte dux arteriæ nascuntur deorsum tendentes, ramos ad supe-  
riora interualla costarum & ad vertebrae mittunt, quas Vessalius  
ignorauit: aliæ item dux exoriuntur arteriæ paruæ, quæ sub ster-  
no conuertuntur, descenduntq; duabus illis venis comitâtibus, quæ  
ad mammillas tendebant, & ad fines rectorum musculorum. itaq;  
diuiduntur in illorum morem. In eadem pene regione retro tamē  
versus corpora vertebrarum duas alias adnotabis, quæ per transuer-  
sos processus vertebrarū colli delatæ (ob hoc enim illos natura per-  
forauit) necnon per ea foramina, è quibus nerui egrediuntur, ramu-  
los mittunt ad spinalem medullam, vertebrae q; & ad musculos cer-  
uicem in latus flectentes: sed in quibusdā hæ dux arteriæ non à so-  
porarijs, vt in plerisq; sed frequenter ab axillaribus originem du-  
cunt. hæ quas nunc ob oculos ponimus arterias, inter primam ver-  
tebram, & caput partem caluariæ posteriorem ingrediuntur: inter  
ipsam nimirum, & spinalem medullam; prius tamen duas arterio-  
las auris antro subministrât, quæ in ingressu miscentur. dextra nāq;  
sinistræ vnitur adeo, vt longitudine semidigiti vna fiat; in duas po-  
stea diuiditur; deinde in alias complures; tenduntq; primum ad du-  
ram, tenuemq; meningem, deinde ad cerebellum. & profecto si hæ  
dux arteriæ non fuissent à natura genitæ, posteriora caluariæ arte-  
rijs caruissent. ab hisce cerebellum viuificatur, & cerebri quoque  
pars, & medullæ spinalis origo. Hæ dux arteriæ, quæ per trāsu-  
ersos processus vertebrarum inter primam vertebrae, atq; os occipi-  
tij sursum assurgunt, internam caluariæ regionem ingrediuntur in-  
ter ipsam, inq; spinalemq; medullam. postea vero quam caluariæ ca-  
uitatem ad dimidij digiti longitudinem sunt ingressæ, vniuntur, atq;  
ex binis vnica fit arteria; tamen diuiduntur denuo in geminas, dex-  
teram scilicet & sinistrā, à quibus arteriæ ad duas cerebri membra-  
nas mittuntur, atq; ad cerebellum. deinde per horum substantiam  
parte superiore ad dimidiam vsq; caluariam maxima fit harum arte-  
riarum

10

20

30



riarum distributio. quod reliquum est cranei, à duarum carotidum ramificatione viuificatur: vt paulo post dicam. quæ priusquam craneum penetrent, arteriolas auris labyrintho mutuo dant. vbi vero hic arteriæ truncus caluariam ingressus est, vt supra dicebam, ad spinalem medullam, ad duram, tenuemq; membranam, ad cerebellum cerebrumq; arterias mittit suas. Neq; quemq; inuenies, cui vera harum duarum arteriarum distributio cognita fuerit; neq; Vessalius ipse illam olfecit. qui dum in arteriarum per transuersos vertebrarum processûs ascendentium descriptione versatur, inquit ing-

Auris arteriæ.

Distributio arteriarum Vessalio incognita.

10 gredientes caluariam per sinû illum duræ matris tendere, quem iugulares ingrediuntur venæ. sed hoc potius ita esse animo concepit Vessalius, quàm oculis viderit. Quo circa nihil mirum est, si is rete mirabile à priscis anatomicis tantopere decantatum nescio quo pacto irrideat; nam ab hisce, quas ignorauit, arterijs potius quàm à carotidibus rete mirabile efformatur; quanuis neq; Galeno hæc duæ arteriæ cognitæ fuerint: nam venas, inquit, per posteriora capitis ferri, per anteriora vero arterias. Tu vero hoc loco admirabile & arte inenarrabile constructum opus ab opifice summo diligenter ad notabis, cuius de sapientia, prouidentiaq; filere satius duco, quàm

Rete mirabile dari cõtra Vessaliũ.

20 pauca dicere. etenim duæ, quas descripsimus, arteriæ sub spinali medulla sursum attolluntur, & præter multifidos illos ramos, quos per tenuem membranam spargit, eo loco, quem conarium, vel pinealem glandulam appellamus ingrediuntur substantiam cerebri in extremitate superiorum ventriculorum, atq; ibi grandem, atq; insignem plexum perficiunt; qui plexus mea quidem sententia plexus mirabilis ob admirabile artificium appellari merito potest: qui posteriore parte ad torcular affigitur. in hunc eundem admiratione dignum plexum duæ quoq; arteriæ carotides immittuntur, vt suo loco audies. itaq; ex quatuor arterijs constructum esse rete mirabi-

Conarius locus.

Torcular.

30 le obseruare poteris: quod ante me à nemine hætenus obseruatum fuisse comperi. ita vt & rei nouitate, & dignitate delectari, & doceri possit rei anatomicæ studiosus. arteriæ carotides vbi ad caluariæ basim peruenere, id foramen ingredi videtur è quo sextum neruorum par egreditur: & quod venas iugulares internas suscipit; non assurgunt tamen, neq; hic duas arterias pariunt, vt Vessalius cogitatione potius, quàm visu deprehendit: quas vna cum iugularibus in duræ membranæ sinus ingredi voluit. sed quid, inquires, hæc agût arteriæ sub caluariæ basi? Ad anteriorem partem conuertuntur, perq; id foramen transeunt, quod in osse temporali latitat prope illud, in quod sexta descendit neruorum coniugatio, & iugulares internos ingrediuntur,

Rete mirabile ex quatuor constitui arterijs à nullo adhuc obseruatum.

**Seminales arterie** geminas producit arterias seminales, quæ à corpore magnæ arteriæ ortum habent, non autem à sinistra emulgente, vt Galeno visum est, perpaucos tamen excipio: hæ descendentes implicantur cum venis seminarijs tum in mare, tum in fœmella ad testes vsque, & in fœminis vsque ad vteri corpus, & ad internam partem matricis: &

**Vmbilicales arteriæ.** ab his arteriæ vmbilicales fœtus originem trahunt. sub hisce feminarijs arterijs medio trunco alia emergit arteria, quæ ad recti intestini mesenterium defertur, & ad partem eius intestini, quod colon appellamus: quæ per sinistrum ileon deorsum fertur. at recti intestini arteriæ vnà cum mesaraicis venæ portæ venis ad extremum p-

**Recti intestini arteriæ.** 10 dicem vsque descendunt, quare fiunt tum venæ, tum arteriæ hæmorrhoidales, posteriore in parte ab hac eadem arteria sub transuerso septo arteriæ egrediuntur ad vertebrae, ad spinalem medullam, necnon ad dorsales musculos, atque ad abdominis musculos delatæ. Cum vero ad penultimam vertebam lumborum prouentum est, & in nōnullis ad vltimam vsq;: primum in duos ramos, eosq; insignes diuiditur, qui dextrum, sinistrumq; eius adeunt, superant autem ca uam venam in osis sacri regione. Hi duo rami subdiuiduntur, descendentesq; amplius ramificantur, & ad vesicæ latera, & ad vteri ceruicem, & ad musculos in cōcauitate abdominis residentes; duæ 20

**Hæmorrhoidales arteriæ.** vero aliæ transeunt per foramina sita in osse pubis, coxendicisq;: è quibus, quum primum abdomē ipsam egressæ sunt arteriæ mittuntur ad duo corpora penis, quæ à summo ad imum feruntur, in ijsq; in ramos abeunt: atque hæc illæ, illæ inquam sunt arteriæ, quibus erectio mentulæ accepta ferenda est; quam rem nemo, quod sciā, nostris temporibus, neq; ex antiquis cognouit, aut scripsit. Quod reliquum erat harum arteriarum, per eos musculos dispergitur, qui in interiore femore positi sunt; neque tamen genu prætereunt. ab

**Arteriæ penis, penem ipsum erigentes, qui vsus hucusq; fuit ignotus.** illis arterijs quas vesica excipit, aliæ quoq; proficiscuntur arteriæ, 30

**Vesicæ arteriæ.** quæ ad internam osis sacri partem delatæ, per quæ eius foramina tum ad ipsum tendunt, tum ad spinalem medullam, extra vero ad musculos femori deferuientes: quemadmodum à magna quoq; arteriæ diuisione arteriæ exeunt, quæ musculos femoris, qui sunt in abdomine, vitali sanguini nutriunt. ex illis autem arterijs, quæ iuxta sacrum os, coccygemq; descendunt, nonnullæ ad *σπινθησα* musculum perueniunt vnà cum quibusdam caue venæ venis, quæ & ipsæ hæmorrhoides dici possunt. Ex magna magnæ arteriæ diuisione duæ insuper oriuntur arteriæ, quæ sursum reflectuntur, & peritonæum prætereunt, sub rectosq; musculos ascendunt supra vmbilicū vsque: & in ramos plures finiuntur per abdominis musculos. In hac diuisione



diuisione duæ arteriæ implantantur, quas vmbilicales appellamus, quæ primæ sunt, quæ in foetu ipso gignantur. Etenim hæ ab vmbilico postquam emerferint: progrediuntur per peritonæum quæ duplex est ad vesicæ latera, hasq; arterias gignunt, de quibus paulo antea dicebamus. post vmbilicalium autem arteriarum ortum cor ipsum gignitur, quemadmodû tunc latius, & apertius explicabimus, cum de foetu dedita opera agemus. sed ad vmbilicales arterias redeamus. hæ postquam in lucem proditi sumus exiccantur, duorûq; ligamentorum munere funguntur. Duo autem magni trunci rami, qui ad crura deferuntur, trãseunt supra quintum muscolum lumbalem femur flectentem, & supra os pubis ile versus abdomẽ exeunt, & hoc loci cum venis internis socias iunguntur, quæ inter musculos incedunt; & quemadmodum venæ illæ diuiduntur; ita has arterias diuidi conspicias ad omnes scilicet musculos tibiæ, pedis, digitorumq;: ad eorû enim extremitatem perueniunt. Mittunt insuper arteriolas tum ad inguinis glandulas, tum ad scrotum, tum ad penem sub cute. Illud insuper adnotabis ossa suis non carere arterijs, vt & ipsa calore vitali non deficerent. Atque hæc de arterijs dicta sint satis: nolo enim inutilibus verborum phaleris, & circuitione lectorem fallere, & diutius sine fructu detinere.

Post vmbilicales arteriam generatam generatur cor ipsum.

Diuisio magnæ arteriæ ad crura.

Ossa arterijs non carere.

# REALDI COLVMBI CREMONENSIS

## DE RE ANATOMICA LIBER VIII.

De Cerebro, eiusq; membranis: De Spinali  
Medulla: item de Neruis. Cap. I.

30



REBRVM inter humani Corporis partes principem locum obtinere nemini dubium esse debet, quidquid cum Aristotele philosophi sentiant: quod ita esse quinque rationibus probare facile possum. Primo mihi situs cerebri nobilitatem, atq; illius in cætera membra principatum aperte ostendit; quod illud in

Cerebrum primas tenet cõtra Arist.

Prima ratio principatus cerebri.

altissima corporis parte Deus opifex collocavit, quasi in munitissima arce, vt minus esset iniurijs obnoxium. Secundo inducor à si-

Secunda ratio.

Tertia ratio .

Cerebri quæ sint  
propugnacula.  
Aristotelis error  
de cute capitis .

Facilius læditur  
cor quàm cere-  
brum .

Quarta ratio .

Quinta ratio .

Aristotelis error .

Cerebri vsus non  
est caloris cordis  
attemperatio .

Crasa & tenuis  
menix circa cere-  
brum .

gura ipsius, quæ rotunda, oblongaq; est: rotunda magis, oblonga minus; quam figuram nunquã temere effingit natura prudens rerũ omnium architectonica. Tercio me mouet ratio munimentorum, & ingens apparatus, quibus cerebrum vndique stipatum est; nam priusquam ad cerebrum ipsum pertingas, quasi ad principis alicuius maximi penetralia, bone Deus, quot atria, porticus, thalamiq; pertranscendi sunt. Iam primum adsunt capilli, deinde cutis crassissima (licet hanc Aristoteles falso tenuissimam esse scribere non vereatur) deinde pinguedo, deinde carnea membrana, pericranionq; & periostrion, & caluaria duplex, sub qua adhuc binæ meninges à seipsis distantes pro cerebri tutamento constructæ sunt. Ossâ vero capitis, vt proprio capite dictum est, ita ante composita sunt, vt diuelli, atque abstrahi nisi magna vi possint; neque cerebrum nisi ab ingenti violentia lædatur. De corde autem quid attinet dicere, quàm facile per interualla costarum ad ipsum lædendum vel minimo quouis instrumẽto perueniatur? vt videas naturam adeo accurate cor ipsum non vallasse vt cerebrum. Quarta ratio qua adducor, vt credam membrorum principatum cerebro deberi, est cerebri vsus mirificus. quòd scilicet tum sensus, tum motus principium existit: absq; vsu enim cerebri homo esset instar statuæ cuiusdam, 20 motus, sensusq; expers. Præterea sedes est animæ ratione præditæ. A cerebro visus, auditus, gustus, odoratusq;, & locutio proficiuntur: his enim actionibus quantam cerebrum vtilitatem afferat, vel idiotæ ipsi norunt. Quintam demum rationem ex huius ipsius artis quam tractamus partibus, & considerationibus sumo; quibus Anatomicarum rerum instructissimos minime refragari posse confido: ea vero talis est. In hominis generatione iecur gignitur medio, & ope venæ vmbilicalis (vt in tractatu de foetu latius explicabimus) cor vero medio vmbilicalis arteriæ. atq; hæc tum vena, tum arteria vmbilicales à vasis vteri oriuntur: at nerui, quos sensus, mo- 30 tusq; instrumẽta esse nemo dubitat, à foetus cerebro oriuntur. Iure igitur cerebrum nobilius est membris omnibus, & vt ita dicam, principum Rex. Quamobrem magna illud arte natura condidit: quam si Aristoteles nouisset, nunquã cordi hanc nobilitatem ascripsisset: quæ cerebro propria est: neque à corde tot actiones prodire existimasset: neq; cerebrum ob cordis refrigerationem factum esse, vt scilicet cordis calorẽ ingentem attemperaret. Sed dimisso Aristotele, cuius in hoc explosa sententia est, ad institutũ redeamus. Natura circa cerebri substantiam duas appofuit membranas, crassâ inquam, & tenuem, quæ vniuersam illius substantiam circundant.

Ex quibus



- Ex quibus crassa meninx, quam & duram matrem vocant, à cerebro ipso distat, quemadmodum à pericardio cor. huius autè distantia causa est, vt cerebri diastole systoleq; locum habeat. Vt enim vidimus, non modo cordi perpetua adest diastole, ac systole, sed cerebro quoq; quod licet paradoxon videatur, tamè si diligens eris anatomicus, & recentia capitis vulnera complura obseruabis, tam verum esse deprehendes, quàm quod verissimum. iccirco dura hæc membrana caluariæ cōnectitur futurarum ope: caluariamq; egressa pericraneon creat; ita dictum quòd exteriorem cranei partē circundet. cuius interiori parti dura, quam diximus, membrana validissimo nexu colligatur. Neq; vnica est membrana, veluti qui ante me de Anatomicis rebus scripsere, omnes vno ore prædicant: sed duplex: vel, vt apertius dicam, duæ sunt membranæ dura meninx; quarum vnā internam voco, quæ cerebrum spectat, alteram externam caluariam versus, quæ minori sensu merito prædita fuit: quippe cui ossis durities attingenda erat. Altera vero, quam internam dixi, magno sensu pollet. Hæ itaq; membranæ in capitis vertice sub recta futura reduplicatæ descendunt cerebri dexteram partē à sinistra seiungentes: non tamen ad imum vsq; , sed ad dimidium cerebri quasi ad sphaeræ centrum dixeris: vbi corpus adest callosum dictum. Hæc membranarum duplicatio, quam supra memorauī, posteriore sui parte versus cerebrum latior est, quàm in anteriore frontem versus. Figura eius est falcis in modum. at posteriore capitis parte hæ membranæ quadruplicantur; hoc est quadruplex hoc loco dura membrana cernitur, neque iniuria: nam cerebrum à ce rebellō seiungit. Inter has, quatuor sinus, seu cavitates potius ad sunt sanguine refertæ, in quas tamen venæ iugulares internæ ingre diuntur (quem ingressum Vessalio in hoc parum accurato ignotum fuisse eius scripta legens facile perspicies) & ad extremum vsq; pro grediuntur: propterea non adest hoc loco sanguis extra propria va sa. Quod si essent, quemadmodum Vessalius sensit, dura mater ve narum, principium esse diceretur. quo quid absurdius dici, aut co gitari possit nō equidem video. Sed ad prædictos sinus reuertamur. Ex his duo primi ad basim siti sunt, vbi aditus patet venis iugulari bus internis, quarum incessus est iuxta occipitium, sursumq; ad api cem futuræ labdoidis assurgunt, atq; hic dextra cum sinistra coniun gitur, tertiumq; sinum efficiunt, qui iuxta vniuersam capitis longi tudinem progreditur, & in id foramen definit, quod in nasi summi tate inter frontem, atq; os ithmoides positum est. Non est hic ter tius sinus orbicularis infra; nam latera illius trianguli specie sunt; pars superior

Dura meninx di stit à cerebro vt pericardiū à cor de.

Diastoles, & systo les in cerebro.

Dura mater futu ris adhaeret. Pericranium un de oriatur.

Dura mater du plex est.

Cur exterior tu nica duræ matris interiore minus sentiat. Vbi reduplicetur.

Figura falcis vbi .

Vbi dura mēbrana sit quadruplex & cur.

Quatuor cavitates sanguine plenæ, iter quadruplici tatē duræ matris. Iugularum vena rum ingressus. Vessalij error .

Deducit Vessaliū ad inconueniēs .

Duo primi sinus inter meningem duram quadru plicem vbi.

Tertius sinus vbi .

Tertij sinus figu ra, qualis.

Ortus venarū quæ  
per tenuem mē-  
branam disper-  
guntur.

Cerebrum à qui-  
bus alatur venis.  
Ossa capitis qui-  
bus venis nutriā  
tur.

Quartus sinus du-  
ræ matris dupli-  
catus.

Linon seu torcu-  
lar quid.

Venarum à torcu-  
lari deductus.

Descriptio pia  
matri.

Pia mater cere-  
brum immedia-  
te tangit.

Chorion.

Cerebri substan-  
tia qualis.

Figura cerebri dē  
pia pia matre.

Cur tot circum-  
uolutiones in ce-  
rebro causæ dūq.

Tertia causa.

Reprobatur tertia  
causa.

Situs substantiæ  
cerebri.

Aristotelis error.

Cerebri pars pos-  
terior non est  
inanis.

Duo ventriculi ce-  
rebri.

superior semicirculum imitatur, cui rotunditati atq; eminentiæ sin-  
ciput cedit. illa etenim cavititas sub recta iacet sutura. Ab hoc sinu,  
vel potius à vena, quam in sinu positam esse dicebamus, venæ aliæ  
complures tum à lateribus, tum infra exoriuntur, quæ per tenuem  
membranam dispersæ vagātur: cuius membranæ tenuis descriptio-  
nem mox habebis. hæ quas diximus, venæ innumeræ efficiuntur: à  
quibus cerebrum alitur vniuersum. supra hunc sinum venulæ quoq;  
exoriuntur, quæ, vt ossa nutrant, per futuras transeunt. Quartus  
sinus quadruplicatæ duræ matris inter cerebrum, cerebellumq; po-  
situs est; quem locum linon, torculariū appellāt anatomici; à quo  
venæ ortum ducunt per substantiam cerebri delatæ, perq; tenuem  
membranam, à qua cerebellum inuoluitur: reticulari plexui se so-  
cias præbent. Sub dura matre, quam accurate, quantum in nobis  
fuit, descripsimus, adest pia mater tenuis meninx dicta, à qua cere-  
brū, & cerebellum induitur. horū enim substantiā immediate tan-  
git. dicitur etiam chorion idest secundina, tenuis, plena venarum,  
atque arteriarum. sub tenui dicta meninge cerebri substantia latitat  
alba, mollisq; & medullaris quoque nuncupata, licet à substantia  
medullæ, quæ in ossium cavitatibus reperitur, non parum discrep-  
pet. Figura totius cerebri substantiæ, dempta pia matre, tenuium  
intestinatorum spiris, dempto omento, non absimilis est. harum cir-  
circumulationum causa querenda est. Ego tum ob leuitatem, tum  
vt cerebrum in diastole, systoleq; facilius moueretur, hos giros fa-  
ctos fuisse opinor. Nō desunt scriptores, qui aliam causam tot ce-  
rebri circumuolutionum se inuenisse putent, vt scilicet cerebrum  
intelligeret. At si hæ circumuolutiones in cerebro intellectio-  
nis causa existunt; asini quoq; cæteraq; bruta animantia, quorum ce-  
rebrum hisce gyris præditum est: non intelligere non possent.  
Quod quàm ridiculum sit, nemo non videt. Igitur causam, quam  
ego attuli, leuitatis cerebri, & motus promptioris veriorem puto.  
Animaduertendum interim est, quemadmodum hæ profundiores  
sunt magis, minusue, ita piam matrem illas inuestire; substantia ce-  
rebri totam caluariæ internam cavitatem occupat ante, retro, atq;  
à lateribus: licet Aristoteles, qui in rebus anatomicis plerunq; la-  
bitur, partem capitis posteriorem cerebro carere falso affirmave-  
rit. Sed posterior capitis pars, vt vnicuiq; patet, non est inanis;  
nam non modo cerebrum adest, sed cerebellum quoq;. Ad huius  
substantiæ medietatem plus minus, duæ occurrunt cavitates, hoc  
est ventriculi duo, dexter inquam, & sinister, oblongi, anfractuosi-  
q; ab anteriori parte ad posteriora tendentes. Hos ventriculos  
sunt,



- sunt, qui anteriores vocāt: ego vero superiores potius appellarem: nam alios omnes supereminent. Hi ergo satis ampli sunt, tenuiq; membrana induuntur: quamvis id Vessalius perneget, qui si sensui in hoc aduersari profitetur; ego nihil moror, ipse viderit. Per hos superiores cerebri ventriculos feruntur plexus coriformes, quos reticulares appellauimus. Vfus autem horum est animalium spirituum generatio. Atq; hoc quod nunc dicam, quoniam meum inuentum est; obsecro, diligenter attende. Horum ventriculorum origo est supra os sphænoïdes ithmoides versus: aer autē per nares attractus in frontis, cupcalisq; cavitare aliquandiu conseruatur: alteratus deinde ad hos binos ventriculos, quos ego superiores appellauī per foramina ithmoidis ascendit. at in his ventriculis ob assiduam tum cerebri, tum huius reticularis plexus motum miscetur cum vitalibus spiritibus aer: itaq; spiritus animales euadunt ex aere eo, quo diximus modo preparato, & ex vitalibus dictis spiritibus. quæ res à nemine ante me obseruata fuit. de his loquor qui suos de Anatomicis rebus conceptus in vulgus edidere. Animalium vero spirituum vtilitas, nō vnica est: sed ad omnes sensus extenditur: in dictis nāq; ventribus, & cavitatibus geniti ad basim cerebri descendunt: vbi
- 10 tertius adest ventriculus, cavitatis. s. longiuscula, rectaq; ab anteriori ad posteriorem tendens cerebri partem. Non procul autē ab hoc ventriculo nerui spinalis medullæ oriūtur. propterea facile est hisce animalibus spiritibus neruos adire & penetrare, aut certe p eos ad organa sensuum deferri atq; illis opem ferre iuxta vniuscuiusq; actiones, quemadmodum per neruos opticos in oculos delati his actiones videndi subministrant. idem de Auditū, de gustūq; dictum puta, & de quauis actione, quæ à cerebro proficiscatur. Præter hanc tertiam nuper descriptam in cerebro cavitatem, quartā quoq; obseruare licet inter cerebellum, spinalemq; medullam: quo loco
- 30 exiguum adest foramen, à tertia ad quartam, quam dixi, cavitatem permeans. ne existimes tamen adeo exiguum esse hoc foramen, quin peruium non sit animalibus spiritibus, qui per id à tertio ad quartum ventriculum facile admodum transeunt. Atq; hic est locus, in quo memoriam contineri aiunt. quartus ventriculus non est admodum capax; atq; à tenui membrana continetur. ibi spinalis medulla, vt suo loco dicam, cavitare predicta est instar calami scriptorii, quasi foramen esset, per quod contentos spiritus ad spinalem medullam facile peruenire posse non dubito. supra tertium ventriculum cerebri portionem illi supereminentem videbis satis candidā, quæ callosum corpus appellatur. huic subest alia cerebri portio fornix,

Qui anteriores ventriculi vocantur superiores recti dicentur. Vessalii error.

Plexus coriformes.

Vfus.

Inuentum Realdi vbi & quomodo generentur spiritus animales.

Vfus animalium spirituum.

Tertius ventriculus cerebri.

Neruorum spinalis medullæ ortus.

Quartus ventriculus cerebri vbi.

Iter spirituum animalium à tertio ad quartum ventriculum.

Locus memoriæ.

Cavitatis in spinali medulla instar calami scriptorii.

Callosum corpus.

Fornix, & psaloides fornix, & psaloides dicta semicirculi figura, vel pontis potius, qui posteriore parte duobus cruribus, anteriore vero vnico duntaxat innitatur. neq; inutiliter callosum corpus, fornicemq; natura efformauit: sed ne tertiam hanc cauitatem cerebri moles obrueret, atq; repleret. inter has autē particulas cerebri, callosum inquam corpus, & cameratum continetur speculum. ita vero dicitur, quòd diaphanum sit. est autem diaphanum, quoniam nihil aliud est, quàm tenuis cerebri membrana hoc loco duplex. hac duplicatione, vt ita dicamus, tenuis membranæ ventriculi superiores circundantur, qui hinc deorsum redeunt. quod nisi hoc speculum præsto esset, quo pacto dextrum, & sinistrū ventriculum diceres: non equidem video; nam huius vnus membranæ ope diuiduntur. Post fornicem in extremo cerebro cerebellum versus, atq; in finibus superioris partis tertij ventriculi quædam partes eminentes natura finxit, quæ superiore sui parte testium imaginem referunt: & testes ab Anatomicis vocati sunt: prope quos duæ aliæ particule paulo maiores cernuntur ob earum figuram clunes appellatæ; inter quas foramen illud iacet, quod à tertio ventriculo ad quartum progredi diximus, & ano simile videri potest. In anteriore præterea testium parte ad tertium ventriculum tendenti pars alia cerebri tibi occurret, quæ muliebris pubis, vuluæq; speciem non inconcinne, immo vero pereleganter exprimit. Apud hoc corpus glandula visitur duriuscula colore à cerebri substantia diuerso, hoc est aliquantulum luteo, tenui quadam membrana obducta. hæc glandula conarium, pinealisq; dicitur; torculari affigitur, & penis figuram perbelle reddit: Ita vt in cerebro testium, clunium, ani, vuluæ, penis figura non desit. Vfus huiusce glandulæ mea quidem sententia fuit ob vasorum diuisionem, quamuis quibusdam Anatomicis secus videatur; quod scilicet factū fuerit conarium, vt spiritus quarti ventriculi clauderet. quod mihi nullo pacto verisimile videtur. In anteriore parte tertij ventriculi cauitatem profundiorē carnes, quæ supra sphenoidis sellam tandem euadit. hæc cauitas peluis, & infundibulum appellatur; facta vt excrementa in hisce ventriculis genita excipiat, & ad glandulam in sphenoidis sella positam transmittat. quæ glandula crassa est satis extra duras membranas posita, ad cerebri excrementa suscipienda à Diuino opifice fabricata: atque hic est locus ille, vbi tenuis assurgit membrana, vt hos ventriculos induat. Quamobrem valde miror admirabilem Vessalium, qui quamuis optime nouerit peluim, quam dixi, nihil aliud esse quàm tenuem membranam; ignorauerit tamen hanc ascendentem ventriculos cerebri inuestire. Sed ille tantopere

Fornix, & psaloides.

Vfus corporis callosi, & fornicis.

Speculum vbi sit in cerebro curita dictum.

Speculum quid sit in cerebro.

Piæ matris duplicationis vsus.

Testes in cerebro.

Clunes. Foramen ano simile.

Vuluæ muliebris imago in cerebro.

Glandula pinealis.

Glandulæ pinealis vsus. Error anatomicorum in vsu conarii.

Peluis & infundibulum vbi sit & vsus eius.

Vessalii error.

10

20

30



- tantopere exoptabat Galeno contradicere, vt nil mirum sit, si is ab illa incredibili rerum nouarum, & populi gloriola captanda raptus nonnunquam longa errat via. Sed antequam ab humano cerebro describendo discedo, hoc adnotes velim, in vniuerso cerebro quatuor duntaxat enumeratas cauitates reperiri, præterea nullas, licet aliqui sex esse asseuerent, qui faciunt ne intelligendo, vt nihil intelligent. Causa erroris horum est, quòd anfractuosum deductum duorum primorum ventriculorum non sunt ad finem vsq; persequuti, atq; ita eo deductu imprudenter præterito existimarunt binos alios
- 10 ventriculos anteriore in parte reliquos esse: qui profecto nihil aliud sunt, quàm portio primorum. Sed posteaquam cerebri historiam absoluimus; consequens videtur, vt de cerebello loquamur. Hoc in posteriore caluaria sub duris membranis collocatur, à quibus, & à tenui quoque vndique circumdatur. eius tamen circumuolutiones dissimiles admodum apparent his, quas in cerebro supra adnotaui-  
mus. substantia cerebelli (quidquid Galenus dicat) minime dura existit. suisq; gyris tandem deorsum definit in processus binos, quorum figura similis est albis, breuibusq; vermibus ijs, qui in lignis cariosis sæpe cernuntur. quorum vsus fuit vt prohiberent, ne quartus ventriculus à cerebelli pondere pressus illius substantia obstrueretur. Sed hoc quod dicam de cerebello admirabilis videbitur: cū tamen verisimum esse non semel, sed sæpius magna cum voluptate in frequenti doctorum corona publice obseruauerim. Nullum neruorum par à cerebello exoritur, sed à cerebro solum, quidquid Galenus opinetur, à quo non sunt omnia accipienda, tanquam ab oraculo. Ipse rationem reddit cur cerebellum durius, quam cerebrum natura efformauerit, vt scilicet nerui duri, spinalisq; medulla inde exorirentur. Sed cerebelli substantia durior nullo pacto est; neque neruus vllus à cerebello originem ducit. itaque ratio Galeni sensui aduersatur, qui in rebus Anatomicis rationibus verisimilibus est præferendus.
- 20
- 30

Quatuor duntaxat sunt ventriculi cerebri.

Cur quidam Anatomici sex putarint esse ventriculos cerebri.

De cerebello. Situs.

Indumentum.

Circumuolutiones.

Substantia.

Vermes in cerebello.

Nullum par neruorum oritur ab cerebello contra Gal.

Substantia cerebelli non est durior substantia cerebri.

## De Organis, odoratus, & Neruis. Cap. II.

IN anteriore cerebro circa ipsius basim exortus duorum organorum cernitur, quæ olfactilia græcis, alijs processus mamillares appellantur: oblongi, tenuesq; sunt, & ex ipsamet cerebri substantia constant, tenui duntaxat membrana inuoluti. Inter cerebrum, os sphenoides, atq; os frontis hæc organa deferuntur: supra hæc duræ membranæ occurrunt intuenti, de quibus supra abunde meminimus. Desinunt odoratus organa in duas crassiusculas partes, atq;

Processuū mamillarum ortus.

Progressus.

Finis.

b hæin

Viss.

hæ in osithmoides ad latus processus cuiusdam sui eminentioris. ad hæc organa odores per nares attracti ascendunt : itaque distinguimus, quæ bene, quæ male oleant ; propterea odoratus instrumenta merito appellari possunt .

## De Neruis. Cap. III.

Cerebrū est principium neruorū & spinalis medullæ.

Cur post cerebrū agat de neruis.

Nerui descriptio .

Figura nerui .

Substantia nerui qualis .

Cur talis .

Cur neruos abiat dura & tenuis membrana cerebri .

Deductus .

Origo neruorum .

Neruorum septē paria .

Primum par neruorum cerebri .  
Substantia .

Exortus .

Inuolucrum .

Aethimologia nominis .

In neruo optico nullus porus manifestus .

Galenī error .  
Nerui visui in bobus non sunt perforati .

**S**ED quoniam de cerebro proxime locuti sumus, quod tum neruorum, tum spinalis medullæ principium existit, vt sensus contra Aristotelis dogma vociferatur; consentaneum est, vt neruorum anatomen, quo pacto se habeat, subiiciamus. Sed prius quid sit neruus describamus. Neruus itaq; organum est, per quod sensus motusq; ad vniuersum corpus defertur : quæ nanq; neruis carent, sensu quoq; destituuntur. Figura nerui oblonga, sphæricaq; est : substantia mollis; porosos namq; fieri neruos oportuit, vt animalibus spiritibus aditus pateret. Tenui, & crassa membrana induitur substantia neruorum, vt tutior sit. Deductus eorum per corpus varius est, atque instar riuulorum per tellurem. Neruorum origo est à cerebri basi prope tertium ventriculum. ex his dexteri dextrorsum, sinistri, sinistrorsum feruntur. omnes qui de neruis cerebri scripsere, illos per paria describere; atq; omnes vno ore septem aiunt neruorum coniugia: quo ordine nos quoq; de ipsis agemus. Primum ergo neruorum par, siue coniugium, sunt nerui bini crassi factis, mollesq; quorum exortus ab anteriori cerebri basi nonnihil distat: & supra sphenoidis sellam vniuntur quidem, sed non in crucis morem, quemadmodum multi falso opinati sunt, qui quòd in auiibus forte fortuna viderāt hos neruos incruciaci; in hominibus quoque reperiri existimarunt. Vbi ij, quos diximus, nerui aliquandiu coniuncti permansere, separantur denuo, & ad dextrum oculum dexter, ad sinistrum sinister defertur neruus. Sed de horum inuolucris pulchrum est scitu, illos ab origine, quam dixi, ad foramen in oculi orbita situm, per quod prætereunt, tenui duntaxat membrana inuolutos esse: Inde tamen ad oculum vsq; in quem terminātur, retinamq; dictam membranam efficiunt; tum hac, tum dura membrana inuestiri. Hi nerui optici hoc est visui, seu visorij nuncupantur; quoniam virtutem visuam ad oculos ferunt. Substantia constant cerebri spongiosa quidem, sed nullus in illa porus manifestus cernitur; quamuis id Galenus asseueret; immo vero non modo in homine meatus nullus est in neruo optico perspicuus, sed neque in bobus ipsis, aut quibusuis grandioribus animalibus. Non est tamē vllō

10

20

30



ullo pacto negandum, cum substantia horum rara sit, mollisq; : quin spiritibus transitus pateat, præsertim purioribus. atq; hæc de primo nervorum pari. Nunc de secundo verba faciamus. Secundum nervorum par primo proximum fertur per propria foramina, nec non per rimam orbitæ ad quinque musculos oculo famulantes, & ad duos palpebram recludentes; & in quibusdam huius secundi paris ramuli præter dictum iter in musculum temporalem inferuntur. propterea sæpenumero observare poteris mirum consensum oculi, temporalisq; musculi; vt læso temporali musculo oculus quoq; lædatur; & è conuerso. Tertium nervorum par ortum ducit retro magis versus lateralem partem: duo habet principia, quorum alterum maius est, alterum minus: caluariam penetrat deorsum descendens per id foramen, quod tum huic, tum quarto nervorum coniugio commune est; in varios furculos scinditur; variaq; est illius propterea distributio. Alter namq; ramus ad musculum temporalem reptat, alter ad orbitam oculi, per supercilium ad frontem, musculumq; palpebram constringentem, & ad musculum, qui nasum dilatat; deinde ad nasum quoq; infinitosq; propemodum ramulos procreat. Alius ramus tertij nervorum coniugij, per eandem quidem orbitam iter habet, sed inferius; transit autem per tertium os maxillæ superioris, per id foramen, quod circa faciei medietatem positum diximus in tractatu nostro De Ossibus; quo postquã ventum est, in multos insuper neruulos diuiditur, qui per labrum superius diffeminantur, necnon per musculum massetera dictum, perq; musculos buccæ: & ipsorum neruulorum portio nasi quoq; cavitatem ingreditur. Alius ramus ad superiorum dentium radicem tendit, alius ad inferiorem descendit maxillam, atq; huius rami portio ad inferiorum quoq; dentium radicem distribuitur. quod reliquum est, prope mentum præterlabitur, vt labrum inferius sentiat.

- 30 Quartum nervorum par adeo proxime accedit tertio nervorum pari, vt quarti origo, tertij portio esse videatur. Tertio minus est, cū quo descendit versus os, & in quatuor ramulos secatur, qui per foramina quinti ossis maxillæ superioris transeunt; & per palati tunicā anteriora versus progrediuntur. Duo alij ramuli præterea apud paristhmia, styloidisq; processus descendunt ad linguæ radicem, perq; illius superiorem tunicam distribuuntur. Vfus quarti nervorum paris, hic fuit: vt gustus organum esset. Tu vero interim adnota Galenum, Vessaliumq; in nervorum distributione deceptos, quippe qui quarti coniugij munus, quod diximus, tertio ascripserint. Erroris vero causam tertij, quartiq; paris viciniam fuisse opinor; nam

Spiritus puri possunt transire per substantiam rarā nervorum opticorum.

De secundo pari nervorum.

Situs.

Vfus, & iter.

Læso musculo temporali læditur oculus & contra. Tertij paris nervorum ortus. Progressus.

Tertij paris diuisio in ramos & vfus.

Foramen media facie.

Quarti paris nervorum situs.

Diuisio.

Vfus.

Galeni & Vessalii error.

Causa erroris.

nisi oculatissimus Anatomicus illorum ductus diligentissime persequatur; facile decipi poterit. Quintum vero nervorum par & ipsum ad basim cerebri, & à laterali parte exoritur circa medietatem; foramenq; cœcum ingreditur, labyrinthumq; in osse temporali situm, qui labyrinthus in aures ipsas definit. Sed de hoc labyrintho quo se habeat pacto, in tractatu de ossibus latius explicauimus. huius quinti nervorum paris adminiculo audimus. Sed illius historiam persequamur. Cum ad labyrinthi dimidium peruenit, crassius redditur, & tantum non membranam constituit. hic illa est cavitatas, quam nos diligentissime descripsimus, in qua illa tria ossicula 10 admirabilia auditui deferuentia continentur: ex quibus duo Carpus primus inuenit, tertium meum inuentum est, vt in libro de ossibus legere est. In acutum processum illius ossiculi, quod femoris similitudinem refert; neruulus definit ab hoc quinto pari deriuatus: à quo item neruulus tortuosus in hunc labyrinthum inseritur: exit autem per id foramen temporalis ossis, quod ad radices styloidis positum est. hic neruulus versus anteriorem partem flectitur, & serpentis instar temporalem musculum ingreditur. Causam huiusce rei Galenus assignat, vt scilicet nervus durior euaderet, & magis resisteret. hoc eodem loco neruulus alius inuenitur, qui & ipse tortuosus 20 incedit. Sextum autem par nervorum ad posteriora basim cerebri, retroq; magis conspicitur varijs surculis, radicibusque: & per illud foramen descendit, quod inter occipitium, atq; os temporale situm est: vbi inquam vena iugularis interna ad caluariam accessit. hæc sexta nervorum coniugatio vario modo distribuitur: ad omnia namq; Thoracis, abdominisq; viscera sensum defert. Postea quam igitur dexter nervus sexti paris à loco, quem supra diximus, egressus est; quosdam ramulos ad musculos hyoidis, & ad nonnullos laryngis musculos mittit: postmodum descendit inter venam iugularem, atq; arteriam carotida penes asperam arteriam ad iugulum usque. in cuius regione neruulus mittitur sub arteria axillari dextra, qui versus caput reflectitur, & Tracheæ lateribus adhæret, in laryngisq; cavitatem sese insinuat, & in glottida (est autem glottis formandæ vocis organum) implantatur tandem: atq; hæc est dexteri recurrentis, seu reuersui nerui brevis, fidelisq; descriptio. sub iuguli regione neruulum à se emittit, tum ad pleuram, tum ad radices costarum: alium rursus neruulum mittit ad pulmonem dextrum; quod superest, descendit œsophago affixum usq; ad superius ventriculi orificium. sinistri autem recurrentis nerui historia prolixior erit aliquatulum. Sinister nervus recurrens, quum primum à suo fonte scaturit

Quinti paris nervorum situs.

Vfus.

Progressus.

Ex tribus ossiculis auditui seruientibus Carpus primum Realdus tertium inuenere.

Sexti paris nervorum situs.

Distributio.

Dextri nerui recurrentis historia.

Glottis quid.

Sinistri nerui recurrentis historia.



- scaturit, ramulos promit ad eisdem musculos, ad quos dexter; descendit quoque eodem itinere: in sinistrique iuguli regione ramulos mittit ad pleuram, ad costarum radices, & ad pulmonem sinistram; deinde descendit adhuc, donec bronchum maiorem arteriæ aorti pene attingat: quo loco mittit neruum, qui sub hac arteria reflectitur, & sursum denuo vertitur versus originem suam, asperæ adhærens arteriæ: atque item ingreditur inter os innominatum, & scutalia dicta in parte laryngis interna; & in glottidem ingreditur. Atque iccirco hi sunt nervi celebres, quos tanti facit maximus Galen. per
- 10 quos virtus efformandæ vocis defertur; propterea vocales etiam vocantur. Hunc usum in viua canis sectione plane perspicere vnicuique licet. Si quis enim alterum ex his præscindat, semioculis redditur; sin ambo, prorsus obmutescere cogitur. Gal.vij.lib. de Vsu Part. causam inquit, quamobrem natura sinistram recurrentem neruum ad arteriam axillarem sinistram non conuerterit; eumque in huiusce rei æquilíbrio inuenio sibi omnino non satisfacere: nam hoc argumento dimisso glotochomij organi descriptionem aggreditur. Non est tamen vlllo pacto à Græcis hominibus Galeno detrahendum, præsertim in hac materia de recurrentibus nervis. Quamvis enim
- 20 veram causam supradictæ rei non attigerit; sua tamen diligentia, & incredibili cupiditate iuvandi posteris, primus nervos reuersivos ostendit: in qua inuentione, ut Græcis hominibus mos est, se subinde effert. Ab hoc sinistro recurrente alius oritur neruulus, qui sequitur radices magnæ arteriæ, & per cordis tunicam distribuitur; sed ob sui exiguitatem ad illius substantiam minime penetrat: & hæc vera causa est, cur natura sinistram reuersivum neruum sub magna arteria reflexerit, non autem sub axillari; ne scilicet nervus iste adeo tenuis, atque exilis in cordis motibus, qui perennes sunt; dum animal spirat; disrumperetur. Quod superest huius recurrētis nervi,
- 30 descendit oesophago adhærens usque ad superius ventriculi orificium. Quamprimum autem tum dexter, tum sinister recurrens nervus ad hoc, quod dixi, orificium ventriculi superius peruenit: in multos neruulos quasi retis in morem diuiduntur, & hoc orificium amplexantur; & hanc ob causam tam exacto sensu præditum est, ut in oris ventriculi doloribus cor ipsum dolere videatur; hinc cardiacus dolor dicitur, quod cardiaci Græci veteres os ventriculi appellauerint: quoniam ipso læso eadem pene symptomata, eadem animi deliquia consequantur, quæ ad cordis læsionem consequi consueuerunt. Dexter itaque ex hoc loco ad membranam iecur involuentem tendit; & hic neruulum parit, alium quoque præter hunc ad bilis vesiculam designatum,

Vfus nervorum reuersivorum in viua sectione canis cernitur.

Gal. in reddenda causa cur sinister nervus recurrens non conuertatur ad arteriam axillarem sinistram non satisfacit sibi.

Galenus primus inuenit nervos recurrentes.

Alia distributio.

Vera causa cur sinister recurrens non reflectatur sub arteria axillari.

Alia distributio.

Cur os ventriculi sit sensu adeo exacto.

Curos ventriculi appellat cardiaci.

Alia distributio.

Alia distributio.

Septimi paris ner-  
uorum situs.  
A cerebro non a  
cerebello oritur  
septima neruo-  
rum coniugatio.  
Galenii error.

Duo nervi præter  
septem paria.

Vesalius excusa-  
tur.

Descriptio octavi  
paris nervuorum  
cerebri.

Noni paris neruo-  
rum descriptio.  
Nonum par ner-  
uorum cerebri.

Galenii error.

designatum, alium inferius ad sinistrum renem, & præterea ad su-  
perioiorem omenti partem. mittit insuper ramulos ad mesenterium.  
Eodem pacto à sinistro recurrente mittitur nervus ad lienem, ad in-  
feriorem omenti partem, ad renem sinistrum, & ad vesicam; atque  
hic est finis nervorum recurrentium in maribus; in foeminis autem  
præter dicta loca ad utrum quoque delegantur. Septima nervorum  
coniugatio versus occiput magis originem habet suam: sed à cere-  
bro & ipsa, non à cerebello, ut Galenus voluit: varijs radicibus,  
perexiguus referta est; illi proprium foramen dicatum est obliquum  
in occipite: ubi vero calvariam egressa est, versus anteriora primū 10  
reperit; deinde scinditur in nervulos complures ad musculos linguæ,  
hyoidisq; & laryngis delatos: quorum maior sub maxilla inferiori  
discurrit, nec non sub lingua usque ad eius extremum, ut illam sensus  
in universum, motusq; participem reddat. Quartum vero par, ut  
diximus, gustandi sensum illi priuatim defert: linguæ enim munus  
inter reliqua est saporum discretio. Atque hæc sunt breui descriptæ  
septem nervorum coniugationes, de quibus tum veteres, tum re-  
centiores meminere. Tamen duo alij nervuli adhuc restant in cal-  
varia, & ipsi describendi, ex quibus alterum olfecit Vesalius no-  
ster, alterius (quod sciam) nemo ante me quicquam meminit. 20  
Inquit itaq; Vesalius nervum hunc esse quinti paris radicem; forte  
ne ab aliorum Anatomicorum placitis facile abscedere velle videretur,  
aut nervorum historiam confundere. Mihi vero octavum par  
nervorum cerebri videtur esse, quod vnus Vesalius vidit quidem:  
sed inter quintæ coniugationis radices adnumeravit. Sub basi ce-  
rebri versus anteriora incedit; & per proprium foramen in sphenoi-  
de collocatum transit ad musculum temporalem, latitantemq; &  
Massetera: & à quinto nervorum coniugio illius distat origo. No-  
num par nervorum, cuius neq; Vesalius ipse verbum fecit, quodq;  
ego primus inveni, est nervorum exilium par ortum ducens à binis 30  
illis cerebri processibus, qui nates appellantur penes testes; tenues  
fatis sunt, & exiles, ut dixi: faciem versus accedunt, transeuntq;  
apud tertium, & secundum par, atque in tertium palpebræ muscu-  
lum inferuntur. ramulus tamen huius noni paris ad quintum muscu-  
lum oculi deferitur. Sed si quis rei novitate commotus, hæc duo pa-  
ria nervorum non admittat, sed aliorum radices esse contendat, ni-  
hil moror. Mihi sat est locum admonuisse, digitoq; fontem osten-  
disse; ne aliquis in cerebro nervus prætermisus negligentia nostra  
videatur. Animaduertendum præterea est Galenum velle nervos  
sensus deferentes ab anteriori cerebri parte exoriri, motiuos vero  
dictos



dictos à posteriore. Sed pace Galeni dixerim (quem tamen semper maximi feci) sensus dictat, motiuos, duosq; quoq; ab anteriore parte originem ducere, vt secundum, tertiumq; coniugium. Adde neruos omnes, cum à visorijis, & sensum deferentibus discesseris, non modo sensum, sed motum etiam deferre. Sed cum historiam neruorum cerebri, breui, & dilucide absoluerimus; tempus est, vt de spinali medulla pertractemus, quæ elongatum cerebrum videtur esse.

Nerui motui oriuntur quoque ab anteriore cerebri parte. Omnes nerui præter opticos deferunt sensum & motum.

10 De Neruis medullæ spinalis post caluariam. Cap. IIII.

CVM Cerebrum hæcenus descripserimus, & à cerebro exorta nouem coniugia neruorum quanta potuimus breuitate, ac minori quo fieri potuit, vel nullo potius contradicendi studio, iam illi sunt nobis nunc nerui describendi, qui à spinali medulla post caluariam exoriuntur: sed antea dicamus quid ipsa sit medulla spinalis. hæc nihil aliud est, quam cerebrū oblongum illud quidem per vertebrae & sacrum os deductum. est autem eadem cū cerebro substantia, quare nihil mirum est, si quemadmodum cerebrū ipsum absq; vlla anatomicorum controuersia frigidum est, ita frigida ipsa quoque sit, quidquid dicat Peripateticorum princeps Aristoteles, qui cum frigidissimum esse cerebrum asseueret, calidissimā esse inquit spinalem medullam. quæ sententia ita absurda est, vt tanto philosopho indigna non esse non possit. Sed ad rem redeamus. licet spinalem medullā perpetuo dicamus eadem à summo ad imum nomenclatura vtentes, scito tamen substantiam eius in homine ipso nō esse quemadmodum in brutis ad extremum vsq; medullarem, sed in homine ad lumborum initium vsq; duntaxat medullam refert. Differt spinalis medulla à cerebro in duobus: nam primo cerebrum dia-  
30 lem & fistolem habet instar cordis vt suo loco explicauimus, at spinalis medulla motu caret: secundo per ossa quæ mouentur deferri medullam hanc conspicaberis: stabilia autem sunt cerebrum ambiecta cranei ipsius ossa. duplex igitur est spinalis medullæ principium, ex quibus hoc maius, illud minus existit, maius à cerebro emanat, à cerebello minus. quod à cerebro deducitur vnicum est, quod autē à cerebello bifidum, itaq; tum in dextrum, tum in sinistrum diuiditur. sed ad maiorem spinalis medullæ originem reuertamur. ita à basi cerebri proficiscitur, vt ipsa cerebri basis videatur esse. si enim originem illius vt circumscribitur vere consideretur, à neruorum optitorum origine parum distare comperietur. Oritur igitur, vt apertius

Cōtinuatio huius tractatus cum superiore.

Medulla spinalis quid.

Spinalis medulla frigida est. Aristotelis error.

Substantia medullæ spinalis qualis sit in homine. Differentia cerebri, & spinalis medullæ.

Spinalis medullæ principium duplex.

Principium spinalis medullæ maius.

Ortus spinalis medullæ vnde.

Error non nullo-  
rum.

Spinalis medulla  
ubi crassior.

Galenii & Vessalii  
error.

Inuolucrum spina-  
lis medullæ.

Galenii error.

Spinalis medulla  
cum progreditur  
fit neruea.

Cursus læsio in in-  
feriore parte spina-  
lis medullæ fit maior.

Galenii error.

Spinalis medullæ  
usus.

apertius dicamus, spinalis medulla ab anteriore cerebri parte. hic enim hic candide lector eius origo sumenda est, non aut, ut nonnullis placet, cum vertebrae ingreditur: quo loco nulla donatur circumscriptio. Cum itaque tam excelsio in loco eius origo constituenda sit, ita enim vere exoritur, adnotandum est cogi nos fateri, tertium, quartum, quintum, sextum, septimum atque octauum neruorum par non à cerebro, sed à spinali medulla exoriri. Dum hæc per foramen occipitij egressa, vertebrarum foramen primum ingreditur, in hoc primo descensu crassior est aliquantulum, quam in reliquo itinere. Cum vero ad summum thoracem peruenit usque; ad summitatem ossis sacri equali crassitie cernitur, licet Galenus & post ipsum Vessalius in hoc mire decipiantur existimantes spinalis medullæ substantiam neruis gignendis absumi: est enim ratio ipsorum voluntaria potius verisimilisque, quam vera, cum sensu oppositum pateat, quod scilicet in sacro duntaxat osse tenuior existit. Caluariam egrediens medulla spinalis tum pia, tum dura matre circundatur, itaque neruos quos ex se promit circundat, cumque illi per ossa quæ mouentur transeundum esset, quod cerebro minime usu venit, natura aliam membranam tenuem superinduit, ne ab ossis duritie læderetur. In qua membrana tota errat via Galenus noster in hoc parum anatomicus, nam hanc, quam tertiam tuniculam libro de ossibus appellat, ligamentum esse existimauit, quo vertebrae vnà connecterentur. quæ sententia falsa admodum est: nam vertebrae proprijs ligamentis nullo sunt pacto destitute, quemadmodum in nostro tractatu de ligamentis fusius explicauimus. quis enim non videt tuniculam hanc tenuem colligandis ossibus, quæ tantopere mouentur (sæpe namque multumque; mouentur vertebrae ipsæ) idoneam nullo pacto fuisse? Spinalis igitur medulla ad extremum usque; thoracem duntaxat medullosa est, sed cum progreditur neruosa euadit, hoc est funiculorum instar, cuiusmodi ipsius neruos cernes. hoc autem ob ipsius diuisionem factum puta.

Ex hac historia causam facile venaberis, quid sit quamobrem materia per spinalem medullam descendente læsio maior inferiore parte presentatur. In promptu causa est. quoniam hoc loco neruea est spinalis medulla, cum in alijs partibus medullam præ se ferat. Medullosi autem vocem huic substantiæ improprie (ni fallor) adscribimus, cum illi medullæ quæ ossa alii dicuntur, nihil certe simile habeat, sed cerebri potius substantiæ affinis esse videatur. præterea falsum illud quoque; esse palam prospicies quod Galenus secundo de temperamentis libro scriptum reliquit; spinalem scilicet medullam ea medulla qua ossa nutriuntur molliorem esse. Creauit illam altissimus rerum

10

20

30



rerum omnium opifex, humanæq; fabricæ admirabilis architectus vt ab ea nerui exorirentur, qui tum sensum tum motum ad reliquas corporis partes deferrent, quæ omnia, motum inquam & sensum cerebrum suppeditat. Igitur posteaquam è caluaria exijt hoc neruorum coniugium inter occipitium, primamq; ceruicis vertebra primum neruorum par adeo clanculum emittit, vt mirabile videatur esse spectantibus, atque adeo naturæ miracula speculantibus & introsipientibus, quo pacto exeat ne in motibus capitis lædatur. Exit itaq; hoc primum neruorum par (cur enim hoc quod est

De primo pari neruorum medullæ spinalis.  
Mira naturæ providentia.

10 pulcherrimum non repetemus?) à posteriore capitis parte inter occipitium primamq; vertebra. quod vt fieret facilius cavitatem quandam parua obseruato à natura factam tum in occipitio tum in primæ vertebra parte illa, quam in spinam definire oportebat. Post exitum hæc neruorum coniugatio in nerulos spargitur ramulosq; perexiguos, neque id mirum, est enim ipsa quoq; exigua. ad illum musculorum chorum distribuuntur, quos paruulos esse, capitq; deseruire suo loco diximus. oriebantur autem à prima vertebra atque ad occipitium deferebantur, rursus ab occipitio ad vertebra secundā. sed ad primum neruorum par redeamus. prius quàm ex-

Primum par neruorum spinalis medullæ.

20 eat supra spinalem medullam reflectitur, quæ res spectatu pulcherrima est, & iucundissima. At secundum neruorum coniugium seu par, cū per vertebra latera egredi nequeat binis, principijs insignitur. Ex quibus quod maius existit per posteriora emergens fertur hinc atque hinc per latera spinæ secundæ vertebra. vbi egressum est in furculos complures diuiditur, qui sursum reflectuntur & ad capitis cutem, ad aures & ad nonnullos musculos tendit. alterum eius principium, quod est minus, per anteriora egreditur inter primam secundamq; vertebra à dentis lateribus (scitis autem nomine dentis quid sit audiendum cum de secunda vertebra ceruicis fit

De secundo pari neruorum spinalis medullæ.

30 mentio). Distributio vero huius est ad quintum musculum laryngæ atq; œsophago communem. Tertium par neruorum spinalis medullæ exit per foramen secundæ & tertiæ vertebra commune ab earū lateribus, vt de alijs audistis, deinde in quatuor furculos primo diuiditur, postmodum in alios complures, adeo pulcherrima fiat huius tertij neruorum coniugij distributio tum in nonnullos capitis musculos tum in oblongum illum quadrangularem à carnea membrana profectum, qui labrū oblique deorsum trahit. distribuitur etiam ad longum illum musculum scapulam sursum trahentem. Et ad cutem colli disseminatur. Quartū par inter quartā tertiāq; vertebra exire videbis per foramen vtriusq; cōmune. quod de sub-

De tertio pari neruorum spinalis medullæ.

De quarto pari spinalis medullæ.

sequentibus quoque omnibus intelligendum est, quod memoriæ manda. nolo enim hoc idem de exitu neruorū per foramen duabus vertebris commune amplius in hoc tractatu repetere. Vbi exiuit secatur in surculos multos, ex quibus aliqui ascendunt, descēduntq; alij per posteriorem partem reflectuntur. Hæc summa est magnam esse huius quarti neruorum paris distributionem. neruuli insuper ab hoc mittuntur ad musculos ceruici deferuientes, necnon ad musculum cucularem dictum. Ex anterioribus autem nonnulli in musculos stomacho substratos inferuntur, & vnus ex his tenuis admōdum vnitur cum ramo quinti paris, & quintus cum sexto, ex quibus 10 tribus principijs nerui illi constituuntur, qui ad septum transuersum proficiscuntur descendentes iuxta mediastinum, ac supra pericardium. Quinti paris exitus est inter quartam & quintam vertebrā. hoc in multos neruos diuiditur, tum anteriores, tum posteriores. ramus anterior qui magis est cōspiciuus vnitur cum ramo quarti paris, & in quibusdam ramulum à subsequētib; suscipit. hic neruus nunc à tribus constructus descendit ad latus œsophagi per anteriora vertebrarum colli, descenditq; semper ad nerueam vsq; septi transuersi partem, in qua parte huius nerui terminus adest. Sed in nonnullis (vt iam supra attigi) exoritur à quarto pari. Sed hoc raro 20 debis, nam sæpius oritur à quinto. Quum primum autem ad thoracis cavitatem peruenit, natura prudens, ne ob asiduum pulmonū motum disrumpetur, membranis illum colligauit supra infraq;, & vt dixi trāsit supra pericardiū. Huic neruo vena se comitem præbet. At inquires cur summus rerum opifex Deus tanta arte hunc neruum muniuit. ego vero respondebo illud ob septi transuersi nobilitatem factum fuisse: est enim musculus rarus ac nobilis, immo vero musculorum omnium humani corporis nobilissimus existimatur. Quod reliquum est huiusce quinti neruorum paris varie distribuitur, ramum namq; vena atque arteria comitante per medium illud 30 mittit foramen, quod in posteriore scapula situm est, ibiq; ad musculos diffeminatur è scapula exortus, quiq; humero dicantur. Alius ramus descendit per colli latera, vt ad epomida & ad cucularem musculos distribuatur. Alij rami tendunt ad humerum, alij ad quadratum musculum labra oblique deorsum trahentem, item ad quartum musculum hyoidis. alij rami cavitati scapulæ mandantur, vbi ad musculum in eius cavitare latitantem diffeminātur, & ad secundū thoracis musculum, nec non ad cutem ibi positum. Et quoniam quinta hæc neruorum coniugatio ad musculos humero deferuientes diffeminatur, placuit Vessalio illam inter brachij neruos connumerare.

Ego

De quinto pari spinalis medullæ. Diuisio & distributio.

Septum transuersum.

Vessalius excusaf.



Ego vero quoniam non transit vnà cum quinque nervis manus, illam inter manus nervos nullo pacto adnumerabo. qui manus nervi quoniam eorum Anatome fidelis & perspicua exoptata admodum est, atq; expetita, quippe quæ scitu digna sit, ego de illis mox priuatim agam capite peculiari, vt omnia faciliora reddantur, & perspicua magis.

Opinio propria.

Cur de nervis manus particulatim agat.

De Nervis manus.

Cap. V.

- 10 **M**ANVS, vt diuino Aristoteli recte videtur, organum est organorum, atq; organum ante organa, quæ eo quo cernitis officio fabrefacta est, vt liberis minimeq; impeditis organis prædita esset, & vt sensu tactus acerrimo polleteret, quinq; nervuorū paria natura ad manum ipsam relegat, tria nimirum ad extremos digitos, duo ad extremam vsque manum. quæ quinque memorata paria nervuorum à spinali medulla ortum ducunt egressa per cōmunia foramina vertebrarū colli subsequentiū & à prima thoracis. vniuntur hæc adeo postquā egressa sunt, vt hoc ab illo nervuorum coniugium distinguere difficillimum sit vel illi qui magnos progressus in anatome fecerit, separantur tamen deinde, videnturq; rete quodam constituere, vel
- 20 quid simile cordulis illis & infulis, quæ in Cardinalium galeris Romæ cernuntur. Hæc quinq; paria nervuorum eodem itinere sub clavicula incedunt, nec non ad scapulæ processum internum, quo loco sociæ quoq; transeunt vena basilica, & axilaris arteria, propterea ne mireris si Anatomes peritus medicus vulnera hac in parte accepta formidosa esse & timoris plena assistentibus prædicet. Sed de singulis separatim agamus. Primum igitur par nervuorum manus quod inter quintam ac sextam vertebra fertur, vbi ventum est ad cavitatem sub alis nervum emittit ad primum thoracis musculum, alium ad secundum scapulæ, ramum quoq; alium ad primum & secundum cubiti musculum, à quibus flectitur; transit deinde (si eius progressum persequare) sub primo musculo bicipiti per internam humeri partem, sed post cubiti flexuram venæ communi se socium præbet, atque vnà secum ad extremam manum deducitur, interim varijs in locis ramulos ad cutem ipsam mādāt. Secundi paris transitus per eundem est locum de quo in primi paris itinere verba fecimus, tres nervos ad musculos humero famulantes mittit, ex quibus vnum per illud scapulæ foramen exit, quod sub ala latitat, varie primo distribuitur, deinde recta fertur ad flexuram vsq; parte humeri anteriore, inter cubitum ac radius præteriens, in flexura vero ramulos mittit ad quartum musculum, quintum ac sextum, à quibus
- 30

Manus est organū organorum.

Manus est organū ante organa.

Cur tot organa in manu.

Cur tanta arte cōstructa

Cur quinque paria nervuorum in manu.

Ortus quinque parium nervuorum. Vbi vniuntur.

Vbi separantur.

Cur vulnera ad scapulæ processum internum sint lethalia.

De primopari nervuorum manus.

Post cubiti flexuram nervus cum vena communi.

De secundo pari.

Vesalij error .

In uola manus  
nūc quinque ner-  
ui nunc septem .

De tertio pari .

Musculum à quo  
latus tendo dila-  
tatur primus in-  
uenit .

vnuerſi quinq; digiti ſeſtuntur. at vbi radij medium prætergreſſum eſt, neruulus emittitur ſatis apparens, profundus, qui incedit adhærens ligamento illi, quod inter cubitum radiumq; ſitum eſt, tandem in muſculum quadratum implâtat, qui, vt noſtro de muſculis tractatu explicauimus, penes brachiale ſitum manum agit in pronum, quamuis Veſſalio noſtro ſecus eſſe videatur. Maior huiuſce nerui truncus cum magis deſcendit atq; inferiora petit, tranſit ſub ligamento brachialis interno, quo loco ramulos parit muſculis pollicis dicatos, & alios ad portionem eorum muſculorum quos oblongos eſſe diximus, & à quinti muſculi tendinibus exoriri: alios inſuper ramulos mittit ad partem illorum muſculorum, qui à poſtbrachiali exorti, primos articulos digitorum ſeſtunt. hoc itinere peracto in ipſa manus vola in quinq; neruos, quod plurimum eſt, ſed quâdoq; in ſeptem ſecatur, horum quinq; duo per latera pollicis ad illius extremum uſq; pergunt: interim ad cutim ſurculi ex illis pullulant; duo alij ad indicem vel potius ad indicis extremitatem uſq; mittuntur, cutim interim propaginibus ſubeuntes. quintus vero per internam digiti illius partem graditur, qui medius appellatur, ſed in quibus ſeptenario numero donatur (donatur enim in nonnullis) ſextus per externam regionem medij digiti, ſeptimum per internam auricularis iter habet. Tertium par neruorum qui manui addiſti ſunt per eundem locum iuxta internum humerum & inferiorem cubitum fertur, deinde ſupra articulum inter olechranon atq; internum humeri tuberculum, vbi ſurculos proſert, qui per primum muſculum à quo fit latus tendo diſſeminantur, item ad ſecundum tertiumq; brachialis muſculum, deinde progreditur iuxta longitudinem cubiti internam, cuius dimidiū, & amplius vbi præteriit in duos ramos inæquales ſinditur; alter nanq; maior eſt, alter vero minor, & eorundem alter introrſum fertur extrorſum alter. Interior tranſit ſub ligamento brachialis interno ibiq; ramuſculos producit ad primum illum muſculum, quem ego primus obſeruauī latum tendinem dilatantem, deinde ad ſextum à quo minimus digitus ab alijs deducitur. ſurculos item proſert alijs muſculis dicatos qui digitos extendunt, quos à tendinibus quinti muſculi tertium digitorum articulum ſeſtentis oriri ſuo loco diximus. mittit præterea ramuſculos alios ad reliquos muſculos primum internodium ſeſtentes, quiq; oſſibus poſtbrachialis adhærent, hoc peracto in tres neruos diſſecatur, & nonnūquam in quinque, qui in extremos digitos terminum habent, per latera auricularis, & anularis delati, licet in quibuſdam in medio digiti medij ſiſtat. mittit inſuper ramuſculos ad cutem, atq; ad volam ipſam.



ipsam. quamobrem pars interna manus adeo acuto atq; exquisito sensu tactus prædita est. minor ramus per exteriora illius transit, & supra brachiale reflectitur, in tresq; ramos finditur; & nonnunquam in quinque; per superiora postbrachialis, & per latera auricularis atq; anularis, nec non per medij dicti digiti medietatem, ad quorum extremum usq; deferuntur, quemadmodum de internis diximus. In hoc tamen differunt, quod interni externis multo maiores existunt: fuitq; hoc prudentis naturæ optimum consilium, quippe quæ non ignorabat externa internis facilius lædi posse. atq; hætenus de ter-

Cur interna manus adeo sentiat.

10 pari neruorum manus; nunc de quarto. Quartus neruus, seu quartum coniugium, omnibus neruis qui in manu cernuntur maius existit, eodem cum alijs exitu atq; itinere, sed cum ad humeri dimidium plus minus deuentum est, ad exteriora illius ac superiora reflectitur, atq; ex hoc loco paruuli neruuli emanant ad binos musculos cubitum flectentes, deinde ad alios musculos exteriores, & ad humeri, cubitiq; cutim. delitescere quoque comperies inter alios musculos quartum hunc quem nunc describimus neruum, & per cubitum ac radium tēdere ramulos ad illos etiam musculos emittentem qui à medio cubito exorti pollicis suam operā præstat. Sed cum ad

De quarto pari neruorū manus.

20 brachiale prouenit illico quasi truncus in quinque; ramos scinditur, ex quibus bini ad pollicem relegantur ad indicem bini, quintus autem ad medij digiti extremum usq; instar aliorum. Ex illis autem quos ad pollicem proficisci dicebamus furculi paruuli exiliunt ad musculum qui inter pollicem & indicem locum habet; illud etiam præter hætenus dicta obseruato, magnā esse huius quarti nerui ad exteriores cubiti musculos distributionem. At quintus tenuis admodum est & cutaneus, cuius ramuli humeri, cubitiq; cutem sensu prædita reddunt; mittit quoq; ramos sub ala. quod reliquum est venam basilicam comitatur, propterea huius nerui idem est cum basilica de-

De quinto pari neruorū manus.

30 ductus, è quo furculi varie per cutim ipsam distribuuntur, & tandē ad extremam manum desinit. ab hoc eodem neruo quinto sub iugulo mittuntur nerui ad septimum capitis musculum, ad primum & quartum hyoidis, ad primum & secundum thoracis, ad septimum humeri, nec non ad binos musculos ceruicem in latus trahentes. atq; hic est locus è quo neruuli ad membranam carneam demādantur, deinde ad colli cutem. Itaq; se habet neruorum manus distributio cuius historiam breui profecuti sumus. sed antequam ab hoc argumento discedamus scito furculos & propagines exiguas neruorum manus eodem pacto in omnibus hominibus non distribui, licet in truncis ipsis raro admodum varietas notatu digna reperiatur. si enim

enim in hoc per medium musculum tenderet in illo prope latera, nihil est, quod in re Anatomica versatos in admirationem trahat, & quoniam in illis qui vulnerantur quandoq; sensus amittitur, licet motus integer maneat, in alijs contra motu amisso sensum permanere complures existimarunt duas neruorum differentias vbiq; reperiri, vel vt apertius dicamus vbi neruos adesse oportuit, duplex adesse neruorum genus, alterum motum afferre, ab altero sensum afferri, sed hæc opinio in illis mea quidem sententia locum habuit, qui veram neruorum distributionem ignorabant, tu vero scito neruos ad cutim desinentes, quoniam cutis motu caret, sensum duntaxat afferre, eos vero qui musculis additi sunt sensum motumq; illis impartiri. Quocirca si nerui cutis fauciatûr, aut si illos noxia materia laescit & detinet atq; præoccupat? quid mirum si cutis ibi non sentiet: & quoniam nos dum cutim tangimus cutis nobis duntaxat sensus occurrit. neque enim sunt in superficie musculi, si illi nerui lædentur, qui in musculos inferuntur, illis illæsis qui feruntur ad cutim amittetur quidem motus, sed perstrabit sensus: quod si vtrique noxa illata fuerit, & sensus & motus peribunt. hæc autem noxa intelligitur illata neruo priusquam musculum in loco qui retrahi possit & contrahi, quo facto vniri & coalescere nullo pacto possit. si enim 20

Cur in vulneratis quandoque sensus, quandoque motus amittatur quandoque vterque.

Laeso neruo quando nō amittatur neque sensus neque motus.

nerui læsio contingat in ea parte quæ iam musculum ingressus erat, vniri potest, neque sensus motus ue amissio perseuerabit, quemadmodum ego sæpenumero expertus sum in multis ægris, qui mihi in dies innumerabili multitudine curandi proponuntur, quod etiam Ludouico Philippino viro docto familiari meo anatomes studioso lubens ostendi.

## De Neruis thoracis. Cap. VI.

Cur nerui thoracis sint minores neruis manus. Nerui thoracis sunt paria vndecim. Error Vessalij.

Ortus.

Cur de neruis thoracis agat in vniuersum.

Diuisio & distributio.

**T**HORACI nerui multo minores contigere, quàm manus, neq; 30  
Tenim tantos esse necessarium fuit. sunt autem vniuersi paria vndecim, non duodecim vt Vessalio placuit, quem miror nō animadvertisse, cum tamen oculatissimus fuerit, vertebrae licet duodecim numero sint, tamen foramina vndecim habere, non plura, totidemq; esse costarum interualla. Oriuntur hi quoq; à spinali medulla; exeunt vero è foraminibus vertebrae thoraciq; communibus: neq; tamen ab his vt à neruis manus rete constituitur. & ne longam adeo prolixamq; de neruis thoracis historiam texamus (quo enim pacto possemus prolixitatem effugere, si vnumquemq; sigillatim & seorsum describeremus) de omnibus simul hæc audito. Post eorum egressum è fora-



è foraminibus vertebrarum bipartitos cernes, nō tamen æqualiter.  
 etenim ex his alter maior, alter minor existit, & alterum anteriora  
 versus, alterum versus posteriora reflecti secundo facile cernes. an-  
 teriores igitur sub costis progrediuntur per partem inferiorem, ubi  
 sinus ille per costarum longitudinem cernitur, de quo in libro de  
 Ossibus proprio capite loquuti sumus. atque hoc comitantur rami  
 venæ sine pari, nec non rami arteriæ magnæ, quæ tria vasa, nervus  
 inquam, vena, atque arteria, per eundem locum transeunt, nimi-  
 rum sub succingente membrana à vertebra ad sternon vsque, iuxta  
 10 longitudinem costarum atque earum cartilaginum, tanquam lineæ  
 paralelæ & æquidistantes prope musculos intercostales incedunt:  
 in quos externos inquam, atque internos ramulos mittunt. qui  
 musculi numero sunt sexaginta octo, vt in nostro tractatu de muscu-  
 lis latius explicauimus, præter hanc quam hætenus descripsimus  
 nervorum thoracis distributionem, alij sexto thoracis musculo sen-  
 sum afferunt in parte eius interna collocato, quiq; anteriora ipsius  
 constringit. A superioribus autem nervi fluunt per primum hume-  
 ri musculū, nec non per secundum scapulæ: deinde ramuli alij profi-  
 ciscuntur ad mamillas & ad mamillarum papillas deducti ex his  
 20 nervis, qui ordine consequuntur, deinde deorsum magis à nervis  
 qui in media thoracis regione collocantur pullulant nervi qui ad mus-  
 culos abdominis obliquos descendentes demittuntur, in quo ma-  
 gna horum fit distributio. à postremis autem thoracis nervis alij  
 deciduntur, quibus gaudet septi transuersi pars carneæ. Quod restat  
 horum anteriorum nervorum tum ad cutem thoracis, tum ad partem  
 cutis abdominis distribuuntur. Nervos item mittunt ad musculos  
 œsophago substratos, & ad radices costarum. cum his autem ner-  
 vis sexta nervorum cerebri coniugatio implicatur. Altera horum  
 thoracis nervorum diuisio ad posteriora ipsius reflectitur, & à supe-  
 30 rioribus enixi nervi sensum deferunt primis, secundisq; capitis mu-  
 sculis, ad musculos cervicis ad quintum sextumq; humerum circum-  
 agentem, ad primum & quartum scapulæ, ad thoracis tertium, &  
 ad scapulæ cutem, alij proficiscuntur ad musculos dorsales, & ad  
 quartum thoracis ad cutim dorsi distribuitur. illud tamen animad-  
 uertendum est, hanc cutaneam nervorum distributionem non esse  
 in omnibus æquata, propterea neq; hic, neque alibi in alijs corpo-  
 ris partibus superficialijs certo ordine atque examusim describi ab  
 Anatomico quantumvis accurato potest aut debet: nam neq; certū  
 ordinem, neq; numerum certum observare possumus, quoniā nunc  
 in plures ramos, nunc in pauciores sese trunci exerunt atq; explicat,  
 & nunc

Cutanea distribu-  
 tio nervorum nō  
 est in omnibus  
 eadem.

& nunc altius, nunc decluius eorum fit distributio atque iter.

De Nervis lumborum. Cap. VII.

Cur post nervos  
thoracis agat de  
nervis lumborū.

Nervi lumborum  
maiores nervis  
thoracis.

Cur sint quinque  
paria nervorum  
lumborum licet  
quatuor tamen  
sint foramina in  
vertebris lumbo-  
rum.

De primo pari ner-  
uorum lumborū.

De secundo pari  
nervorum lum-  
borum.

Error nonnullorū

Quid sit crema-  
stires.

**Q**UONIAM Lumborum regio, vt in libro de Osibus diceba-  
mus, thoracem immediate sequitur, post historiam de nervis  
illius, lumborum nervos describere operæpretium duxi. Sunt lum-  
borum nervi thoracis nervis maiores. & quamvis ratione superius  
adducta, dum de numero nervuorum thoracis loqueremur, cum in  
quinq; vertebriis lumborum quatuor duntaxat foramina reperiātur, 10  
quatuor nervuorum paria solum, non quinq; esse deberent, sunt ta-  
men coniugia nervuorum huius partis quinq; numero, quoniam in-  
ter extremas thoracis vertebrae & primam lumborum incedit pri-  
mum nervuorum par, quod cum ab vltima costa recedat inter lum-  
borum nervos potius quàm thoracis adnumerandū est. adde quòd  
ventri inferiori deseruiunt non thoraci. Hæc itaq; prima coniuga-  
tio nervuorum, qui lumbis additi sunt, egreditur per foramen illud  
commune, quod est inter duodecimam thoracis vertebra, & lum-  
borum primam. tenuis est satis & sub peritoneo progreditur. post  
egressum finditur in ramos binos, quorum alter altero maior existit. 20  
qui maior est ad anteriora quidem fertur, sed prius ramusculos pa-  
rit in principia septi trāsuersi: quod septum à corporibus vertebra-  
rum lumborum exoriri suo loco diximus. alios insuper ramulos mit-  
tit ad principia quinti femoris musculi cognomēto lumbalis, & alios  
ramos ad musculos abdominis. qui vero est minor nervus ex hac  
prima coniugatione ad posteriora reflexus in musculos dorsi termi-  
natur. Secunda coniugatio exit inter primam secundamq; lumbo-  
rum vertebra, sub peritoneo graditur, & sub quinto femoris mu-  
sculo, in quem ab hoc quoq; coniugio ramuli immittuntur. assurgit 30  
deinde, sub peritoneo tamen, & à summo osis ilij ramus deceditur,  
qui abdomen exiliens primis femoris musculis & tibiæ sexto sensum  
motuinq; afferunt. at ramus alius mittitur ad sextum musculū femo-  
ris & ad tibiæ primum, superataq; parte superiore osis ilij ad femo-  
ris cutem. ab hoc eodem secundo pari exoritur nervus tenuissimus,  
& oblongus, qui vasa seminaria comitatur, & tandem in testiculū  
definit. quem nervulum nonnulli cremastiras appellant, qui mire  
decipiuntur: neq; enim nervulus hic quem nunc describimus, neq;  
vasa seminaria cremastires dixeris, sed fibras illas carneas in darto  
collocatas: illæ fibræ carneæ, carneæ inquā illæ fibræ darti, crema-  
stires vere sunt, nō vasa seminaria aut nervulus in testem immissus.  
Exit



- Exit tertia neruorū lumborum coniugatio inter secundā tertiamq; vertebram, sub peritoneo defertur, nec non sub quinto femoris musculo. Primus ramus qui ab hoc coniugio deciditur, transit sub os pubis prope ilium os, atque hic bifurcatur (cur enim voce in scholis nostris trita non vtamur?) atque eius pars altera per superiora fertur cute tenui in genu ipsum definens, altera comitatur venā saphe-  
nam nuncupatam, reliquam portionem huius nerui post dorsales musculos cutemq; reflecti videbis. Quarta coniugatio è tertia quartaq; vertebra emergit (est autem lumbalium neruorū maxima)
- 10 fertur sub quinto musculo femoris, & sub pubis os, comiterq; comitatur venam atque arteriam in ipsum inguen: quo loco neruulos profert qui tum peni, tum scroto deferuiant, sed cutanei sunt, neq; profundiora petunt. in hac eadem inguinis regione in septem postmodum ramos secatur, qui ad omnes anteriores musculos distribuuntur, qui partim tibiæ, partim femori famulantur. Ex his ramis nonnullos ad genu vsque descendere obseruatote. Quinti paris egressus est inter vertebra quartam ac quintam, deinde in duas partes instar aliorum diuiditur. iter maioris nerui est sub peritoneo versus anteriora transiens per foramen situm inter os coxendicis pu-
- 20 bis, atque ilij, atque hinc neruuli deciduntur ob nonum decimum musculum femoris, quod in girum mouet. nec non alios ad septimū & octauum femoris eiusdem, & alios ad penis musculos, item ramos alios ad vesicam mittit, & in mulieribus non modo ad vesicam, sed ad vterum quoq; cui præter sextum par neruorum cerebri ab hac etiam quinta lumborum coniugatione neruuli obtigere. atq; hæcenus de prima parte. Secunda vero reflectitur post musculos dorsales, & ad cutim, quod à quarto quoque coniugio fieri dicebamus. Atque hic sunt quam breuissime descripta quinque paria neruorū lumbalium, à quibus prius quam discedo adnota illa postea quam
- 30 exiliere, primum par cum secundo connecti, secundum cum tertio, tertium quarto, quarto quintum eodem prorsus pacto: quæ implicatio similis est brachij neruorum implicationi. Notandum insuper est licet hæc quinque neruorum coniugationes descriperimus, non inueniri tamen in omnibus hominibus totidem; cum quandoque quatuor duntaxat inueniantur: propterea cum quartū & quintum par in nonnullis vniantur, ex hisce duobus vnum duntaxat par resultat, & efficitur.

De tertio pari neruorum lumborū.

De quarto pari neruorum lumborū.

De quinto pari neruorū lumborum.

Quomodo hæc paria neruorum lumborum connectuntur.

Lumborum nerui non sunt semper quinque paria.

## De Neruis ofsis sacri, &amp; Pedis. Cap. VIII.

Ortus.

Nervus nostri cor-  
poris maximus.

Musculus liuidus.

Vfus iamenti in  
er tibiam & fi-  
bulam.

CVM hi nerui particulatim & accurate describi consueuerint, nos eūdem ordinem sequentes, de his distincte quantū in nobis erit agere conabimur: qui nerui, pedis etiam nerui non iniuria dici possunt. sciendum itaque hosce exilire inter vltimas lumborum vertebrae & ofsis sacri summitatem, item à primo, secundo, tertioq; ipsius ofsis sacri foramine. at quum primum hæc quatuor neruorum principia exiuerē vniuntur, maximum nostri corporis neruum constituentes, qui sub peritoneo ab interna abdominis parte ad externam repit versus clunes, transitq; inter coxēdicem & coccigem supra quartum musculum illum, à quo femur circumagitur. vbi exijt prope maiorem trochantira nonnullos mittit neruulos ad tres musculos à coxendice exortos tibiam flectentes, alios quoque ad octauum liuidum dictum musculum, qui & ipse oritur à maiori trochantira, deinde recta pergit per posteriora femoris inter quartum, quintumq; tibie musculum, pene ad flexuram ipsam genu: quo loco in duos insignes ramos diuiditur, ex quibus alter maior, alter minor cernitur. maior posteriorem, minor anteriorem tibie partem occupat: maior rursus sub flexura genu neruulos mittit ad primos musculos extremi pedis. A minori autem trunco neruulum exortum cōspicies, qui in musculum sub poplite latitantem inseritur, & alium in tertium musculum ab exteriori femoris capite exortū. Sed postquam maior truncus flexuram genu præterijt, in alios neruos subdiuiditur, quorum ramus vnus tendit sub duobus primis musculis pedis, quorum parte carnea prætergressa sub cutem repit, in qua per posteriora tibie properat ad extremum vsque pedem. ab altero ramo emanant surculi ad quartum musculum, qui inter posteriores tibie musculos maior existit, deinde per posteriora interioraq; tibie delatus iter habet sub interno malleolo, tendens sub pedis plantam, neruos ad cutim emittens primo ad primum, secundum, & tertium pedis extremū musculum, deinde ad omnes illos musculos paruulos in ipsa planta delitescētes; deinde diuiditur adhuc in neruos decem, ex quibus duo per vnumquemq; digitum ad eius extremum vsq; deferuntur, ramusculos interim ad cutim illorum spargentes. Alter vero ramus profundiora penetrat, & permeat inter tibiam fibulamq; ligamento illi adhærens, quod inter tibiam ac fibulam sitū esse proprio tractatu audistis (quo ligamento posteriores musculi ab anterioribus diuiduntur.) mittit quoque neruulos ad quintum, sextum

10

20

30



sextum septimumq; pedis muscolum. Alter truncus minor sub fibulæ appendice præterlabitur, ad anteriorem partem delatus, quo loco neruulos profert, qui musculis tum à tibia, tum à fibula exortis dedicantur: truncus vero deorsum descendit per ipsius fibulæ anteriora. Quamobrem hic maximopere animaduertas velim lector candidissime, hoc enim scitu est tam necessarium quam quod maxime, si cauterium fieri oporteat, vt ne ad fibulam accedat, sed ad tibiam duntaxat, neque hoc sat est scire quo loco sit faciendum sed addito dum fit causticum, primum muscolum prætereat cautio  
 19 est; nã si magis penetraret hic neruus quàm nuper diximus læderetur, quo læso grauia symptomata consequi solent. vel saltem cauterij locus nunquam pene dolore aliquo destituitur. Reliqua portio nerui huius deorsum fertur sub ligamento, parteq; pedis anteriore transit sub externo malleolo per extremi pedis superiora: & ex hac sede furculi mandantur decimooctauo pedis musculo. quod superest in decem neruulos separatur, qui in extremos digitos inseruntur, & desinunt. ab hoc eodem trunco neruulus alius cutaneus proficiscitur, qui ad extremum pedem vsque progreditur. Post tria foramina osis sacri, sequitur quartum, & quintum in quibusdam, quæ diuersitas à vario osium sacrum constituentium originem ducit: neque enim in omnibus idem est, nam in aliquibus quinq; osibus constat os sacrum, in alijs sex, licet nunquam inuenire possis os sacrum ex tribus tantum osibus constructum, vt Galenus falso existimauit si hominem descripsit, sed simiam non hominem descripsit. In cadauere igitur cuius sacrum os quinque osibus cõstet quatuor aderunt foramina. quod senario numero cõstet quinq; foramina videbis, quæ sita sunt inter os & os, vt abunde suo loco dictum à nobis est. Igitur ex duobus foraminibus subsequenter egrediuntur duo alia neruorũ coniugia, quæ post egressum ipsa quoq; vniuntur neruum gignentia, qui reflectitur & ad musculos narium distribuitur, necnon ad cutem illarum: in internam quoque abdominis partem mittit neruulos ad musculos recti intestini, & in non nullis non modo ad hos, sed ad vesicæ quoq; musculos, immo in nonnullis fœminis ad vterum quoq; atque ad vteri ceruicem, item ad earum vesicæ musculos. alij quoque furculi ad perineum atque ad scrotũ deferuntur. E posteriore vero parte osis sacri per ea foramina neruuli profiliunt parui admodum breuesq;, qui ad musculos dorsales ad nates ad posterioremq; cutem delegantur. Et quoniam Galenus alijsq; Anatomici de neruo quodam loquuntur, quem inconiugatũ vocant, secundum ipsorum sententiam, si vera est, in extrema spi-  
 d 2 nalis

Cauterium in crure  
 vbi faciendum,  
 & quantum profundum.

Os sacrum non cõ  
 stat in omnibus  
 totidem osibus.

Nerui posterioris  
 partis osis sacri.

Neruus inconiuga-  
 tus secundum Ga-  
 lenum vbi esset.

Nervus inconiugatus non datur.

Galenii error.  
Coniugationes nervorum sub coccyge in brutis non in hominibus.

In omni musculo adfunt nervi unus vel plures.

Vesalii error.

Vesalii excusatur.

Negligenda futilia quædam argumenta, & argutio læ medico viro.

nalis medullæ parte deprehenderetur. Ego vt ingenue fateor hûc celebrem nervum inconiugatum hoc loci nunquam comperire potui, licet accurate secaverim huius vnius gratia sæpenumero, sed in omnibus quos hætenus secui pene innumerabiles, comperi extremam spinalem medullam in furculos complures dextros ac sinistros distribui, qui deinde per quartum femoris musculum disperguntur, & per cutem quæ inter nates & ad anum vsq; procedit. De illis autem nervorum coniugationibus sub coccyge prætereuntibus, quas Galenus somniavit nihil attinet dicere, propterea quod nusquam in homine reperiri possunt, cum non adfint. sed priusquam à nervorum historia discedamus illud adnotes rogo, in quovis humani corporis musculo quamvis minimo suum nervum adesse, quod minimû est. nam in aliquibus nervos duos, in alijs tres, quatuor, ac nonnunquâ quinq; videre poteris, neq; iniuria. si enim nervis carerent, musculi neutiquam essent, quamvis oppositum Vesalio nostro videatur. cuius opinio in hoc imaginaria potius quàm vera existit, forte is aliqui indefessus in nervorum distributione, quæ mihi admirabilis esse videtur, cum secundo defessus esset scriptum reliquit musculos aliquos absq; nervis reperiri. Quoniam vero nos in nostra historia de fabrica Humani Corporis cerebrum ipsum nervorum originem diximus, vt reuera existit, cor autem arteriarum originem, & vena-  
rum iecur, non defuturi existimo qui huic nostræ opinioni adversentur probantes nervos arterias venasq; spermaticas feminariasq; nostri corporis partes neque à cerebro, neque à corde, neque à iecore exoriri posse, sed à semine duntaxat. Sed nos, qui solidam Anatomem profite-  
mur, sensuq; vegeti vt in humanorum corporum dissectione conamur, has futiles & apparentes ratiunculas cum rei veritate nequaquam consentientes, & medico futuro inutilis, tanquam nullius pretij, bona lectorum venia reicimus.



# REALDI COLVMBI CREMONENSIS

DE RE ANATOMICA

LIBER IX.

## DE GLANDVLIS.

10



LANDVLA nihil aliud est (vt ad eius descriptionem immediate deveniamus) quàm corpus rotundum, oblongumq; quod plurimum est rarum, & poris refertum. diuersis in locis varias ob causas positæ fuere adenes, siue glandulæ. est enim earum multiplex vsus, aliæ venis, & arterijs instar lectuli sternuntur, vt illas

Substantia glandosa qualis.

Vsus glandularum multiplex.

In natura non datur vacuum.

20

detineant, ne ue lædantur. aliæ vt sedes vacuas replent; non enim datur in natura vacuum; aliæ vt humiditates suscipiant, & continent; ne ob motum loca exiccarentur; aliæ vt excrementa suscipiāt.

Prime in caluaria.

atque id genus glandulas, siue adenes in varijs corporis nostri partibus reperias. Primæ in caluaria hoc pacto, vna in cerebro, hoc est inter cerebrum, cerebellumq; quam conarion pineale appellāt, de qua in tractatu de cerebro verba fecimus; hæc spherica est, oblonga tamen: alia in sella sphenoidis extra crassam membranā iacet, in quam peluis, siue infundibulum desinit. Quid autem sit sella cunealis, dictum à nobis est in lib. de Ossibus. & hæc illa est glandula cerebri excrementa suscipiens, quæ postmodum ad nasum, palatumq; transmittit. In oculi vero orbita quatuor adsunt glandulæ, duæ scilicet singulæ orbitæ, dextræ, sinistræq; duæ inquam supra,

Glandulæ in sella sphenoidis suscipiens excrementa cerebri.

Glandule circa oculos vsus duplex.

30

infra reliquæ. quo loco positæ sunt à natura, vt humiditatem superuacuum ad oculos tendentem susciperent, illosq; humectarēt, atq; irrigarēt; ne eorum motu adeo frequenti nimis exiccarentur; itaq; moueri deinceps desinerent. hæc illæ sunt, quæ mœrore, aliaue causa constrictæ lachrimas excutiant, atq; effundunt. Binas alias glandulas habet pharynx paristhmias dictas cerebri humiditatem suscipientes, partesq; illas humectantes, qua humectatione maxime indigent, cum continenter laborent nobis nunc loquentibus, nunc edentibus, aut inspirantibus, aut expirantibus. Alias insuper sub radice linguæ comperies, quæ in nobis paruulæ sunt, quarum eadem est cum prædictis vtilitas. duæ aliæ hærent laryngi, asperæq; arteriæ

Lachrimæ vnde fluant.  
Paristhmie i pharynge cur positæ sint.

Glandulæ sub lingua.

Cur larynx videat  
prominere magis  
in viris quàm in  
fœmellis.  
Thymus siue lac-  
tes sub iugulis.

Glandulæ circa œsophagum cur.  
Cur tot glandulæ  
per mesenterium.

Affusio nis & pan-  
creas maior por-  
tio inter ventri-  
culum & spinâ.

Parastates & asci-  
dentes.

Testes mulierum  
& marium inter  
adenes possunt  
connumerari.

Cur sint post au-  
res glandulæ.

Parotides vnde fi-  
ant.

Emunctorium cor-  
dis.

Iecoris emunctori-  
um.

Glans penis mini-  
me connumeran-  
da inter glândulas.  
Substantia mamil-  
larum qualis.  
Omne quod trans-  
mutatur in cor-  
pore in colorem  
transmutâtis mu-  
tatur.

arteriæ, quæ fœminis sunt, quàm viris crassiores; hinc laryngis pars  
prominentior in paucis mulieribus cōspicua est: nam ab harum glân-  
dularum crassitie occupatur, & sub ea latitat. sub iugulis item, vbi  
vena caua in axillarem, & iugularem secatur, aliæ adfunt, in nobis  
tenues, crassæ vero in brutis, quæ lactes dicuntur, & thymus. Rur-  
sus in Thoracis cavitae duæ aliæ conspiciuntur medio œsophago  
adnixæ, vt ab eo continenter œsophagus humectaretur. ita enim ci-  
bus facilius pertransit, delabiturq; .at in abdominis concauo, nō duæ  
sed p̄p̄modū innumerabiles reperiuntur per mesenterium disper-  
sæ, ob diuisionem tum venarū, tum arteriarum. inter quas insignis 10  
quædam est sub ventriculo, tum ob venæ portæ diuisionem, tum ut  
ventriculi propunaculum foret, ne is spinam contingens læderetur.  
his nomen est pancreas, hoc est affusio. Ad radicem penis, vesicæq;  
extremum, hoc est ad vesicæ collum binæ adfunt glandulæ crassiu-  
sculæ, quæ parastates, hoc est asidentes vocantur. hæ semen susci-  
piunt, & continent: si quisquam est, cui testes tum marium, tum  
fœminarum inter glandulas connumerare libeat; huic per me adnu-  
meret licet; nam substantia testium à glandularum substantia parum  
differt. Nunc, posteaquam internarum glândularum historiam ex-  
pediimus: operæpretium videtur de externis quoque meminisse: 20  
deq; illis primum, quæ post aures sitæ sunt. Sciendum itaq; est pe-  
nes aures, nec nō sub maxilla inferiore multas adesse glandulas, quæ  
tum venarum, tum arteriarum diuisioni, tum quibusdam cerebri  
superfluitatibus suscipiendis deferuiunt: propterea emunctoria ce-  
rebri appellantur. hæ sunt satis insignes, & crassæ satis: in quibus  
frequenter fit illud genus abscessus, quod à loco parotidas Græci  
vocant. Præterea sub axilla nō pauca adfunt easdem ob causas ge-  
nitæ, quas supra memorauimus; qui locus cordis emunctorium ap-  
pellatur. In inguine etiam inter abdomen scilicet, & femur mul-  
tas glandulas obseruare poteris ijsdem rationibus, atque vsibus fa- 30  
brefactas; & hanc regionem iecoris emunctorium vocant. Nec  
desunt glandulæ in flexura tum cubiti, tum genu, sed parua, ob va-  
forum diuisionem factæ; atq; has glandulas in omnibus passim com-  
peries; sed in quibusdam præter has in collo, brachijs, cruribusq;.  
Sed quoniam hoc raro euenit; harum historiam prætermittendam  
dixi. Penis autem extremitas licet glandis nomen obtineat; tamē  
glandulæ substantiam nequaquam obtinuit. Sed māmillarum sub-  
stantia tota glandulosa est, ac pinguis, præter papillam, quas glân-  
dulas natura candidas esse voluit, vt sanguinem rubrum in album  
lac vertere facillime possent. etenim in humano corpore quodcūq;  
trans-



transmutatur: in colorem transmutantis transmutatur. Positæ autem sunt mammæ glandulosæ, vt diximus, in anteriore thoracis parte tui ob venustatem, cuius ratio habenda erat, tum vt lac commodius infanti præberetur: & inter cutem, mēbranamq; carnæ positæ sunt. Atque hæc hæctenus de glandulis humani corporis.

Cur mammillæ in thorace.

# 10 REALDI COLVMBI CREMONENSIS

DE RE ANATOMICA

L I B E R X.

D E O C V L I S.



20 CVLI in homine magnæ sunt, atque adeo ingentis nobilitatis, cum insignis, & dilectæ ab omnibus visuæ virtutis organa existant, maximo propterea artificio à Dei optimi maximi maiestate, ac sapientia creati sunt, & in sede satis tuta siti, eaq; nostri corporis eminentiore, vt instar boni custodis essent, & tanquã

Oculi nobilissimi.

Oculi organa visionis.

Cur in loco excelso sint siti.

speculatores, quos videmus dum ciuitates atq; oppida custodiunt, altiora loca ascendere, vt longius prospiciant. Penes cerebrum vero locatos fuisse oculos quid mirum? cum à cerebro ortum ducant. Animauertendum itaque est naturam binas cauitates in capite, maxillaq; superiore exculpfisse, vt tuto in loco collocarentur, multisq;

Situs.

30 illas propugnaculis circumscripsisse: supra namq; os frontis, superciliaq; collocauit, infra os primum superioris maxillæ, nec non os malæ, hinc nares, & iugale os, præterea palpebras cartilagineas, musculos ipsas constringentes, ciliaq; vt ipsa visu dirigendo deseruirent. oculorum forma in homine vere spherica est, idq; diligenter obseruato, nihil enim in homine, cum ab oculo discesseris, vere sphericum est. At aliorum animalium oculi non sunt vndiq; orbiculares, sed vel obliqui, vel depressi: neque id mirum est, cum hominis figura tanto interuallo à reliquis distet animatibus. Scito præterea neminem ante me hominis oculum descripsisse, sed omnes beluinum oculum describere, magno & turpi errore, in quem ipse quoq; Vef-

Quæ & quot sint oculorum propugnacula.

Cilia visum dirigunt. Oculus hominis vere sphericus.

Alij Anatomici brutorum oculos describere.

falius

Galenus & Vessalij  
in oculi fabrica decepti.

Quomodo fiat visio  
difficilis est questio.

Oculis capti sunt  
infelices.

Videndi facultas  
vnde.  
Nervi optici qualis  
sit substantia.

Inuolucrum.  
Origo.  
Progressus.  
Insertio.  
Oculi constituunt  
membranam retinam.  
Ex quibus constet  
humanus oculus.  
De musculis oculorum.  
Quatuor primi  
musculi.  
Exortus.  
Fibræ.

Membranz tendinoſe  
quatuor musculorum  
insertio.

Vfus vnus cuiusq;  
ex quatuor.

Vfus quatuor musculorum  
simul operantium.

Vfus quatuor musculorum  
ſuccesſiue agendum.

Cõparat quatuor  
primos oculorũ  
musculos quo ad  
vſum cũ quatuor  
musculis brachialis.

Idem motor diuerſo  
modo ſe habẽs  
poſſe motus diuerſos  
edere.

Quintum musculũ  
oculi Realdus  
primus inuenit.

falius incidit, in eius vniuerſa pene formatione cum alijs Anatomicis deceptus. quod verum eſſe facile perſpicias, ſi Galeni, Veſſalij, aliorumq; Anatomicorum hiftoriam de oculo cum noſtra contuleris. & proſecto non leuiter hi homines accuſandi ſunt, Galenus præſertim, & poſt ipſum Veſſalius, qui tantam rem, tam illuſtrem, tam optatam, tam negligenter ſcribendam putarent, beluinum oculum pro humano diſſecantes. quo loco oculi ſiti fuerint & cuius vſus gratia, viſionis ſcilicet, nemo eſt qui ambigat: quomodo autem viſio fiat, non eſt facile explicatu, & adhuc ſub iudice lis eſt; alijs namq; videtur viſionem fieri per emiſſionem, alijs vero per immiſſionem exiſtimarunt: quod argumentum nunc non eſt diſputandi locus. Illud ad præſentem tractationem ſcire ſat eſt, oculos videndi cauſa factos, quæ res ita eſt homini neceſſaria, vt qui illa vel natura, vel caſu, vel ægitudine orbat ſunt, ſe infelices appellent. Videndi autem facultas à cerebro proficiſcitur à viſuiſ ſpiritibus per opticos nervos ad ipſos delata, quos nervos craſſos eſſe, molles, poroſos raraq; textura eſſe diximus, necnon à membranarum dura, tum tenui inuolutos, qui ab interiore cerebro ad baſim exoriantur, & ſphenoides os per ſua ipſorum foramina orbicularia penetrantes, in internã oculorum cavitatem deſcunt, ibiq; membranam amphibliſtroida nuncupatam conſtituunt. Oculi itaq; ex multis partibus conſtant. Ex quinque musculis nimirum, membranarum ſex, tribus humoribus, ex nervis, venis, arterijs, glandulis multa; pinguedine circumqua; Ex musculis oculo deſeruientibus, quos in noſtro tractatu de musculis quinque eſſe diximus, quatuor ita diſpoſiti ſunt, vt in quatuor angulos diſtribui videantur, ſupra, infra; à dextris & à ſiniſtris, quorũ exortus à ſphenoides, dura; matre oblongi ſunt, fibrarumq; rectis conſtant, & ſubſtantiã ipſorum in finibus explicates, tendineam membranam conſtituunt, quæ in corneam poſt iridem deſinit, quorum vnus cuiſq; cum ſeoriſum & abſq; reliquorum ope ſuum officium facit, oculum trahunt, vel ſurſum, vel deorſum, vel dextrorſum, vel lævorſum: at ſi eodem tempore in agendo coeant, tunc oculum fiſunt: cum vero non vnã agunt tempore eodem, ſed ſucceſſiue ab iſdem, quos diximus musculis quatuor, oculus in girum vertitur, quam motuum diſpari tempore diuerſitatem in illis quoq; quatuor musculis obſeruabis, qui brachiali mouendo addiſti ſunt. Itaq; ab iſdem motoribus diuerſo modo ſe habẽtibus varios edi motus nullo pacto abſurdum eſſe videri debet. Quintus vero oculi musculus, quem ego primus inueni, oculi dimidium & amplius amplectitur, tranſuerſo ſitu, qui tamen nullo pacto deſpiciendus erat, cum nobiſſimæ

10

20

30



lissimæ actionis gratia sit à diuina prouidentia constitutus: nam, vt inquit Poeta ille,

Pronaq; cum spectent animalia cætera terram,

Os homini sublime dedit, cælumq; videre

Iussit, & erectos ad sydera tollere vultus, at huius musculi beneficio cœlū ac beatas cœlorū intueamur, opificemq; uniuersi pure sancteq; ueneremur; cuius nutu machina tanti operis cæpta perfecta; est, cuiusq; bonitate mouetur, seruaturq;: neque solum attolli oculus ab hoc quinto musculo potest, sed etiā sisti, & in girum verti, & in sua sede immotus contineri, ne huc atq; illuc temere flectatur. Illud præterea meminisse oportet, secundum nervorum coniugium in hos musculos distribui, quos inter, & oculum neruumq; opticum magna pinguedinis portio collocaretur, ne assiduo & perpetuo fere motu oculus exiccaretur, atq; tabesceret. Adsunt etiam binæ glandulæ, quarum altera supra est, infra altera, per quas lachrimas misericordia ducti effundimus, vel callidæ mulierculæ oculos exterendo exprimunt, ut ab amatoribus aurum extorqueant. hæc glandulæ ut oculum ipsæ quoq; irrorent factæ fuere. Ex sex oculi membranis prima exterior est, pluribus nominibus insignita: nam adnata, alba, adhærens, & coniunctiua appellatur. hæc tenuis est & candida à pericranio ortum ducens, & in maiorem iridis circulum definit: est autē iris in oculo circulus ille uarijs coloribus refertus. quæ colorum uarietas (quicquid hac de re Aristoteli uideatur) uueæ membranæ, non humoribus (ut ille uoluit) accepta ferenda est: quæ uuea non est in omnibus hominibus concolor. nam in hoc nigrior est, in illo magis albicat, in alio cærulea, aut uaria cernitur. Iris uero nomen in oculo, à cœlestis iridis similitudine translatum fuit. at quod in oculi centro uides instar puncti pernigrum, pupilla nuncupatur, cuius ope videmus. licet autem pupilla nigra admodū appareat tamen neq; ipsa, neq; quicquam, quod eidem subsit, atrū est, sed pellucens atq; perspicuum. Secunda oculi membrana nomine caret; neq; id mirum est, cum hæcenus incognita fuerit. hæc à nerueis musculorū oculi tenuitatibus gignitur, & sub adnata terminatur prope iriden. Membrana tertia ceratois, id est cornea, durāq; dicitur. dura etenim crassa; existit, cum à dura matre exoriatur. ab hac membrana ceratoide forma oculi constituitur: vna; est sui exortus ratione. Arabes autem Anatomici vnica fidelia duos parietes dealbantes partem anteriorem corneam, quod instar cornu pel luceat, posteriorem sclerotica à duritie appellarunt, sed una duntaxat est, non duæ; & à dura membrana ut dicebam profiscitur.

e Ceratois

Vfus quinti musculi oculorum.

Secundum par neruorum in oculorum musculos inseritur. Pinguedinis vñus in oculi fabrica. Glandularum in oculi fabrica situs.

Lachrimæ vnde exprimantur. Glandularum oculi seruitiū vñus. De membranis oculorum.

Primæ oculi membranæ nomina. Coniunctiue membranæ descriptio. Iris in oculo quid sit.

Aristotelis error de Iride oculi.

Vuea nō est in omnibus concolor. Iris oculi ethimologia.

Pupilla quid sit.

Pupilla nō est atra De secunda membrana oculi.

Secunda membrana incognita alijs anatomicis.

Origo & insertio. De membrana tertia.

Ortus.

Ceratois constituit formam oculi.

Arabum error in cornea.

Cornea vnica est. Cornea qualis sit.

Corneæ membra-  
ne villicitates.  
In cornea quid co-  
tineatur.

De quarta mem-  
brana oculi.

Nomina.

Origo.

Progr. effus.

Insercio.

Quarta membra-  
na non ambit to-  
tum oculum.

Vbi quarta mem-  
brana sit duplex.

Cur vœa dicitur  
quarta membra-  
na.

Colores in vœa  
varij in homine.

In boue colores  
vœæ plures quã  
in homine.

Vius varietatis co-  
lorum in vœa.

Cur defelsis oculi-  
lis, claudamus.

De quinta mēbra-  
na oculi.

Retinæ origo &  
substantia quas-  
lis.

Situs.

Situs retinæ ratio  
redditur.

De sexta membra-  
na oculi.

Nominis ethimō.

Ortus.

Substantia.

Quibus comparā-  
da sit aranea.

Vius aranæ.

Vessalius in ara-  
nea membrana  
obscurus.

Galenii error in a-  
ranea membrana

Idolum visionis  
Galenio quid.

Mēbrana aranea  
unica est.

Membrana instar  
ciliorum de qua  
Vessalius non est  
quid distinctum  
a membranis def-  
criptis hæcenus.

Ceratois anteriore in parte diaphana est, perspicua, & instar cornu  
lucens, & subtilis, quo loco iris necnō pupilla sita est, hæc oculum  
sistit, neruum opticum inuestit, & oculum: intus concaua est. & in  
ea tres humores, tresq; aliæ membranæ continentur. Quarta ocu-  
li membrana vœa dicitur: dicitur & corion, hoc est secundina &  
coriformis: à tenui meninge ortum ducit, primumq; neruum opti-  
cum inuestit, deinde sub cornea dilatatur & ad anteriora vsq; por-  
rigitur, verum oculum vniuersum non ambit quemadmodum cor-  
neam facere diximus. postea vero quàm ad pupillæ locum perue-  
nit, quam vœa format, atq; effingit, versus posteriorem partem re-  
flectitur, & ad iridis principium progreditur, ibiq; duplex efficitur  
atque à cornea toto illo interuallo, quod diaphanum est, abscedit,  
licet in alijs partibus non parum illi connectatur. Vœæ nomen for-  
tita est, eo quòd vœæ granum videatur esse, cui capulus ademptus  
fuerit. in hac, vt dicebam, magna colorum varietas spectatur. in  
hominis namq; vœa nigrum colorem cernes, puniceum, ceruleum,  
rubrum: at in boue, præter hos viridem & cianeam. ex qua colo-  
rum varietate defelsi oculi recreatur: propterea oculos claudimus  
vt spiritus visui ad hosce multiplices colores conuersi recreentur.  
Quinta oculi membrana amphiblistroides, hoc est retina dicta, ex  
ipsamet visorij nerui substantia elicitur, sed si proprie magis loqui  
volumus, retina hæc nō est membrana, sed res mollis, & alba, quã  
si colligas, atq; vnā positam species cerebri substantiam iudicabis.  
hæc intro magis quàm vœa iacet, paulo vlterior progreditur. oculi  
dimidium penes vitreum humorem natura vœa collocauit, vt ali-  
mentum ad ipsum deferret. Sexta membrana arachnois græcæ la-  
tinæ aranea dicitur, nam aranei telam præ se ferre videtur. Ori-  
tur & ipsa à tenui meninge: tenuissima splendensq; est, illis pelli-  
culis simillima quæ in caparum interuallis cernitur. vsus eius est vt  
humores vitreum, & cristallinum complecteretur. Vessalius alioqui  
magnus Anatomicus in hac araneiformi membrana describenda  
perplexus est, & nullo pacto perspicuus: nam & ipsam temere diui-  
dit, deinde ignorare videtur ab hac vitreum humorem circundari.  
In eadē membrana ipse quoq; Galenus dormitauit; nam ab ea par-  
tem illam separauit, quæ ante cristallinum sita est, quam idolum &  
simulacrum visionis appellat. Ego vero vnicam esse assero, licet ea  
parte, quæ ante cristallinum locatur, paulo crassior sit, quàm in re-  
liquis partibus. Atq; hæc solæ sunt veræ oculi membranæ. quare ne  
expectetis dum ego de illa loquar membrana instar ciliorum, quam  
Vessalius somniauit: nam lineæ illæ, quæ humorem cristallinum  
circumstant

10

20

30



circumstant, in hac quam paulo ante descripsimus aranea collocantur. Humores in oculo tres sunt, aqueus, cristallinus & vitreus. Aqueum, qui & albugineus quoque dicitur, natura anteriore in parte locauit inter membranam vucam, ubi duplex & inuersa redditur corneamque: qui humor paucus admodum est, & in eo suffusiones fiunt, quas cataractas recentiores appellant. Hoc quod dicam obsecro lector ne excidat, me certa coniectura deprehendisse humorem hunc instar excrementi esse: nam ego bis hisce oculis uidi totum prorsus effusum esse ob vulnera, tamen spatio temporis renatum, ita ut eodem oculo cernere deinceps potuerit. Secundus humor oculi cristalloides cristallinus uel nuncupatur, eo quod ita splendat, ut lumine, & perspicuitate cristallum referat: situs quoque eius est anteriora versus, pene in centro oculi, eumque humor vitreus posteriore in parte amplexatur, neque vlla inter ipsos membrana interiacet, ante tamen ab aranea obtegitur. Figura cristallini humoris sphaerica quidem est, sed depressa anterieus: quia humorem aqueum respicit, lentis formam refert. Huius substantia duriuscula est, quam si e sua sede dimoueris, & ad scriptos characteres accedat, maiores esse videntur, & facilius conspiciuntur, suspicorque hinc specillorum inuentionem originem duxisse. vsus cristallini humoris permaximus est, atque extollendus, nam precipuum est, ac pene princeps videndi instrumentum, propterea idolum simulachrumque visionis non iniuria appellatur. Hanc partem libentissime contemplantur auditores in theatro, nam oculos atque animum delectat, pulchra res est scituque digna. Tertium hialoida hoc est vitreum vocant Anatomici, eo quod vitrum fusum specie se praeseferat, posteriore in parte collocatur: neque ibi solum sed anterioris quoque non exiguam portionem, ita ut ex quatuor oculi partibus tres occupet hialoides partem autem cum dico concauam intelligo. hic humor concauus in medio factus est, quoniam sibi cristallino cedendum erat, ipse quoque splendidissimus est, spectatuque iucundus. hunc vna cum cristallino inuoluit aranea membrana, penes quem retina iacet, a qua vitreus humor alitur, at vitreus vicissim alit cristallinum, itaque nil mirum est si vitreus humor pellucet, cum alimentum immediatum futurum sit cristallini praelucis, & in nutritione gignitur humor ille qui aqueus appellatur. Hi sunt tres humores in oculo uisioni opitulantes: nam horum ope, nisi quid obstat, medio proportionato existente, uisibili; in interuallo deceter locato facile, & recte cernimus.

Prater musculos quinque oculo deseruientes, prater sex membranas, tres humores, glandulas binas, neruum opticum, secundum

De humoribus oculi.  
Aquei humoris situs.

Humor aqueus est excrementum.

Humor aqueus potest renasci.  
Cur secundus humor oculi dicatur cristallinus.  
Situs cristalloides

Cristallini figura.

Substantia cristallini qualis.

Specillorum inuentio unde initium sumperit.  
Cristallini humoris vsus.

De tertio humore oculi nominis ethimologia.

Situs humoris vitrei.

Cur vitreus humor sit concauus.

Aranea membrana inuoluit humorem cristallinum & vitreum.  
Retina alit humorem vitreum humor vitreus alit cristallinum.

Epilogus partium oculi, oculoque deseruentium.

neruorum coniugium, pinguedinemq; venæ adfunt, & arteriæ per musculos pinguedinemq; difperfæ, necnon per mēbranas, in quas multæ ipſarum diftribuuntur, item per corneam atque vueam.

Peroratio.

Veffalius errat in oculi hiftoria.

Et hæc eſt vera germanaq; fabricæ humani oculi explicatio. quã ſi cum re ipſa contuleris, tu quoq; huic hiftoriæ ſubſcribes, quam ego pure ſcripſi abſq; verborum circuituionibus, & ſine fucō. Erroresq; Veffalij in hiftoria de oculo nullo negotio deprehēdes: quem mirum eſt in membri adeo nobilis deſcriptione tantopere lapſum eſſe: nam non modo in musculis & membranis, ſed in humoribus quoque decipitur, & tota errat via, exiſtimans criſtallinum humorem in centro oculi exquiſite ſitum eſſe; item tantum humoris aquei, quantum vitrei reperiri. 10

# REALDI COLVMBI CREMONENSIS

DE RE ANATOMICA

LIBER XI.

20

DE VISCERIBVS.

De Vuea, Tonſillisq; nec non de tunica veſtiente Naſum,  
Palatum, os œlophagum, ventriculum, inteſtina  
& aſperam arteriam. Cap. I.

Cut hic non agit  
de ſecore, corde,  
& cerebro.



Cor, cerebrum, ie  
cur inſtar trium  
fontium.

Cur venæ genitæ.

Cur lotium vna  
cum ſanguine de  
ſeratur.

VANQVAM Iecur, & Cor, & Cerebrum viſcera ſunt, deq; his in tractatu de Viſceribus agendum videtur; tamen de his hoc loco non agam, quia de his ſeparatim egi, quod ſint inſtar trium fontium, à quibus varij proficiſcuntur riuli, qui vniuerſam hominis fabricam irrigant; abſque his ceu lapideam, atq; inutilem futuram. Propterea, vt alimētum per ſingulas corporis partes flueret; venæ genitæ ſunt, quæ naturalem ſanguinem in hepate, tantum in proprio fonte elaboratum deferrent, qui ad ſuperiora non ſecus atque ad inferiora labitur. Quamobrem natura vnà cum ſanguine lotij partem deferri voluit, tum vt vehiculū ſanguinis lotium foret, tum vt ne ſanguis alicubi ſiſteret, & inſtar gelu rigeret. at eius ope 30



- ope sanguis à magnis venis ad mediocres, atque ab his ad minimas vsq; properat. Item à corde vitalis sanguis vnà cum calore ad omnes corporis partes per arterias communicatur. Eodem pacto cerebrum per nervos, spinalemq; medullam sensum, motumq; ad vniuersum corpus transmittit: etenim absq; nervorum distributione, neque sentire, neque moueri vilo pacto posses. Dimisso igitur cerebro à superioribus inchoantes consentaneum est, vt de illa tunica dicamus, quæ os ambit, linguamq; , laryngam, & œsophagû; de gargareone, & paristhmijs; ne quicquam intactum prætermittamus. deinde loquimur de thorace, postremo de abdomine. Scien-
- 10 dum itaq; est tunicam illam, à qua nares intus, palatum, linguaq; circumdatur; me iudice: duræ matris portionem esse quæ postquâ caluariam anteriorem præcipue egressa est; amplificatur, crassior, & pene carnea redditur: à qua cum vniuersum palatum interne, & os ipsum inuoluatur, ad palati extremitatem duplex euadit; elongataq; aliquantulum partem gignit rotundam, oblongam, crassiusculam, pendulam, varijs nominibus insignitam: etenim vna dicitur, vlula, columella, gargareon. Vfus eius est, vt humiditatem à cerebro præcipitantem detineret: idq; non temere, sed vt detēta partes illas, quarum motus pene perpetuus est, humectaret. Voci etiā,
- 20 & pronuntiationi non parum confert: vt illorum exemplo eleganter, facileq; discere possumus, qui sæuo gallico morbo diu laborarunt, quibus cū dira morbi lues columellam exedit, rauci admodum sunt; & crocitare potius, quàm humano more loqui videntur. Tertia est insuper gargareonis vtilitas, ne scilicet puluis, qui iam nobis inuitis quandoque os ingressurus erat, ad asperâ arteriam præceps progrediretur. Vtrinq; duæ adsunt glandulæ, quarum altera à dextris est gargareonis, à sinistris altera; paristhmiæ dicuntur, tonsille, amygdalæ, faucesq;: earum substantia glandulosa est. factæ hæc quæ fuerunt, vt cerebri humiditatem suscipiendo essent, idq; propterea quòd regionem hâc, quam græci pharyngâ, latini fauces appellant, humectando essent. his autem finibus continetur pharynx. Basis capitis, palatiq; , nec non corpora anteriora vertebrarum colli; quo loco complura organa cernes laryngâ nimirum, os hyoides, eiusq; musculos, linguæ radicem, eiusq; musculos, sextum nervorū par, iugulares venas internas, carotides arterias, columellâ, maxillam inferiorem, eiusq; musculorum portionem, styloidis, processus, & œsophagum. propterea cum glandulæ, quas dixi, tam angusto in loco versentur, paristhmiæ veteres appellauere. Teguntur autem ab eadem membrana, à qua os, & palatum inuolui diximus: quæ
- descendens

Arteriarum vtilitas.

Nervorum vtilitas.

Proponit agenda.

De tunica nares, palatum & linguâ circumdante. Substantia vuez & origo, & deductus.

Substantia vuez. Nomina vuez varia.

Vfus vuez primus.

Secundus.

Raucedo ob morbum gallicū exesa vuez. Tertius.

Paristhmiæ, vbi sint, quid sint.

Vfus paristhmiarum.

Pharynx.

Complura organa.

Cur dictæ sint paristhmiæ. Inuolucrum paristhmi.

Pleura inuestit ex  
tremâ tracheam.

descendens œsophago occurrit: eiusq; internam tunicam constituit: item ventriculi; & intestinorum tunicam internam, & deorsum magis lata post linguam epiglottida ambit, laryngemq; , & asperam arteriam, ad extremos usq; illius ramos per pulmones delatos. Extrema autem tracheæ regio vestitur à succingente membrana. hac igitur parte satis accurate perpensa, reliquum est, ut de pulmone verba faciamus.

### De Pulmone. Cap. II.

10

Situs.

Annexus.

Diuisio.

Figura.

Cur pulmones in  
tro caui.

Cur pulmo diuida  
tur in lobos.

Galenii error.

Cur plures lobi  
sint in brutis quâ  
in homine.

Hominis pulmo  
nis lobi sunt qua  
tuor duntaxat.

Cur pulmonis lo  
bus sit concavus.

Galenus nō secuit  
homines.

Pulmonis substantia  
qualis.

Inuoluerum.

Vasa in pulmone  
bus.  
Arteriæ asperæ de  
scriptio.

**P**ULMO in thorace ipso situs est, cuius cavitatis maiorem partem occupat, corporibus vertebrarum, cordi, asperæq; arteriæ adnexus. Diuisus est pulmo in duas partes dextram nempe, & sinistram, propterea nonnulli sunt, qui binos esse aiunt pulmones. Eius figura extra sphaerica est, intro vero caua: itaq; factum oportuit, quod sibi tum cordi, tum pericardio cedendum erat. Præter eam, quam diximus pulmonis diuisionem, in quatuor lobos, pinnae, aut fibras, ( nihil enim nunc interest, quæ ex his voce appelles ) pulmo diuiditur, ut agilius moueri possit, & cor ipsum facilius amplexari. Scribit Galenus pulmonem quinque lobis præditum esse, ex quibus tres in dextro latere esse autumat. quod verum esse in brutis quidem animantibus comperies: at in homine nequaquam. Causa diuersitatis illa esse potest, quod hepar à corde plurimum distat. quamobrem cum vena caua à vertebris distet, strato opus erat, quo fulciretur. Natura igitur prudens lobo vno voluit hominis pulmonem à Brutis superari, quem lobum venæ cauæ in illis substrauit. Concauus autem est, ut Galenus optime dixit, quia cedit venæ cauæ rotunditati: at quoniam in hominibus inter cor, & hepar septum transuersum duntaxat interiacet, quinto lobo nihil opus fuit. Quare nihil erat, quamobrem Galenus ob hoc tâtopere in veteres Anatomicos inueheretur. Verum ex hoc, ut ex alijs compluribus locis, aperte conuincitur Galenum nunquam in homine anatomen exercuisse. Pulmonis substantia rara est, leuis, porosaq; spongiæ instar, colore rubello, quod genus substantiæ parenchyma, hoc est, affusio à veteribus appellatur. Inuoluitur à membrana pleura, quam describemus, tenui satis, atq; admodum porosa. Per substantiam pulmonis hæc disseminatur, Arteria aspera, Arteria venalis, Venæq; arterialis. Aspera quidem arteria per colli longitudinem anteriore in parte sub larynga fertur, quæ ex anulis constat, at non perfectis omnino, ut suo loco diximus, ex cartilagine quæ in dextrum, ac sinistrum

20

30



- nistrum diuiditur; deinde pedetentim magis, magisq; diuiditur, atque attenuatur ad pulmonis extremum vsq;. Vfus eius est, vt a-
- 10 nistrum intro, forasq; ferat: atq; hæc è supernis in inferiora procedit. ex infernis autem pene sursum fertur venalis arteria, quæ ipsa quoque in dextram, sinistramq; partem diuisa est; deinde varijs modis ramificatur, ad asperæ ramos accedens, idemq; facit vena arterialis. hæc vero tria vasa à substantia rara, porosa, leuiq; amplectuntur, itaq; pulmo gignitur: cuius vsus est, vt recte Anatomici scribunt, ob cordis refrigerationem; quod efficit, aerem ad illud frigidum deferens. factus præterea fuit pulmo ad inspirationem, atq; expirationem, & vt voci deferuiat. Atq; hos omnes pulmonis vsus nouerunt, qui ante me scripsere. præter quos ego alium addo maximi momenti, de quo ne per transennam quidem meminere. Est aut præparatio, & pene generatio vitalium spirituum, qui post modum in corde magis perficiuntur. Aerem namq; per nares, & os inspiratum suscipit; nam asperæ arteriæ vehiculo per vniuersum pulmonem fertur, pulmo vero aerem illum vnà cum eo sanguine miscet, qui à dextro cordis ventriculo profectus per arterialem venam deducitur. Vena enim hæc arterialis præterquam quòd sanguinem
- 20 pro sui alimento deferat; adeo ampla est, vt alius vsus gratia deferre possit. Sanguis huiusmodi ob assiduum pulmonum motum agitur, tenuis redditur, & vnà cum aere miscetur, qui & ipse in hac collisione, refractioneq; præparatur; vt simul mixti sanguis, & aer per arteriæ venalis ramos suscipiantur: tandemq; per ipsius truncum ad sinistrum cordis ventriculum deferantur; deferuntur vero, tã belle mixti, atq; attenuati, vt cordi exiguus præterea labor superfit: postquam exiguum elaborationem, quasi extrema imposita manu vitalibus hisce spiritibus, reliquum est, vt illos ope arteriæ ahorti per omnes corporis partes distribuatur. Non vereor quin nouus hic pulmonum vsus, quem nemo Anatomicorum hætenus somniauit, incredulis, atque Aristotelicis paradoxon videri debeat, quos oro, rogoq; vt pulmonis magnitudinem contemplentur, quæ absq; vitali sanguine permanere non poterat; cum nullà sit tam minima corporis particula, quæ illo destituatur. Quod si vitalis hic sanguis in pulmonibus non gignitur: à qua parte transmitti poterat, præterquam ab ahorti arteria? at ab ahorti arteria ramus nullus, neq; magnus, neque paruulus ad pulmones mittitur. Nam quo pacto per venam, aut per arteriam venalem deferri sanguis vitalis ad pulmonem potest, cum neutra pulset? hæc igitur candide lector, quam dixi, arterialis vena constructa fuit, vt sanguinem eo, quo diximus,
- 30 pacto

Vfus.

Arteria venalis.

Vena arterialis.

Vfus pulmonis.

Nouus vsus pulmonum generatio scilicet animalium spirituum.

Quomodo generetur spiritus animalis.

Ex venæ arterialis amplitudine vsus inuestigatur.

Vitales spiritus in corde perfecti per ahortim arteriã ad omnes partes corporis feruntur.

Corroboratur opinio quòd spiritus vitales in pulmonibus gignantur.

Arterialis venæ vsus reperitur.

Quomodo iudicent medici sanguinem ferri è pulmone.

Galeno & Hippocrati licet ob veritatem contra dicere.

Pessimum hominum genus.

Arteria venalis sanguine plena est non aere.

Nervi pulmonis tunicam attingunt non penetrant.

Cur pulmo parvi sentiat.

Cur pulmonis tunica.

pacto elaboratum intro afferret ad cor ipsum; nō vt à corde eliciat & extra ferat. Ad hæc, quæ diximus, illa etiam accedit ratio, Medicos tunc è pulmonibus manantem sanguinem coniectare, atque adeo certo scire, longo rerum vsu edoctos, non modo quòd cum tussi eliciatur, sed etiam quia floridus est, tenuis, & pulcher, vt de sanguine arteriarum quoque dicere consueuerunt. Quas rationes qui sincero animo considerare voluerit, acquiescet, sat scio, veritatisq; locum dari patietur. At Galenus magnus philosophus, medicorumq; princeps, cum ab Hippocrate discersimus; hunc pulmonis vsū ignorasse verisimile nō videtur. Est, magnus est philosophus, maximusq; medicus; neq; hæc, aliaq; multa hominem latuisse admirabile est. Verum, est quoddam hominum genus adeo vecors, & rude, vt neque inuenire ipsi noui quicquam velint, aut possint: propterea quidquid magni nominis medicus scripsit, illi statim subscribunt, neque ab eius dogmatibus, vel tantillum discunt. Tu vero candide lector doctorum hominum studiose, veritatis autem studiosissime, experire, obsecro, in brutis animantibus, quæ viua vt feces, moneo, atque hortor; experire inquam, an id, quod dixi, cum re ipsa consentiat: nam in illis arteriam venalem illiusmodi sanguinis plenam inuenies, non aere plenam, aut fumis, vt vocant, si Deo placet, capinosis, illi duntaxat pulsus deest. Nam hic à corde proficiscitur; quemadmodum peroptume maximus Galenus probat eo libello, An sanguis in arterijs contineatur contra Erasistratum. Pulmonis tunicam parui nervuli attingunt, vt diximus, qui intus non penetrant; propterea pulmo exiguo sensu præditus est; tamen membrum est maxime vtile, atq; adeo necessariū: sed hæc pulmonis tunica, cum porosa sit, nihil mirū est, si in Pleuritide & peripneumonia sanguinem suscipere valeat.

### De Pleura, & Mediastino.

### Cap. III.

30

Quid in thorace contineatur.

Pleura quid sit. Vfus & deductus.

**I**N thoracis cauitate præter cor, pericardion, arteriam aorti dictam, cauam venā, venamq; tum arteriosam, tum sine pari, præter arteriam venosam, venas, arteriasq; axillares, item eas, à quibus aluntur costarum interualla, præter illas, quæ sub sternō discunt, ac præter illas iuxta mediastinum deorsum tendentes, præter nervos, oesophagum, arteriam asperam, pulmones, glandulasq; membranae quoque adsunt, pleura scilicet succingens appellata, mediastinumq;. Est autem pleura membrana similis, tenuis, nervea; quicquid in thoracis concauo continetur complexa. hæc vertebrarum



- vertebrarum corpori admodum hæret, & sub costis labitur; septū tranſuerſum ſuperne inueſtit. Membrana hæc pleura nequaquam ſimplex eſt; licet Veſalius ſimplicem eſſe ſcriptum reliquerit, qui in hoc Galenum iniuria accuſat, cum ipſe, vt parum diligens, non accuſari non poſſit. quòd ſi adeo diligens in hac re fuiſſet, vt in alijs pluriſq; comperiſſet pleuram duplicatam eſſe. Cum duplicem hæc ſuccingentem membranam dico, ne exiſtmes me dextram illam tantum, & ſiniſtram appellare, ſed ubiq; duplicem eſſe pleuram aio, duas ſcilicet eſſe membranas, quarum altera interna eſt, externa
- 10 altera, inter quas venæ, arteriæ, nerviq; præterlabuntur: quæ omnia inter coſtarum interualla ducuntur. atq; hic sæpe fit Pleuritis. Si cauſam quæris, quare duplicem hanc membranam natura genuerit, ob oſium duritiem opinor, ne interna pleura, quæ adeo ſentit, vt nihil ſupra; ob pulmonis continentem motū læderetur. Hæc membrana vel potius hæ membranæ, iuxta latera ſterni deorſum repit, ſpinam verſus, atq; inter ſe dextra à ſiniſtra diſtat: illæq; ſpinæ affiguntur, vt thoracem in duas cavitates, pulmonemq; duas in partes ſecarent. neq; id temere factum putes: ſed mira naturæ diligentia, vt læſa altera parte, ita ut fit, illæſa ſaltem altera, immunisq; relinqueretur. hæc vero pleuræ reduplicatio, vt ita dicam, hoc loco mediæſtinum appellatur; quoniam thoracem mediæ; & à ſummo thorace ad imum ducitur. Inter mediæſtinum, ideſt hanc duplicem pleuram thoracem in duo ſecantem, materia aliqua colligi poteſt, quæ perforato ſterno tuto ſatis extrahi poteſt à diligenti chyrgurgo, rei; anatomicæ peritiſſimo. Præter has membranas coſtæ perorio quoq; præditæ ſunt. in ſuperiore thoracis parte ſub iugalis, vbi tum venæ, tum arteriæ, diuiduntur, glandoſam partem ad eſſe cõſpicias, quam thymum vocât. Eſtq; thymus in vitulis, & id genns animalibus eſu ſuauiſ. Ad medium œſophagum binæ adſunt parua
- 20 læ glandulæ, illius humectandi gratia à natura eo loco collocatæ. Quid autem ſit œſophagus mox audies.

Pleura non eſt ſimplex.

Veſali j error.

Galenus non erat reprehendendus.

Pleura eſt duplex ubiq;.

Venæ arteriæ & nervi ſeruntur inter pleurâ internam & externâ. Vbi ſæpe fiat pleuritis.

Cur pleura ſic duplex.

Interna pleura eſt ſenſus exactiſſimi.

Progreſſus pleuræ. Dextra pleura à ſiniſtra diſtat.

Cur pleuræ ope thorax in duas partes diuidatur.

De mediæſtino quid ſit.

In mediæſtino materia colligi poteſt & extrahi.

Coſtæ habent perorioſtion.

Thymus glandula vbi.

Thymus in vitulis eſu ſuauiſ.

Vſus glandularum ad medium œſophagum.

### De œſophago, & ventriculo. Cap. IIII.

**O**ESOPHAGVS, ſtomachus, gula, uel meri, vt Arabes vocant: eſt via potus, cibi; origo eius eſt in ima pharyngis cavitare, poſt laryngem, cui adnæſcitur; neq; illi ſolum, ſed etiam anteriori corpori vertebrarum colli. Eſt œſophagus membranea pars, nervueaq; & exanguis, cuius terminus eſt ſuperius ventriculi orificium. Iter œſophagi eſt inter vertebrarum corpora, arteriamq; aſperam,

f recta

Oeſophagi nomina.

Quod ſit in vniuerſum origo & ſitus.

Oeſophagi deſcriptio.

Iter œſophagi.

Cur ad læuam re-  
flectatur œsoph.

Terminus œso-  
phagi.

Tunicæ œsopha-  
gi.

Fibræ tunicæ inte-  
rioris quales, &  
cur.

Tunicæ externæ  
œsophagi quales  
& earum vltus.  
Œsophagus est  
continuus ventri-  
culo.

Ventriculus est cō-  
tinuus intesti-  
nis.

De ventriculo.

Nomina

Situs.

Maiores pars ventri-  
culi occupat præ-  
cordium sinistrū.

Galeni error.

Cur maior pars  
ventriculi sit in  
sinistro hypocho-  
dro.

Figura ventriculi  
qualis.

Reddit ratio figu-  
ræ ventriculi.

Ventriculi orificia  
duo.

Vltus vtriusq; ori-  
ficij.

Cur orificia vtrū-  
que sint crassiora.

Fibræ orificiorum  
quales & cur.

Error quorundam  
de situ inferioris  
orificij.

Situs verus orificij  
inferioris.

Gal. error de glād.  
inferioris orifi-  
cio.

Tunicæ ventricu-  
li quot & quales.

Vnde oriatur tuni-  
ca cōmunis ven-  
triculi.

Fibræ primæ tuni-  
cæ quales, & cur.

Fibræ secundæ qua-  
les & cur.

recta, quousq; cordi accedit; nam ibi, vt cordi cederet, vt par erat, dextrorsum tendit: deinde prope transuersum septum ad læuam de-  
nuo reuertitur, neq; enim illi per iecur progredi recto itinere lice-  
bat. ob iecur itaq; quod obstat cogitur œsophagus supra spinam,  
sub vena quidem concava, at supra ahorti arteriam descendente  
præterire; septumq; transuersum penetrat, perforatq; & in superius  
ventriculi orificium, vt dixi, implantatur. Duabus proprijs tuni-  
cis præditus est œsophagus, externa, internaq;. Est autem interna  
crassior multo, quàm externa. Intetiori fibræ sunt rectæ, quæ ma-  
nuum vice funguntur in cibi attractione, quem ab ore susceptum  
ad ventriculum deferant: propterea à summo ad imum feruntur.  
externa vero gulæ tunica transuersis fibris prædita est: vt cibus, po-  
tusq; facilius deorsum trudatur. Est autem œsophagus non modo  
ventriculo contiguus, sed continuus: quemadmodum ventriculus  
intestinis, quæ ad podicem desinunt. Ventriculus, qui & venter  
dicitur à Latinis, à Græcis γαστήρ, & κοιλία: situs est in abdomine im-  
mediate sub transuerso septo; adeo descendit, vt pene ad vmbilicū  
perueniat. propterea medio pene corpore inter vtrūq; hypochon-  
drium transuersim collocatur: maior tamen eius pars sinistrum præ-  
cordium occupat; licet Galenus secus sentiat; idq; sapienter factum  
est; quoniam ob iecoris magnitudinem, lienisq; paruitatem, spa-  
tium maius in sinistro latere, quàm in dextro relinquebatur. Eius  
figura cucurbitæ oblongæ, rotundæq; eleganter respondet. Sphæ-  
ricus etenim est ventriculus, licet oblongus. hac autē figura mem-  
bra tum magis capacia sunt, tum ad perpetiendum minus idonea.  
Duobus orificijs insignitur, dextro, sinistroq;, seu maius superiore,  
atque inferiore. sinistro potum, cibumq; suscipit: dextro vero iter  
præbet cibo, quem ipse confecerat, & in chylum conuerterat. Bi-  
na hæc, quæ nunc describimus, ventriculi orificia, ne cibus vel in-  
coctus elaberetur, vel retrocederet, crassiora facta sunt, fibrisq; or-  
bicularibus, à quibus recte detinetur. natura vero iubente dilatan-  
tur, permittuntq; cibos tum ingredi, tum egredi. Illud interim ad-  
notes velim, inferius orificium ventriculi in decliuiori regione sitū  
neutiquam esse, quemadmodū aliqui pinxerunt; sed superiora ver-  
sus spectat, neq; glandulam illud circumplectentem videbis, licet  
à Galeno describatur. Tribus tunicis, illisq; nerueis præditus est,  
quarū vna aliquantulum carnea est: ex his tunicis duæ propriæ ven-  
triculi sunt, alia communis, quæ à peritoneo proficiscitur; estq; fi-  
brarum expers. Primæ obliquæ fibræ contingere, vt cibus, potūq;  
tam diu contineant, quā diu coquatur. Secunda transuersis fibris  
constat,

10

20

30



constat, vt postquam confectus fuit, extra propellatur. Tertia fibris caret, vt dixi, & inuolucris duntaxat vice fungitur. Galenus, & post illum Vessalius rectas fibras internæ vetriculi tunice inesse crediderunt, vt attrahendi munere fungerentur. Verum œsophagus, quæcunq; deuorantur, ad illum deducit: propterea rectis fibris nõ eguit. Non est tamen negandum, quin quatuor illæ naturales virtutes, quæ reliquis membris adesse cõsueuerunt, ventriculo quoq; adsint; attractrix scilicet, retentrix, concoctrix, atq; expultrix.

Fibræ tertiæ tunice ventr. quales & cur.  
Geleni, & Vessalii error.

- Præterea secunda tunica, quam carnosam aliquo pacto dicebat, nõ  
10 est tamen in fundo carne magis, quàm in superiori parte: quidquid Galenus scripserit. Tegitur ventriculus à iecore, lieneq; & eiusdem particulam omentum contegit. Vfus eius est cibum, potumq; in albam substantiam lacti similem, quam chylum vocant, immutare. Estq; nostri corporis culina, iccirco amplius, capaxq; rerum multarum effectus est, præsertim in heluonibus, voracibusq; hominibus, quorum aliqui consumedis frugibus nati; quorũ Deus venter est, tantum cibi vorat, tantum potus ingurgitat, quantum quatuor uiris satis, superq; esset. Præter orificia, tunicasq; hæcenus descriptas, , nervos habet ventriculus à sexto pari deductos, venas à porta, arterias à magna vt iam dictum est arteria; neq; id inutiliter. Etenim à nervis sensum, ab arterijs vitalem calorem fortitur; venæ vero tum illi nutrimentum deferunt, tum chylo suscepto illum ad iecur deferunt. Qui vero existimant ventriculum chylo nutriri, decipiuntur: Nulla enim corporis pars præterquam à sanguine alitur; propterea venarum copia exuberat. Quandoq; euomit, sed motus ille violentus est, & contra naturã, tunc autem obliquæ, transuersæq; fibræ vnà, magnoq; conatu propellunt: & rectæ œsophagi opposito motu agunt, quàm natura postulet. Cum enim natura deorsum pellere oporteret; in eo nixu deorsum trahunt.  
30 atque hæc de ventriculo sat sunt.

Ventriculus præditus est quatuor virtutibus naturalibus.

Galenii error.  
Quid tegat ventriculum  
Ventriculi vsus.

Cur vetriculus sic amplius.

Nervi ventriculi.

Ventriculus non nutritur chylo.

Cur ventriculus abundet venis.

## De Intestinis.

## Cap. V.

CVM Intestina sint ventriculo continua, quemadmodum supra dicebamus; consentaneum est historię, quam de humani corporis fabrica scribimus: vt nunc de intestinis loquamur. Intestina igitur à ventriculo exoriuntur; eademq; pene substantia videntur: licet aliquantulum tenuiore. Situs eorum est ab inferiori ventriculi orificio ad anum vsque; abdominisq; maiorem partem occupant. Veteres Anatomici intestina in sex partes distinguere, distinctisq;

Continuatio.

Intestinatorum ortus.

Situs.

f 2 singulas

Diuisio intestino-  
rum secundū ve-  
teres anatomi-  
cos.  
Diuisio propria

Duodenum.

Cur duodenum di-  
catur.  
Nomina varia duo-  
deni.

Progressus intesti-  
ni duodeni.

Ieiuni intestini o-  
rigo.

Cur ieiunum di-  
catur.  
Cur ieiunum sem-  
per ferè vacuum  
videatur.  
Cur bilis ad ieiun-  
um transmitti-  
tatur.

Ileon situs.  
Cur dicatur ileon.

Quomodo distin-  
guantur fines in  
testini ieiuni &  
principium ilei.

Quæ dicatur inte-  
stina tenuia &  
quæ crassa.

Cæcum quibus  
nominibus dona-  
tum.

Appendix cæci.

Vessalii opinio sus-  
pecta.  
Quid vere intelli-  
gendum sit nomi-  
ne intestini cæci

Observatio pul-  
cherrima.  
Colon intestinū.  
Iter coli intest.

Mundini error.

singulas nominibus appellauere. Ego vero, si post tot seculorum recepta vocabula noui aliquid in medium proferre fas esset, intestina duo esse dicerem, quorum alterum tenue est, crassum alterum. Sed ut aliorum vestigia sequamur: neque enim temere à veterum placitis discedendum est, sex esse dicemus intestina, duodenum inquam, ieiunum, ileon, cæcum, colon, rectumq;. Duodenum, ut ab hoc incipiamus; nam ventriculum subsequitur, ita appellatur, quoniam longitudinem eius duodecim digitorum apicibus metiri possumus: Græce dicitur dodecadactylos, dicitur & ianitor, portanarius, pyloros, aphyxis: quæ nomina nonnulli ad inferius orificium ventriculi transferunt. Duodenum post suum à ventriculo exortum, spinam versus descendit, quod postquam peruenit, assurgit, & gyris initium dat; ibiq; terminum habet, vnde est origo ieiuno intestino, quod longum admodum est, sed duodeno tenuius.

Ieiunum dicitur, quoniam in cadauerum dissectione vacuum semper reperitur. hoc autem contingit, propterea quod chylus hac præteriens adhuc fluidus est satis: deinde ob bilis vesiculæ meatum, qui in huius principia desinit. transmittitur autem bilis, ad eum locum naturæ prouidentia, ut vis expultrix ad suum munus excrémentorum eijciendorum excitetur. hisce itaq; duabus de causis hoc intestineum ieiunum antiquiores appellauere. cui ileon succedit ob va-

rias spiras ita nuncupatum: etenim satis longum existit. sed illud scias velim ilei principium, nec non ieiuni fines non ita cuiq; in Anatome peruios esse; nam eadem substantia, colore eodem conspiciuntur. Neq; ego alia via discriminè horum inuestigo, quam quod venæ mesaraicæ in ieiuno ipso tum maiores, tum frequentiores, quam in ileo spectantur: cuius ilei fines à coli principiis excipiuntur. Atq; hæc tria intestina, quæ hætenus memorauimus, tenuia omnia sunt. Tria vero alia, quæ consequuntur, crassa sunt, cæcum inquam, colon, & rectum. Cæcum monoculum quoq; dicitur, & saccus:

vno namq; foramine duntaxat donatum est, quod foramen coli ipsius pars esse videtur; cui sua adest appendix longiuscula, tenuisq;, ob quam Vessalii cæci nomen huic intestino impositum fuisse arbitratum. Mihi vero secus videtur, veteres scilicet, cæci intestini nomine intellexisse quicquid à tenuiorum intestinorum insertionem ad colon usq; porrigitur. sed hoc interuallum in bobus, suibus, gliris, sciurisq; adnotatu dignum est. à cæco igitur in dextro ilio colon exoriri videbis. deinde ad dextrum renem deorsum flectitur, cui adnectitur; deinde cōuoluitur, sursum reuertitur, & ad abdomen sub vetriculo transuersim fertur, non supra ventriculum, ut Mundino parum

10

20

30



parum Anatomico visum fuit, qui callide commentus erat, dum excrementa in hoc intestino detinentur, ventriculi coctionem adiuvant. Vbi ad sinistrum latus colon peruenit; versus sinistrum renem descendit, cui item colligatur. Deinde rursus inflectitur, & descendit, & cum ad sinistrum ileon accedit, duos gyros efficit, & in rectum tandem intestinum in summo osse sacro finem habet. Colon hoc, quod diximus, oblongum est satis, crassumq; & cellulis hic, atque illic refertum: quare cum amplum admodum futurum esset, natura illi duo ligamenta parauit instar duarum zonularum, quarum

Coli distributio.

Cur colo duo obtigerint ligamenta.

10 vna superius est, inferius altera. At extremum intestinum, quod & longaeon etiam appellatur, rectum dicitur ob situm ipsius. etenim à summo osse sacro ad extremum vsq; coccygem deferitur: atque in ano terminos habet, à quo constituitur. Sunt autem intestina (si naturam illorum in vniuersum scire cupis; postquam historiam didicisti) corpora oblonga, teretia, & concaua, quarum situs is est, quem supra vnicuique assignauimus. Eorum substantia neruea est, ventriculi substantiae non dissimilis. Tunicae illis binae existunt, illae inquam intestinorum propriae, & peculiares, quibus tertia accedit communis, quam à peritoneo mutuo accipiunt; prior interna

Longaeon & rectum.

Intestina quod sint.

Substantia.

Tunicae quot & quibus suis praedictae, & cur.

20 obliquis fibris praedita est; vt continendi munus obire possent; secunda transuersis, vt propellerent. rectas autem fibras aut nullas, aut paucas quidem certe in intestinis conspicias. Chylus namque fluidus in eorum inanitatibus, spatijsq; discurrit, atque pererrat: at fibrae transuersae manuum instar comprehendunt. Varias illis conuolutiones, spirasq; contingere naturae beneficio non vulgari: vt cibus in illis diutius moraretur; neque nostris negotijs, si recta sita essent, impedimento forent. Propterea obseruare poteritis animantia omnia, quorum intestina paucis gyris abundant, subinde famescere, & ad cibum capiendum non modo inuitari, sed etiam cogi.

Cur in intestinis aut paucae aut nullae sint rectae fibrae.

Cur intestinorum circūuolutiones variae.

Causa prima.

Cur animalia quaedam cito famescant.

30 Secunda utilitas est ob chyli distributionem. Tertia, vt feces contineant. Neque neruis destituuntur intestina à sexto pari ad ipsa delatis, neque venulis, quas vena porta subministrat, quas mesaraicas appellant. arterias itidem habent intestina: quamobrem ipsa quoque sanguine aluntur, vimque habent coquendi: si quid à ventriculo incoctum exciderit. propterea natura, quae nihil frustra condidit, omento intestina ipsa obtexit. Sed priusquam huc de intestinis sermonem absoluaui, rem admirabilem adnotes volo, lector candidissime, naturam crassa intestina vndique in abdomine valli instar collocasse, tenuia vero in medio crassorum, vt ab externis iniurijs facilius tuta euaderent.

Secunda causa. Tertia causa. Nerui unde intestinis. Venae. Arteriae.

Intestina aluntur sanguine. Intestina coquendi vim habent. Cur intestina omnino regantur. Crassa sunt valli intestinis tenuibus.

Ciceronis error.

Mesenterion quid  
proprie significet.

Exortus.

Substantia.

Venæ & arteriæ  
mesaraicæ.  
Glandularum vsus  
in mesenterio.Cur multæ glandulæ  
sub ventriculo.Gland. sub ventriculo  
nomina varia.

Mesenterij vsus.

Mesenterij diuisio  
in partes tres.

De omento.

Nomina.  
Situs.

Hipp. error.

Exortus.

Diuisio.

Figura.

Omenti descriptio.

Vsius.

**M**ESENTERIVM, siue Mesaræon (qua voce vsus est Cicero lib. secundo de Natura Deorum, licet perperam mesenterij naturam intellexerit, non enim medium intestinum significat mesenterium; sed membrum est, quod inter intestina medium collocatur) exortum ducit à spina: neq; si introspicias, aliud quicquid est, quam peritoneum ipsum duplex. inter hæc igitur peritonei reduplicationem, quam hoc loco mesenterium appellamus, venæ adsunt, arteriæq; mesaraicæ, adsunt & nerui, & glandulæ complures hic appositæ ob magnam horum vasorum diuisionem, quibus robori sunt, & tutamento. sub ventriculo præsertim harum glandularum nõ aspernanda copia visitur, non modo ob vasorum diuisionem, sed etiam ne ventriculus spinæ contactu læderetur. hæc glandulæ pancreos, siue pancreas, & callicreas, & affusio, & lactes quoq; appellantur. Vsus mesenterij est, vt intestina contineat, ne vel temere implicita euaderent, vel deorsum delaberentur. Videtur in tres partes diuisum hoc, quod dixi, mesenterium, quorum pars colon detinet, quod transuersum fertur, atq; hæc omenti pene portio existit; alia continet intestina tenuia, tertia vero crassa. Sed si cui libeat mesenterium vnum dicere, vel in duas partes secare, ego nihil moror.

Omentum Latinis, Græcis Epiploon, Arabibus Zirbus in anteriori parte omnium intestinorum, nec non supra lienem quoq; situm est; licet secus scripserit magnus Hippocrates hoc à vetriculi fundo iuxta eius longitudinem exortum, & à colo insuper intestino, in duas scinditur partes, superiorem nimirum, & inferiorem; quæ vniuntur, & sacculi, vel marsupij potius figuram præ se ferunt. vt rem in pauca conferam: omentum nihil aliud est, quam peritoneum, in quod tum venæ, tum arteriæ, tum nerui, tum adeps disperguntur; intestinorum tutamenti gratia factum est; estq; non exiguo coctionis conficiendæ adiumento.

## De Liene.

## Cap. VII.

Situs lienis.

Figura.

Cur concauus.

Linea in liene.

**S**PLEN, seu mauius lien, membrum est in sinistro hypochondrio sub costis septo adhærens transuerso, cuius innata figura, oblonga est, instar plantæ pedis supra: gibba est aliquantulum, at quæ inferiorem partem spectat, concauam speciem refert. idq; non temere, sed vt ventriculo cederet. ibi linea adest, in quam eius vasa inferi videbis, propterea nonnullis eminentijs ibidem prædita est.

Color



Color lienis subliuidus est; eius substantia poris, & inanitatibus referta spongiæ in morem, vt humori melancholico crasso, terreoq; ad illam transmissio suscipiendo esset. In lienis substantia, quam dixi, tum venas, tum arterias, illasq; perspicuas nullo negotio deprehendere poteris; licet Galenus oppositum senserit in hoc mire deceptus, ita vt nullus excusationi locus relinquatur. hæc autem venæ, quas in liene conspicaberis, à vena porta deriuantur, cuius sunt rami, arteriæ item ab ahorti sub septo transuerso. Circundatur lien à tenui peritonei membrana, in quam neruulus inseritur à sexta neruorum coniugatione deductus. lienis vtilitas est, vt melancholicus sanguis ab illa attraheretur, cum præsertim eodem alendus esset. In qua nutritione (est autem hoc obseruatu pulcherrimum) acidus quidam humor seiungitur, & per venæ portæ ramum ad ventriculū delatus famem dormientem excitat, quæ vtilitas nullo pacto spernenda est.

## De Vesicula bilis.

## Cap. VIII.

VARIIS nominibus, vt pleraq; alia nostri corporis referta est hæc bilis vesicula; nam aliqui ita appellant: alijs Græca vox 20 magis aridet, cystis fellis, alij rudiore voce dicunt, bursam cholerae citrinæ. hanc naturæ industria sub iecore parte dextera, eaq; concaua collocauit. Figura huius vesiculæ, si quæris, oblonga est; substantia vero membranæ; venas à porta sortita est, arterias vero ab ea mutuatur, quæ ad iecur tendit, neruos demum à sexto pari. Hæc bilem suscipit, continet, atq; expellit; & hic est eius vsus. quæ bilis à vesicula expulsa ad intestina propellitur: vt virtutem eorum irritaret, atq; ad fæces excernendas excitaret, compelleretq; propterea natura nunquam satis laudata meatum vnum duntaxat, (seu porum, seu ductum dicas, nihil interest) prudenter effecit, qui bilem flauam ad intestina, & ieiuni summitatem deferat. Equidem 30 ingenue fateor, me nunquā meatum vidisse, qui ad ventriculi fundum, vel cavitatem à bilis vesica feratur: licet non semel, sed sæpius diligenter intuitus fuerim, non negauerim tamen cum huiusce bilis flauæ magna adest copia, eam ad ventriculum regurgitare cōsueuisse. Sed hoc præter naturam euenit, non secundum naturam. Si enim hic meatus à cysti fellis ad ventriculi capacitatem daretur; in causâ esset, vt is quicquid continebat, dictum, ac factum propelleret. itaq; nulla prorsus coctio in ventriculo confici posset. Immediatè sub iecore sita fuit hæc vesicula; vt bilem susciperet, quæ per vniuersum corpus delata plurimum obesse poterat, prodesse nihil:

cum

Color.

Substantia.

Vfus.

In lienæ videntur arteriæ &amp; venæ contra Galenū.

Venæ lienis vnde

Inuolucrum lienis vnde.

Neruus lienis vnde. Vfus lienis.

Succi acidi lienis vtilitas.

Nomina.

Situs.

Figura.

Substantia. Venæ vesicæ bilis vnde.

Arteriæ.

Nerui.

Vfus vesicæ bilis.

Meatus vesicæ bilis ad intestina &amp; summitatem ieiuni.

A bilis vesica non deferretur meatus ad fundum ventriculi vt fama est.

Cum bilis regurgitat ad ventriculum præter naturam est.

Probatur non debere dari hunc meatum cysti fellis ad ventriculum.

Cur vesica bilis sub iecore sita sit

Ramuli complures  
bilem succi-  
pites & ad eius  
vesicam deferen-  
tes.  
Quid sit bilis.

cum præsertim ignea virtute prædita sit. Igitur à iecore ad bilis vesicam meatus perducitur, qui ab eo ad hanc bilem deriuat. scito tamen inter venæ cauæ, portæq; ramos, ramulos complures dari, qui licet per iecinoris substantiam dispergantur, omnes tamen in dictum meatum desinunt, qui cum bilem suscepit, illam ad propriâ vesiculam deferat. Est autem bilis, vt omnes norunt, tenue sanguinis excrementum; vt atra bilis crassum eius recrementum existit.

### De Renibus. Cap. IX.

10

Renes duo.

Connexus renū.

Cur ren dexter  
sit superior sinis-  
tro.

Galenus nimis di-  
ligens.

Est imbecillitas  
intellectus repu-  
gnare sensui.

Galenus ratio cur  
dexter ren sinis-  
trum superet in  
brutis locum ha-  
bere potest.

In homine ren si-  
nister est super-  
ior dextro.

Cur sinister ren  
superet dextrū.

Inuoluerum renū.

Neruulus propriæ  
tunicæ renum vn-  
de.

Renum figura.

Substantia

Color.

Venæ & arteriæ  
emulgentes.  
Vfus.

Renes præter se-  
orum, bonum  
sanguinem tra-  
hunt.

Renes aluntur bo-  
no sanguine.

Opinio falsa de  
cibro in renib.

**R**ENES duo numero sunt, dexter scilicet, & sinister: quorum vterque, tum dorso, tum nothis costis annectitur. Illud scitu pulcherrimum est, Galenum diu, multumq; laborasse causam anxie querentem, cur renem dextrum natura superiorem sinistro collocauerit; ita vt dexter ren altius, quàm sinister sit situs. sed profecto nimis accurate, ne dicam inutiliter, hoc inuestigauit Galenus noster; cum sensu contrarium prorsus facillime cuius constare possit. Est autem intellectus imbecillitas teste Aristotele sensui ita palam repugnare; adeo vt verisimiles Galeni rationes inspecta hominis Anatome falsæ appareant, statimq; corruant. Tamen si bruta feces, hæc non temere Galenum scripsisse comperies: in quibus sinister à dextero rene superatur: in homine vero oppositum omnino cernitur. Cur autem in hominibus secus contingat: vt sinister sit dextro superior, potius ob hepar, quam ob lienem euenit. Etenim hepar in nobis permagnum est, lien paruus: at in brutis deorsum vergit. Quare cum renes iecore, lieneq; inferiores admodum existant; consentaneum est, vt illis optimo iure de habitatione accommodent. Integuntur renes peritoneo, eoq; crasso satis: non deest tamen præter peritonei velamen propria renibus tunica, ad quam paruus neruulus, à sexto neruorum coniugio peruenit. Renum figura feseoli vulgo dicti speciem imitatur. spinam versus gibbi, caui quâ viscera spectant. at substantia eorum dura, densaq; est, cordi substantiæ similis; color subruber. In renes venæ, & arteriæ emulgentes inferuntur, perq; eorum corpus disperguntur. Creati fuerunt renes, vt serosum sanguinem attraherent; itaq; iecur expurgarent. Tu vero caue existimes serosum duntaxat sanguinem à renibus trahi; nam cum hoc vnâ boni quoq; sanguinis portio aduehitur, qua ipsi aluntur. In renibus lotium à sanguine segregatur, quod deinde in aliam cauitatem emittitur: quæ cauitas instar cribri nullo pacto efficta est, vt aliqui falso putarunt; & ab hac cauitate, quam dicimus,

20

30



dicimus, vreteres, hoc est vrinaria vasa nascuntur. Vasa inquam concaua, alba, crassaq; , arteriarum instar, neruea admodum, à renibus ad vesicam vsq; progredientia. progressus autem huiusmodi est. sub peritoneo etenim lumbis adhærentes discurrent: & vrinā ad vesicam deferunt. insertio vreterum sub vesica est collum versus, in quorum vasorum finibus natura duas membranas affabre apposuit illis similes, quas in follibus quotidie intuemur. earum membranarum structura vsus est, vt, posteaquam vrinam ingredientem vesica benigne suscepit; hæ membranæ claudantur; ne denuo retrocedens elaberetur, magno mortalium incommodo, magno sanitatis detrimento; cum lotium post sanguinis distributionem inutile pondus corpori existat. Non desunt, qui harum membranarum ignorance ausi sint asseuerare, vrinam per resudationem in vesica colligi. at isti, si vesicas, quibus loco pilæ ludunt subinde pueri in triuijs; diligenter introspiciant; aerem in illis vesicis reclusum harū quoq; membranarum beneficio contineri, obseruare facile poterunt; neq; mirum illis amplius videbitur, si earundem ope vrina suscipitur ab vreteribus in vesica, & detinetur, ne superius reuertatur. Huiusmodi membranulas in mesaraicarum quoque extremitatibus eadem industria conspiciaberis, vt superius proprio capite explicauimus. Cum emulgentibus dictis venis in corpus renum ingredientum esset; noluit natura solers, atq; in humana fabrica sapiens supra quàm dici posset, membranas in harum ingressu statim apponere; ne sanguis nimium præceps fluere, atque elaberetur, vt sæpe fit, renibus præter naturam affectis: hoc ne fieret curauit renum substantiam in collium, seu monticulorum figurā augeri. hæc enim sanguini occurrenti obijciuntur, obstantq; quo minus sanguis, serumq; ad membranā deferantur; ex qua fiunt vreteres. Quare cum exire prohibeatur, prius per ramos tum sanguis, tum serum per renum ipsarum substantiam distribuitur. At renes, posteaquā sanguinem ob sui alimētum ad sese attraxere, ipsoq; saturati sint; serum purum iam redditum ad vrinarios meatus transmittunt, qui illum in vesicā postmodum deferunt. hæ igitur partes, quas prominentiores dixi: in corpore ipso renum continentur ea vtilitate, quam paulo ante breui, quoad eius fieri potuit, expressimus.

Vreterum vasorū ortus.  
Vreterum vasorū descriptio.  
Progressus vreterum.

Insertio vreterū.

Membranæ duæ in finibus vreterū.

Vsus membranarum vreterum.

Vrina non colligitur in vesica per resudationem.

Membranarū quæ sunt in extremitatibus mesaraicarum vsus.

Renibus affectis sanguis quādoq; præceps ruit.

Renum substantia cur monticulorū figura.

Renum opus.

## De Vesica.

## Cap. X.

**V**ESICA in imo abdomine, quod fumen appellant, sub ossē pubis sita est, cui diligenter est cōnexa: Vesicæ posteriore partē, tum

Vesicæ situs & cōnexio.  
Tutamentum vesicæ.

g

Figura vesicæ.

Cerviæ vesicæ.

Substantia vesicæ.

Fibræ & earum  
vltus.

Tunicæ.

Vrachos.

Vrachi nullus vltus  
in lucem editis.Cerviæ vesicæ  
descriptio.Glandulæ parastata.  
Vltus parastatum.Meatus cõmunis  
lotio & semini.  
Semen qui exeat.Musculi in finibus  
colli vesicæ vltus.In vesica venæ &  
arteriæ & cur.Nervi duorum ge-  
nerum ad vesicam.  
Vesicæ vltus.Cur vesica fontis  
imaginem referat.  
Vesica in fœminis  
vbi.Pleura quæ ambi-  
at in thorace.

te, tum rectum intestinum, tum sacrum os illi maximo est tutamen-  
to; itaq; optime custoditur. Eius figura rotunda quidem est, sed  
oblonga, intus autem concaua fatis. hæc in cervicem, meatumq;  
vrinarium definit. substantia vesicæ nervosa existit, crassa fatis, tri-  
bus fibrarum generibus donata, vt Galenus optime adnotauit: re-  
ctis inquam, transuersis, atq; obliquis, idq; vt tum attraheret, tum  
cõtineret, tum expelleret. Tunicam vnam peculiarem adepta est,  
quæ extenditur, cõtrahiturq;: alteram à peritoneo ascititiâ mutuo  
sumit, qua integitur. E vesicæ fundo in fœtibus vas exoritur, quod  
vrachos nominatur; quoniam huius ductu vrina extra fertur, dum  
in matris aluo delitescimus. exit autem vrachos per vmbilicum, vt  
in tractatu de fœtu latius explicabo; & postquam in lucem proditi  
sumus, huic muneri amplius non deseruit, sed cum vmbilico con-  
nexus vesicam sustinet, quæ, vt antea dicebamus, in collum, & vri-  
narium meatum terminatur. Est autem Vesicæ collum, seu cervix  
eius oblonga pars semidigiti spatio, vt nunc loquuntur, angustaq;  
& pene carnea, cui duæ adstāt glandulæ parastatæ, hoc est assisten-  
tes propterea dictæ, crassæ, & albæ, quæ per vasa chirsoidæ appel-  
lata semen suscipiunt, quod deinde in meatum ad extremū penem  
definientem in coeundi voluptate dimittunt, à quo tandem foras  
pellitur, atque eiaciatur: etenim meatus hic tum lotio, tum semi-  
ni communis est. In eodem collo inter binas dictas glandulas par-  
tem quandam eminentiorem, oblongamq; videre est. quā semen  
exit nullum est foramen patens, & perspicuum, sed foraminula plu-  
ra spongiæ instar, neq; ipsa primo intuitu conspicua: apparent aut  
cum primum glandulas comprimis. Tunc enim illis expressis se-  
men emergit, quod delitescerat. in eiusdem cervicis finibus muscu-  
lus adest constringens, ne nobis inuitis, atq; aliud agentibus vrina  
exeat, atq; absq; interpellatore elabatur. Vesica, vt reliquæ pene  
omnes partes nostri corporis, venas, atq; arterias nacta est, à qui-  
bus alimentum, vitamq; suscipiat: nervos autem duorum generum  
tum à sexto neruorum pari, tum à medulla spinali. Vesicæ vtilitas,  
ne vos multis morer, est vrinam ab vteribus aduectam primo su-  
scipere: deinde aliquandiu detinere: postremo expellere. quamob-  
rem nihil mirum est, si fontis imaginem præ se fert. in fœminis ma-  
trici adhæret, & parastatis glandulis caret.

## De Peritoneo.

## Cap. XI.

Q VEMADMODVM vniuersa Thoracis cavitatis vnà cum internis  
membris omnibus, quæ thorax cõtinet, à succingente mem-  
brana



- brana, quæ pleura dicitur, optime circumdatur: ita in abdominis cauitate membra, vasaq; in eo contenta, à tenui, nerueaq; membrana, quam Græci peritoneum dicunt, siphæ Arabes, magna naturæ prouidètia obuoluuntur. iccirco hanc Græci peritoneum dixere, quod scilicet vasa, visceraq; omnia subiecta prætendat, & circumplectatur. Peritonei figura subsphærica est: spinæ, quo loco se ipsa crassior existit, belle admodum, validaq; connexa est. est aut prope spinam crassius peritoneum, quoniam inde multas in partes diuidendum erat. itaq; iam supra memorauimus quo pacto mesenterium, atq; omentum parturiat, iecur inuestiat, neq; iecur solum, sed lienem quoq; transversum septum, ventriculū, intestina, renes, vteres, vesicam, atque vterum in fœminis, vt suo loco explicabimus: venas quoq; arterias, nervos, glandulas. Peritoneum, cuius historiam nunc præ manibus habemus; quamq; breui absolue-  
 mus absq; verborum lenocinio, vt cōsueuimus, sub transversos abdominis musculos venit, ibiq; cum eorum tendinibus valide connectitur. Animaduerte autem hoc, quod mox dicam; est enim scitu pulcherrimum; atq; à nemine hætenus animaduersum: peritoneum à dimidio abdomine sursum versus anatomen cōspicientibus  
 20 simplicem esse membranā, dispicientibus autem ab vmbilico infra membranam hanc duplicari: cuius reduplicationis vsus est, primū ob arterias vmbilicales nuncupatas, ob vas, quod vracos dicitur; ob venas, arteriasq; sub rectos epigastrij musculos ascendētes (quæ vasa inter hanc peritonei reduplicationem continentur, quam ego primus omnium obseruauī) nec non ob vesicam, deinde hæc eadē peritonei duplicitas, vt ita dicam, in causa est, vt intestina validius, tutiusq; contineantur. Peritoneum interna parte lene est, extra asperum, neq; id iniuria; sed vt dictis musculis, atque eorum tendinibus fortius adhæresceret. multis quidem in locis perforatum  
 30 peritoneum cernes: sed tamen tot locis foramina eius spectabis, quot illi bonus Vessalius assignauit, vel somniauit potius. atque hætenus de peritoneo. nunc reliqua persequamur.

Peritoneum quid  
ambiat.  
Substantia.  
Nomina.

Figura.

Adnexio.

Cur peritoneum  
est crassius pro-  
pe spinam.

Peritonei vtilitas  
attingitur.

Noua obseruatio  
de peritonei sim-  
plicitate & redup-  
licatione.  
Cur peritoneum  
reduplicetur.

Cur peritoneum  
intus lene sit, ex-  
tra asperum.

Vessalli error.

## De Abdomine.

## Cap. XII.

IN abdomine (est autem abdomen regio illa, quæ inter costas, & os pubis sita est, quodq; Græci epigastrion, Arabes mirach vocant) præter membra illa nutritioni deseruientia, iecur inquam, splenem, ventriculum, intestina, renes, vesicam, omentum, mesenterium, pancreas, venas, arterias, nec non peritoneum. adsunt  
 g 2 quoque

Abdomen qui sit  
& eius nomina.  
Quæ in abdomine  
continentur.

Ope membr. gener. species æternæ philosophis.

Ex memb. generationis quæ sint communia & quæ propria.

quoque membra alia generationi opem ferentia, quorum ope species æternas fieri autumant naturæ arcanorum indagatores. Quam obrem, posteaquam ea, qua potuimus, breuitate, & perspicuitate historiam de nutritioni deferuentibus membris absolvimus; reliquum est, ut de illis, quæ plantando homini necessaria sunt, nunc verba faciamus. ex quibus nonnulla utrique sexui communia, non nulla propria sunt; communia cum dico, vasa seminaria, & testes intelligo, propria vero in mare penem, in foemina utrum.

De vasis seminarijs, testibus, eorumq; membris. Cap. XIII.

10.

Vasa seminaria duplicia & usus eorum.

Nomina.

Præparantia vasa sem. quatuor. Deferentia vasa seminaria quatuor.

Præparantium vasorum descriptio.

Venæ seminales unde oriuntur.

Anatomicorum opinio cur vena sinistra seminalis oriatur ab emulgente.

Anatomicorum opinio confutatur.

Causa vera cur vena sem. sinistra oriatur ab emulgente.

**D**VPLEX igitur genus est eorum vasorum, quæ seminaria appellantur, quorum alterum materiam ad testiculos deferret, ex qua semen elaboratur: alterum vero, quod iam elaboratum est in testibus semen, ab ipsis suscipit, & ad penis radicem deferret. propterea hæc vasa deferentia, illa præparantia vno anatomicorum ore appellantur. Præparantia quatuor sunt tam in mari, quam in foemella, licet in hominibus longiora sunt, in mulieribus breviora. Deferentia vero duo; neque in hoc interest, an de mare, vel foemina loquaris: totidem namq; in utroq; conspiciuntur. Præparantia itaq; generationis materiam vasa sunt venæ duæ seminales dictæ, duæ item arteriæ eadem voce nuncupatæ. Venæ, ut in tractatu de venis. fufius diximus, in exortu suo variæ sunt: nam dextra à vena caua sub emulgenti pullulat: at sinistra ab ipsamet emulgente deducitur.

20

Anatomici, posteaquam harum venarum diuersitatem conspicati sunt, sinistram feminalem ab emulgente originem trahere censuerunt: quod necesse esset falsum humorem ad testes deferri, cuius titillatione se in coitu tantopere aiunt commoueri. Ego vero sententiam hanc falsam esse prorsus opinor; nam multos noui, quibus, ut ab hernia intestinali, quæ enteroceles græce dicitur, sani euaderent, testis sinister ablatus fuerat; qui tamen dum mulieribus coirent, eadem voluptate, qua antea, se perfrui solere, mihi de industria diligenter interrogati, sanctæ iurabant. alia igitur huius diuersitatis causa quærenda est; cū prima nullo pacto satisfaciatur; & dicta instantia allata statim corruat. Ego causam, quam verissimam puto, in medium adducam; vos eritis iudices. Cum hæc seminales venæ exiles admodum sint, & parvæ: atque in sinistro latere magna arteria prope venam cauam sit sita, quæ arteria magna nunquam non viuus nobis mouetur; periculum ingens, atq; adeo euidentis imminet,

30



- nebat, ne hæc tenuis uena in ijs perénibus motibus disrumperetur. Natura igitur prudens, vt hoc incommodum euitaret, sinistram feminalem venam ab emulgente, non à venæ cauæ trunco decidi voluit: ne in descensu supra magnam arteriam iaceret. At duæ arteriæ, quas feminales diximus, à magnæ arteriæ trunco sub emulgentibus scaturiunt. Hæc vasa dum descendunt, primo aliquantulum distant; postmodum ita implicantur, vt vena arteriam, arteria venam ingrediatur; fitq; præclara illa, & admirabilis, ac aspectu iucundissima, à Græcis hominibus vocata anastomosis: quod genus Anastomoseos, si in corporum dissectionibus te accuratum præstabis, in alijs quoq; partibus comperies, in brachijs præsertim, & cruribus. propterea quandoq; euenit, vt vena vna duntaxat sauciata nō modo naturalis sanguis vniuersus, sed vna vitalis quoq; effluat, ita vt vulneratus intereat. horum vasorum plexus vitium capreolis cōferri non inepte potest. qui plexus summo studio, arteq; mira effectus est; vt scilicet materia illa, atq; ille seminis apparatus, qui primo ruber erat, sensim alterari, parariq; inciperet, & albesceret. qua elaboratione inchoata, non dubium est, quin magna pars laboris testibus imminuatur, quorum hic vniuersus labor futurus erat, ni
- 10 horum vasorum complexus, hæc venarum, atque arteriarum anastomosis suppetias attulisset. Iccirco hæc implicatio deorsum vsq; ad testes descendit: perforatoq; epididymo ad ipsam testium substantiam penetrant. Ab hisce duobus vasis aliud vas oritur, quod deferens chyroides, & variciforme nuncupatur, crassum, anfractuosumq;: supra testem inuertitur: deinde sensim assurgit eodem itinere, quo deorsum descebat; ita vt reuertantur, vnde exierant præparantia vasa, perq; idem foramen ingreditur, quod in tendinibus musculorum abdominis descendendum, ascendendum, & obliquorum supra os pubis situm est: quo loco pubis os cavitatem
- 20 habet superficialiam, vt cederet horum vasorum rotunditati. Vbi in abdominis capacitatem peruenit, deorsum fertur prope os pubis, & sub vesica, vbi magis, ac magis amplificatur; & iuxta fines suos multum implicatur, & contorquetur, donec in glandulas parastratas eandem implantetur, quæ ad penis radicem, & vesicæ fines collocantur. in quibus gyris, & obuolutionibus, plexisq; implicitis, & glandulis tantum seminis continentur, quo tres, quatuorue fœtus feri facile possent, præsertim in fœcundioribus. propterea nihil mirum nobis videri debet, quod Aristoteles tanquam admirandum proponit; taurum, cui quanquam testes execti fuerant, genuisse tamen. Atq; hæc sunt in homine generationi dicata vasa; nam in mulieri-

Arteriarum feminalium ortus.

Anastomosis venarum & arteriarum in pluribus partibus corporis.

In vulneribus cur quandoque sanguis vniuersus exeat. Plexus vasorum feminalium, & cur.

Anastomosis vasorum feminalium quousque progrediatur. Deferentis variciformis vasis descriptio.

Foraminis in tendinibus musculorum abdominis utilitas.

Glandulæ parastratæ vbi sint sitæ.

Cur tor gyri & glandulæ.

Quod Aristoteles tanquam mirandum proponit non est mirandum.

Vasa gen. in mul-  
 liberibus abdomē  
 non prætereunt.  
 Mulieres in vteri  
 cavitatem semen  
 fundunt.

mulieribus ipsis neque abdomen prætereunt, neque in parastatas  
 desinunt, neque ad vesicam perueniunt, sed ad matricis duntaxat  
 cavitatem, in quam semen transfundunt.

## De Testibus.

## Cap. XIII.

Testes cur. didymi  
 dicti.  
 Locus testium.

Testium figura.

Substantia.  
 Testium in scemi-  
 na situs.  
 Substantia & figu-  
 ra.  
 Situs testium in ma-  
 re & scemina.

Testes in mare ha-  
 bent plures tuni-  
 cas.

Anatomici certat  
 de membranis  
 testium.

Administratio tes-  
 tium.

Membranz testium  
 propriæ tres.  
 Vesalij error.  
 Prima membrana  
 testium propria.  
 Ortus.

Erithrois.

Secunda membra-  
 na Dartos.

Tertia membra-  
 na.

Epididymos.

Error nonnullorū.

Testes sceminarū.

**T**ESTES vocant Latini, quos Græci didymos vocant. didymos  
 autem vocant, eo quod duo sint. locus testium in homine scro-  
 tum est ipsum, quod oscheim dicitur. qui situs ita notus cuiq; est,  
 vt nulla descriptione indigeat: illis præcipue, quibus cum magnis,  
 & fecundis testibus res præclare, & foeliciter agitur. eorum figura

10

orbicularis est, at non exquisita, sed oblonga ouorum instar. Sub-  
 stantia rara, laxa, alba, mollisq; in maribus: sed in sceminis intus in  
 abdomine occluduntur, neque ita crassi sunt, neque adeo rotundi,  
 & molles, quemadmodum in uiris. Testes in utroq; sexu feminis  
 generationis gratia conditi sunt; nam absq; his neque semen gigni,  
 neque generatio perfici posset; membranis pluribus in homine ob-  
 ducuntur, de quibus magna lis, magna controuersia, ne dicam cō-  
 fusio apud Anatomicos reperitur: cuius in causa fuisse arbitror dis-  
 secandi uel imperitiam, uel negligentiam, uel utrumq; dum alte-  
 ram ab altera uel parum perite, uel oscitante seiungebant. nos au-  
 tem conabimur dilucide satis hæc distinguere. Igitur membrana-

20

rum in testibus alias communes, peculiare alias appellamus. Dum  
 scrotum hominis dissecandum ob oculos habes pro testium anatome  
 conspicienda, primo occurrit tibi cuticula, deinde cutis, quæ  
 in hac parte est tenuissima, rugosaq; deinde membrana carnea, in-  
 ter quam, & cutem nulla adest pinguedo, ut facilius extendi, &  
 contrahi, elongari, & corrugari posset. Propriæ testium membra-

næ tres numero sunt, quamuis Vesalius duas solum agnoscat: qua-  
 rum prima (de tribus externis nunc loquor) oritur à neruea tenui-  
 tate musculorum obliquorum descenduntium, quam ego erithroi-

30

dem appello, fibris carneis intertexta, quæ testis musculum confi-  
 ciunt. Secunda Dartos dicitur, quæ nihil aliud est, quàm perito-  
 nei ipsius substantia, candida, uasisq; adhærens, & affixa. Ab hi-  
 sce membranis, quarum partem proprias membranas, partem com-

munes dicimus; & uasa seminaria, & testes inuoluuntur. Tertia,  
 & postrema testis substantiam immediate integit, alba colore, strui-  
 ctura crassa, quam ego epididyma appello, quicquid alij sentiant:  
 nam aliqui epididyma uocant plexum illum uasorum, qui supra te-  
 sticulum cernitur. Testes sceminarum una duntaxat membrana  
 epididyma



epididyma à nobis dicta circumdatur, & à peritoneo: neq; illis pluribus opus erat, membranis, cum in abdito, tutoq; loco, in naturæ inquam penetralibus contineantur. Quo loco ob innatam mulierum frigiditatem positi sunt; at uiris extra prominere uoluit; ne asiduæ coeundi cupiditate torquerentur, quod & uitæ breuitatem inducere, & à negotijs peragendis non abducere non potuisset.

Cur sceminarum testes pauciores habeant membranas.  
Cur testes in foeminis intro collocentur.

## De Pene.

## Cap. XV.

- 10 **N**on existimetis deesse nomen peni: penè etenim sunt innumeralia, cum plura sint in vnaquaque lingua tritissima: & in dies ioci gratia efformentur parasitis, & otiosis hominibus, ac in venere pronis, ab amatoribus, à mœchis, à procis, à lenonibus, à meretriculis, à lasciuis poetis, à scurris: nos autem, qui nominibus tantum studemus, quantum nos in rerum ipsarum notionem deducunt: pauca duntaxat enumerabimus. Penis itaque dicitur, caulon, mētula, virga, virile membrum. Eius figura non modo vel eunuchis ipsis, & lippis notissima est; situs item notissimus: substantia vero per paucis admodum cognita est; quamuis cognitione digna, & nō vulgaris existat speculationis. Nam in homine penis substantia neq; 20 offsea est, vt in lupo, cane, & vulpe mare: quæ si offsea in nobis foret, & instar baculi rigidi semper prominere; multis negotijs gerendis impedimento non esse non poterat. Neq; cartilaginea est, neque ex ligamenti constat substantia, neque musculosa, neq; nervea, neque vena, neque arteria, neque membrana, licet ex ijs, quæ enumerauimus, nonnulla ad penis ipsius structuram cōcurrant. at nulla ex ijs seorsum sumpta conficiendo peni accomodabatur; neq; enim id præstare potuissent, cuius gratia illum natura parens genuerat: neque enim lotij vnus emittendi, sed seminis quoque in vterū 30 sobolis gratia eiaculandi natura penem effinxit. Cum igitur natura humani generis sollicita indiuidua quotidie peritura animaduertet, miserta est; & ut per speciem, ac propagationem immortalis homo euaderet, sedulo curauit. hominisq; penem ex substantia quadam efformauit, quæ & erigi, & flaccescere, & rigida fieri, & vieta posset. spongiosa itaque merito est, rara, porosaq; penè lienis substantiæ similis, quam tamen crassius induit ligamentis, quæ vna cum rara, quam diximus, penis substantia ab inferiore parte ossis pubis, non à superiore (vt male in hoc Galenus) ortum ducit suum. Hæc quæ diximus, ligamenta ex inferiore pubis osse exorta sunt, & quidem in ano origine carnea; deinde superiora versus tēdit: in medio vero

Nomina penis.

Nominibus student medici ratione rerum.

Penis figura.

Situs.

Substantia penis in homine qualis.

Cur penis non sit offseus in homine.

Cur non sit cartilagineus.

Cur non constet substantia ligamenti musculi, nervi, venæ, arteriæ membranæ seorsum.

Vius penis.

Sua substantia penis cur talis.

Ortus penis.

Galeni error.

Ligamentorum penis implicatio.

Glans penis qualis.

Cur arteria in pene.

Quomodo fiat erectio penis.

Viriliter ligamentorum.

Arteriarum penis virilitas omnibus alijs ignota.

Vessalij error.

Musculi penis quatuor.

Meatus communis lotio & semini in pene ex quibus consistet. Penis tegumenta. In pene non est pinguedo, & cur.

Præputium.

Cur Iudæus dicitur apella.

Vteri nomina diversæ.

Situs.

vero ossis pubis plus minus dextrum principium cum sinistro vnitur, coitq; Deinde deorsum versus inflectuntur, & ad Glandis fines implantantur, quæ glans reliquis penis partibus minus dura existit. Dextrum ligamentum cum sinistro iuxta penis longitudinem vniuntur. At penis substantia, quippe quæ rara compage, porisq; multis constabat, erectioni in coeundo necessariæ parum apta futura erat, & vno ligamentorum auxilio tantundem fere opis assequebatur. Natura provida arterias duas per hæc, quæ diximus, corpora diffundit, quæ à radice penis ad extremam vsq; glandem recta feruntur. sed infinitos (vt ita dicam) ramulos huc, illuc dispergi iussit. cum vero noui hominis gignendi libido incessit, magnam spirituum vim per arterias illas, quas diximus, capillaresq; arteriolas diffundit, & ad penem detrudit, quorum auxilio substantia illa paulo ante rugosa, & flaccescens attollitur, erigitur, indurefcit, riget. fulciunt autem illam, quæ antea diximus ligamenta, quæ crassa sunt duobus nominibus, tum ob hoc, tum ne spiritus cito nimis euolarent absumpti. Has autem arterias penis, atque hoc earum munus nemo hæcenus, quod sciam, ante me cognouit, vt in tractatu de arterijs latius diximus; per quas alimentum quoque deferitur: cum in pene nulla adfit vena, nullus neruus, vt Vessalius in hoc deceptus perperam existimauit. Præter quæ hæcenus memorauimus ad penis fabricam à natura excogitata, quatuor quoque musculi adsunt: vt in nostro libello de Musculis latius habetis. adest insuper communis ille meatus, tum semini, tum lotio, qui sub hisce duobus corporibus positus est; neq; aliud est quicquam, si recte perpendas, quàm vesicæ substantia ad penis fines elongata. hæc autem omnia integuntur cuticula, cute, carnea membrana, nulla præsentē pinguedine: vt in scroto dicebamus. quam hic motus gratia deesse opinor: & vt ne in tantam molem penis ipse excreceret, qua vterus expauesceret; licet hunc rerum omnium capacissimum meretrices prædicent. Pars extrema penis præputium dicitur; estq; pellis illa, qua glans integitur, quæ in coitu ipso nunc sursum, nunc deorsum fertur infinita propemodum mulierum voluptate, & tentigine. hæc in hebræorum circuncisione aufertur: propterea vetus verbum est Iudæus apella. Quæ res magnam voluptatis partem hebræis mulieribus adimit; dum venus, oscula amantum quinta parte sui nectaris imbuat.

De Vtero, siue de Matrice. Cap. XVI.

**S**IVE mitram dicas, siue hysteram, matricemue, vterum, aut vuluam, nihil refert. Situs eius est in abdomine inter vesicam, rectumq; intesti-



- intestinum. en qui superbis homuncio, terra, & cinis inter excrementa natus. Sed ad Anatomen reuertamur; nimis enim profecto miseri sumus, si rem ad viuum confideremus; neque nos philautia cœcos efficiat. Vterus anteriore parte ab osse pubis, posteriore ab osse sacro, à lateribus ab ossibus ilium tanquam firmissimis, ac tutissimis vallis circumdatur, ex quibus sacro osi, & pubi connectitur. Figura vteri tum rotunda, tum oblonga est, supra deprimitur magis, quàm infra. Illud potissimum pro comperto habeas, vteri muliebris figuram à bouillo, caprino, & ouillo non parum differre: 10 quicquid Galenus in hoc parum Anatomicus in lib. de fœt. formatione, nec non de dissectione vteri scriptū reliquerit. Crassam vteri substantiam, carneam, & nerueam quoq; natura mixtam esse voluit: vt, dum fœtum continet, facilius extendi, & dilatari posset. Tribus generibus fibrarum intertextis constat matrix; vt Galenus optime docuit; rectis inquam, obliquis, & trāsuerfis, vt semen pro fœtu effingendo attraheret, cōtineret, statōq; tempore expelleret. Interna vteri cavitates vna duntaxat est, præterea nulla, atq; illa parua satis, in qua tamen, licet vna sit, & exigua: iuxta immisi feminis quantitatem non modo fœtus vnus formari potest, sed gemini, tres, 20 vel plures fœtus; vt in multis Europæ vrbibus non semel contingit: qui deinde nō cellulis, sed proprijs membranis à sese mutuo distinguuntur, quemadmodum tunc apertius explicabo, cum de fœtu ex professo scribere aggrediar: quam partem nostrorum librorum vobis tam gratā fore certe opinor, quàm quod gratissimum. Interim moneo, ne vllam Mundino fidem adhibeatis, quem parum Anatomicum vos quoque iudicabitis, si; vt reliqua nunc illius errata missa faciam; quod de vteri Anatome scripsit cum rei natura conferetis. Inquiens in humano vtero septem cellulas adesse, thalamos etiam, & atria dicere potuisset: tantundem enim esset. Rei veritas hæc est 30 mulieris vterum unica cavitatem præditum esse, quæ intus satis lenis cōspicitur, quamuis nonnulla foramina adsint, quæ nihil aliud sunt quàm venarum, & arteriarum capita, quæ veteres Anatomici acetabula nuncuparunt; quoniam concauæ partes sunt, quibus semen adhæret, tuncq; arteriæ arterias, venas venæ gignunt. Cavitates vteri in foramen satis angustum tandem dehiscit, quod os matricis appellatur; quod si extra spectes, tinchæ piscis, vel canini oris nuper in lucem editi imaginem tuis oculis offeret. hoc autem foramen in matricis collum spectat: per quod foramen vteri semen ingreditur: dum nimia delectatione dilatatur. aperitur autem eo tempore, quo mulier semen emittit. colli, vel ceruicis nomine in utero non cor-
- h pus

Apostrophæ.

Vteri turamenta.

Vteri connexio.

Figura.

Vteri muliebris figura ab vtero brutorū differet. Galeni error.

Substantia vteri qualis. Cur neruea.

Vteri fibræ.

Cavitas vteri vnica.

Quomodo possint in vnica vteri cavitatem plures fœtus generari.

Plures fœtus distinguuntur membranis non cellulis.

Mundinus parum anatomicus.

Faba la est i humano vtero adesse septem cellulas. Cavitates humani vteri vnica est &amp; qualis. Foramina in cavitatem vteri quid sint. Acetabulorum vteri vsus.

Os matricis.

Figura oris matricis.

Os matricis quando dilatetur &amp; aperiat.

Cervix vteri qd

Longitudo ceruicis vteri.

Rugæ in collo matricis.

Rugarum ceruicis vteri vñs.

Caruncularum in finibus ceruicis vteri vñs.

Nympharum situs & vñs.

Hymen in virginibus nonnullis.

Vnde menses fluunt.

Vteri tunica.

Vasa feminaria mulierum in quod distat à viris.

Testes.

Vessalius latas particulas membranas vteri appellat muscolum. Vasa deferentia.

Cornua vteri vere cornua in brutis videntur, secus in homine.

Vteri connexio.

Processus vteri bini. Vñs.

Vessalij error. Iter processuum vteri.

pus illud, quod supra descripsimus; sed partem illam intelligimus, in quam mentula, tanquam in uaginam immittitur, cuius longitudo est, quantum undecim digiti apicibus metiri possumus; rugosa est, & membranosa, non cartilaginea, ut Herophilo placuit, suntq; rugæ illius circulares, ut in coeundo uirile membrum amplexaretur, atque exurgeret: quibus rugis attritio fit, ex qua miram uoluptatem Amantes in coeundo percipiunt. In ceruicis uteri finibus uulvam uersus nonnullæ carunculæ prominent, à quibus uoluptas, ac delectatio in coeundo nō parum augetur. sub hisce uulvæ label-  
 10  
 lis duæ adsunt à lateribus latæ membranæ Nymphæ à ueteribus dictæ, quarū utilitas est, ut à puluere, frigore, & aere uterum tueantur. sub nymphis in nonnullis uirginibus (non omnibus) alia membrana cernitur hymen à ueteribus appellata, quæ cum adest, raro autem adest, obstat quominus penis in uterū immittatur, nam crassa est ualde; supra uescicam uersus foramine donatur, per quod menses fluunt. Vterus humanus, hunc enim describimus, eiusq; ceruix, præter tunicam sibi propriam, peculiaremq; à peritoneo inuoluitur, ut supra attigimus. Vasis quoque seminarijs prædita est matrix, quemadmodum in uiris diximus. hoc uno differt, quod in mulieribus breuiora sunt. Testibus quoq; non destituitur, qui superiori in parte nō nihil depressi uidentur, apud quos sitæ sunt duæ  
 20  
 latæ particulæ membranæ, nonnullis carneis fibris donatæ, quas membranas Vessalius muscolum uocauit. in harum summitate à testibus, hoc est præparantibus uasis deferentia proficiunt, quæ in foemellis non minus anfractuosa sunt, quàm in uiris ipsis: & in matris cauum terminantur. hæc supra, hoc est prope eorum corpus, partes binas prominentes instar uituli cornium nuper erumpentiū profert, quæ forte illa sunt ab Antiquis dicta matricis cornua: verā enim cornuum ueruecis speciem in uaccæ, capræ, canis, ouis, suis, & id genus animalium utero uidebis, nam in his mire incuruantur, & concava sunt, & in his foetus gignuntur. At mulieris uterus longe ab his distat; ut tu quoque, nili conferre pigeat, facile experiri poteris. sed ad uteri humani historiam reuertamur. Auxilio uasorū feminalium, illiusq; membranæ, quam Vessalius pro musculo describit; sacro osi uterus appenditur; in fine uero una cum ceruice osibus pubis, & coxendici. A matricis lateribus (mirum audies) bini processus constituuntur, quæ duo oblonga ligamenta uidetur  
 30  
 esse, neruea, cauq; ligamenti etiam munere fungi creduntur; at ad summum os pubis minime perueniunt, ut Vessalius existimauit, sed per ea foramina transeunt, quæ in nervosis tenuitatibus musculorū obliquorum



- obliquorum descendantium, ascendantium, & transuersorum sita sunt, quemadmodum in uiris, per quæ uasis seminarijs aditus patet. etenim fœminis hi tēdines perforati cernuntur: quamuis Vessalius id inficietur. Processus igitur hi ab utero exorti prope id foramen, quod os matricis uocatur, extra abdomē exeunt; supra pubem ascēdunt; desinunt autem in particulam quandā excelsam in uulvæ apice circumuolutam supra id foramen, unde lotium exit. & hæc lector candidissime illa, illa præcipue sedes est delectationis mulierū, dum uenerem exercent; quam non modo si mentula confricabis, sed uel minimo digito attrectabis: ocyus aura semen hac, atque illac præ uoluptate uel illis inuitis profluat. Hanc eandem uteri partem dum Venerem appetunt mulieres, & tanquam æstro percitæ virum appetunt ad libidinem concitatæ: si attinges, duriusculam & oblongam redditā esse comperies; adeo ut nescio quam uirilis mentulæ speciem præ se ferat. Hos igitur processus, atque eorundem usum cū nemo hætenus animaduernerit; si nomina rebus à me inuentis imponere licet, amor Veneris, uel dulcedo appelletur. Nō dici posset quātopere admirer tot præclaros Anatomicos, tam pulchram rem, tanta arte effectam, tantæ utilitatis gratia ne olfecerint quidem. Vos autem, qui in has meas lucubrationes Anatomicas legendas incideritis, scitote absq; processibus, quos ego uobis paulo antea fideliter descripsi; neque mulierem aliquam in Veneris amplexibus delectationem percepturam fuisse, nullos fœtus cōcepturam; non enim absq; mutua maris, & fœminæ uoluptate cōcipi posse crediderim. sed de his satis. A uenis, arterijsq; seminalibus, (quemadmodum suo loco diximus) tum uenæ, tum arteriæ ad matricis corpus tendentes deciduntur; non ut per has menstruus sanguis expurgetur, ut communis est sentētia; sed ut laudabili sanguine tum illa, tum conceptus fœtus ali commode possit. Non enim hæ sunt uenæ, quarum ope menses fluant mulieribus; sed illæ à uenæ causæ diuisione exortæ, quæ in uteri cervicem ad ipsius latera inferuntur; ut eo loco latius habetis. Vtero duo neruorum genera donata sunt, à sexto scilicet pari, & à spinali medulla. Vulua extra membranosa est, pinguedine referta, non musculosa, ut aliqui opinantur; propterea motu voluntario destituitur. Longitudo, quam supra cervicis foramen uidetis: à natura partus ergo prudentissime confecta est: ut pariendi tempore dilatari posset, & infans in lucem facilius prodiret. Illud historiæ de utero addendum est, ad eius cervicis extremitates uesticæ cervicem desinere, ubi foraminulum adest immediate sub pubis ossē. caue enim existimes, ut idiotæ, &

Tendines perforati.  
Processuum uteri epilogus.

Sedes delectationis in mulieribus.

Quo pacto cogere poteris mulierē semen emittere.

Quæ pars in mulieribus venerē petētibz duriuscula appareat.  
Pars in muliere specie penis.  
Processuum uterivulvæ nemo ante me animaduertit.

Non concipitur absque mutua uoluptate.

Arteriæ, & uenæ uteri vnde.  
Menstruus sanguis non expurgatur pervenas uteri.

Menses per quas venas fluant.

Nervi uteri.  
Vulvæ descriptio.  
Vulva non est musculosa nō movetur voluntarie.  
Longitudo.  
Vfus uteri.

Vnde exeat lotiū in muliere.

Lotium non exit  
per ceruicē vteri.  
Cur ad vesicā col-  
lunt non adsint  
glandulæ paraf-  
tæ.

mulierculæ ipsæ mingentes opinantur, per vteri ceruicem lotium exire. In foeminis ad vesicæ collum non adsunt illæ glandulæ parafatæ, veluti in maribus; quòd vesicæ collum in foeminis, tum breuius, tum latius est, quàm in hominibus.

## De Vmbilico.

## Caput &amp;c. XVI.

**V**MBILICVS, qui & vetula à quibusdam nominatur ratione rugarum quas præ se fert, in medio corpore situs est, vt recte sentit Gal. ipse, & ante ipsum Aristoteles; quanquā Vessalius friuolis quibusdam rationibus delusus contra videatur sentire. Hic iure optimo mediam corporis partem occupat, quòd dum in vtero matris latitamus, per eundem nutrimur, per eundemq; excrementa reddimus. Nihil autem est aliud vmbilicus, nisi receptaculum horum quatuor vasorum, vnius venæ scilicet vmbilicalis dictæ (quæ à matrice ortum sumens per vmbilicum sursum partem quandam iecoris diuisam ingreditur, terminaturq; in venam portæ) & duarum arteriarum vmbilicales itidem appellatæ (quæ deorsum per foetus abdomen tendentes, in duplicatione peritonei iuxta vesicam deferuntur, desinuntq; in diuisione magnæ arteriæ) præter hæc quartum adeft vas vrachos dictum, quòd à fundo vesicæ initium sumens, vrinam ex foetu trahit. ea vero inter amneon membranam, & alantoida referuatur. Sed hæc vasa infante postmodum in lucem edito eo quo diximus munere priuantur: fiunt tamen instar funiculi cuiusdam, ne penitus inutilia corpori existant.



# REALDI COLVMBI CREMONENSIS

DE RE ANATOMICA  
LIBER XII.

DE FORMATIONE FOETVS, AC DE  
SITU INFANTIS IN VTERO.

10



OSTQVAM de organis generationis tam ma-  
ris, quam fœminæ tractatum absoluimus, ne-  
cessarium videtur ad fœtus humani tractati-  
onem deuenire. Quæ in re illud primum admo-  
nendus est prudens, piusq; lector, hominis ge-  
neratione, fœtus inquam, formatione nihil ad-  
mirabilius excogitari posse, nihil quod æque

Continuatio.

Vtilitas historię  
de formatione  
fœtus & nobilitas.

20

naturæ miraculum videatur esse, nihil quod humanum genus diui-  
næ providentiæ, sapientiæq; amore magis inflammet. ea enim arte  
effictus est, atque efformatus hominis fœtus, vt illam admirari ma-  
gis, quàm laudare, laudare magis, quàm exacte introspicere omnia  
possis. nam licet omnibus in rebus Dei potentia, cuius maiestati  
nihil obstat, nihil est difficile, elucere possit; in hoc tamen mihi il-  
lustrior videtur. Hoc igitur argumentum difficile satis nos, quan-  
tum in nobis erit, faciliiori modo, breuioriq; (ni fallor) tractabi-  
mus, quàm hactenus audieritis: idq; rationibus euidētibus, & per-  
spicuis, quantum res ipsa ardua patietur, nostriq; ingenij vires im-  
becillæ; & illarum quæstionum, quæ ad rei cognitionem minime

Difficile est scribere  
de formatione  
fœtus.

30

speculare videbuntur, exactam disputationem prudens omittam.  
quæstiones vero, quas non disputaturus, sed sensus auxilio explica-  
turus sum, illæ sunt. Vtrum semen viri habeat tantum rationem ef-  
ficientis, an vero etiam materiæ. & vtrum mulier concurrat ad ge-  
nerationem fœtus. & vtrum mulier habeat semen; an in coeundo  
semen emittat. & vtrum fiant omnia membra simul. et vtrum om-  
nia reperiantur distincta in ipso semine. et vtrum cor sit primum,  
quod generetur; cum sit vltimum, quod moriatur. Et vtrum fœtus  
nutriatur sanguine menstruo. & an detur superfoeratio. & multæ  
aliæ id genus quæstiones, quas breuitatis causa omitto. De homi-  
nis generatione verba facturus, cur non de brutis loquor, cum ab  
illis

Quæstiones ali-  
quot quæ studio  
se prætermittun-  
tur.

De formatione hu-  
mani fœtus tra-  
ctandum.

Quæ videntur in formatione foetus belluini non sine errore ad hominem transferuntur.

Vfus testium in mulieribus.

In testibus mulierum semen album crassum.

In coitu mulier semen emittit.

Quando fiat conceptio.

Aristotelis error.

Quando mares gignantur & quando foeminae.

Cur quandoque mas gignat quadoque foemina.

Vbi natura dominatur volutate res illa non immutatur.

Cur semen viri non detineatur, semper in vtero foeminae.

Cur meretrices non concipiant, vel raro.

Cum mulier concepit cur os vteri claudatur.

Membrana allantois quomodo generatur, & eius vfus.

A venis matricis oriuntur venae in foetu.

Venae matricis à venis seminarijs oriuntur.

illis dedita opera natura nos distinxerit. Quamobrem non possum illos satis admirari, qui cum de hominis in vtero matris formatione omnia pene ignorarent; & quæ in brutis imperfecte obseruabant, ad hominem maximo errore transtulerat, de brutorum generatione scribere non erubuerint, praesertim de generatione piscium, quos ego in aquis natare, & quo lubet vagari permitto. Illud profecto adnotatu dignum est, testes in mulieribus genitos esse, vt gigneret semen. equidem testari ingenue possum me quandoq; in foeminarum testium dissectione semen inuenisse album, crassumq; quodq; bene concoctum spectatores omnes vno ore faterentur: immo vero qualem in viris ipsis nondum inueni. In coitu igitur, quo tempore vir semen eiacularur, idem quoque à muliere fieri necessarium est: alioqui os vteri, quod angustum esse diximus, nullo pacto aperiretur. at aperiri os vteri necesse est, vt semen ad eius concavum permeet, penetretq; quæ si tunc bene affecta est, semenq; vtriusq; bene concoctum, in vtero ipso vniuntur, & fit conceptio: quicquid de hac re dicat Philosophus, qui ex vno semine animal vnum probat generari. Illud vere scito, si viri seminis moles maior existit, virtusq; maior, marem foetum concipi, ac gigni. sin foeminae semen quantitate, ac virtute superet, foeminam euadere. nam vt maius lumen minus obscurat, ita praesenti maiori virtute minor cesset, necesse est. Præterea cum hoc in philosophia receptum sit, omne simile suum simile appetere: quid mirum, si cum mas marem gignere appetat, foemina foeminam, cum alterius semen alteri nunc praestet, maris exempli gratia, nunc mas gignatur, non foemina; quod si foeminae, foeminam non marem? Quod si posteritatis causa, ita vt fit, marem foemina cupiat, voluntatis hic est appetitus, non naturæ. at in quibus natura dominatur, voluntate non immutatur. Igitur postquam semini ab vtero obuiam itum est, & is in suam ipsius cavitatem illud suscepit, & detinuit (neq; enim quoties viri semen vteri fundum petit, retinetur; sed quandoque excidit, vel quia male coctum est, vel quia loci muliebres nimis humidi, lubriciq; sunt, vt in meretricibus, quæ paucis non sunt contentæ, quarum ager die, noctuq; marium imbris irrigatur) tunc naturæ sagacis, & prouidæ motu statim os vteri arctatur, ne semen, quod tanta voluptate suscepit: aliqua exeat, atq; elabatur. Circa hoc conceptum semen membrana generatur, quæ allantois appellatur, vniuersum semen inuoluens, matricisq; cavitati adhærens. Ne autem semen corrumpatur, dictum ac factum à venis matricis, quas à venis seminarijs proficisci suo loco diximus venæ oriuntur, quæ coeuntes venam

10

20

30



nam producant. quæ dictâ tunicâ tenuem, mollemq; adhuc, quippe quæ paulo ante genita fuerat, perforat. Itaque ad medium vsq; semen allantoide obuolutum penetrans globum efficit, qui globus ipsum est iecur. Deinde gignitur vena porta, quæ, vt dixi in tractatu de venis, continua est huic venæ vmbilicali: (vmbilicalis nâq; dicitur ea vena, quam ad semen penetrare perforata allantoide, hepârq; gignere dicebamus, eo quod per vmbilicum ingreditur, atq; ad hepar ascendit) post venæ portæ ortum oritur caua vena: idque vt vniuersum semen nutrirî possit. Item ab arterijs vteri, quas à fetalibus ortum ducere proprio tractatu docuimus, arteriæ generantur, quæ in duas arterias umbilicales quoq; dictas euadunt; quæ non ascendunt, ut uena vmbilicalis; sed descendunt potius os pubis uersus: diuisioq; illarum est supra ilia. deinde fit magna arteria, & immediate cor, & arteriæ ascendentes: adeo ut arteriæ gignantur, priusquam cor ipsum generetur. Arteriarum autem generatio nō fuit superuacua, sed feminis viuificâdi gratia. Viuimus enim prius uita plantæ, deinde brutorum vita in vtero matris. hoc peractō cerebri generatur, ut nerui ab eo profecti sensum primo, deinde motū ad vniuersum foetum deferre possint. Interim enim alia fiunt membra, quæ delineata primo, deinde aucta, & robustiora reddita mouentur. sileant hic obsecro Aristotelici, una cum principe peripateticorum Aristotele, qui (in hoc mire deceptus) cor primo gigni voluit, & si Deo placet, sanguinis fontem esse, & sensuum omnium; qui nisi obstinate Aristotelem tueri volent, quiescent ueritate iubente: desinentq; tam falsa proferre, & mordicus tueri: fatebunturq; non cor, sed iecur primo gigni. Cerebrum item corde nobilius esse, non fateri non poterunt; quippe quod ex ipso semine fiat, non ab vtero: ut de corde audistis. Non equidem negauerim in ijs animalibus, quæ in ouis nascuntur, primum quod oritur esse cor ipsum. At in homine iecur, priusquam cor generatur; quemadmodum mihi nō semel, sed sæpius intueri, & animaduertere contigit. Inter ossa si quæras quid primo generetur, vertebrae respondebo. Spinam scilicet, ut Aristoteles eleganter scripsit, & vere. Hanc veritatem corona illustrium virorum, & præcellentium magna cum uoluptate uidit in Romano theatro: cum Hieronymus Pontanus summus Philosophus embrionem mēstruum mihi publice disseccandum tradidisset, ob communem Romanæ Academiæ utilitatem: reliquorum autem membrorum quod primo fiat, quod posterius, nondum mihi licuit obseruare: cum abortuum non ea sit copia, quæ in tanta re necessaria esset. Genita allantoide, venis, arterijsq;

Vena vmb ilicali perforat allantoidem.

Iecoris generatio. Vena porta continua est venæ vmbilicali. Quæ vena vmbilicalis dicatur.

Ortus venæ cauæ, & vsus.

Arteriæ vteri vnde oriuntur. Arteriarum vmbilicalium ortus & progressus.

Arteriæ generantur ante cor.

Cur arteriæ generentur.

Fœtus viuuit prius vita plantæ, deinde de vita animalis.

Cerebrum quando generetur, & cur.

Cor primo gigni falsum est contra Aristotelem.

Cor non est fons sanguinis & sensuum.

Iecur gigni prius corde.

Cerebrum nobilius esse corde probatur.

Cor est primum quod oritur in animalibus quæ nascuntur in ouis.

In homine nascitur iecur priusquam cor.

Spina dorsii inter ossa primo generatur.

Aristoteles laudatur.

Hieronymus Pontanus.

De alijs partibus quid primo fiat obseruare nō potuit.



Affusio orbicularis instar placenta.

Vfus.

Galenus nō defecit pñt humanū foetum.

Galenī error. Placētā huius substantia qualis.

Placētē situs. Non circuit vniuersum foetum.

Cucīn partu magnū sequitur sanguinis profluvium.

Ratio situs placenta redditur.

Hæc placenta in brutis qualis sit. Acetabula quæ dicuntur veteribus anat.

Secundina canis instar fasciæ.

Vesalius ait ut qui secundinam canis cum pinxisset non catulum sed infantulum in ea pinxerit.

Allantois membrana in homine qualis.

Allantois qualis sit in brutis.

Allantois quid significet.

Tertia membrana agmios qualis & eius vsus in humano foetu.

Sudoris detēti ab agmio vsus.

Cur præter urinā & sudorem non sint alia excrementa foetus.

Foetus nutritur sanguine laudabili, non mēstruo.

Error vulgi. Urina infantis ubi seruetur.

Cur urina non attingat scrotum.

arterijsq; per vmbilicum tendentibus; quæ suo in exortu plurimæ sunt, vt fulcirentur, natura affusionem quandam genuit, quæ orbicularis fit placenta in modum. facta autem fuit, vt uasa, quæ diximus, vnita detineret: hæc à Galeno, qui humanam non descripsit, membrana chorion, hoc est secundina appellatur. Sed hæc in nobis minime est membrana, sed crassa quædam materia excrementorum instar. vsus eius est, quem paulo ante dicebamus. hæc licet allantoidi superposita sit, tamen foetum vniuersum minime circuit, matrici admodum cohæret. itaque nihil mirum est, si in partu magna sit sanguinis effusio; venæ etenim, arteriæq; disrumpuntur.

Anteriore in parte sita fuit, vt propugnaculi vicem gereret, quod nos ab externis iniurijs tueretur. hæc in brutis, ut boue, capra, equa, & id genus animantibus membrana quidem est, internam regionem omnem ambiens, in illisq; quibusdam eminentijs prædicta est, quæ à veteribus acetabula appellatur. In canibus hæc, quæ dicimus, secundina est instar fasciæ, quemadmodum illam Vesalius pinxit, qui caninam pro humana pinxit; licet in ea non catellum, sed infantulum pinxerit; sed secundina in homine est, quemadmodum ego supra explicauī. Allantois vero in nobis membrana insignis, & magna vniuersum foetum inuoluens, ante scilicet, retro, infra, supraq; sed in animalibus, quæ paulo ante dicebamus, facta est in morem farciminis, quod uox græca sonat allantois; neque in illis foetum undiq; ambit, sed illi substernitur, neque illud temere, sed ut urinam suscipiat. Præter hæc, quæ hæctenus memorauimus; tertia est in humano foetu consideranda membrana, qua neque bruta ipsa destituuntur. hoc unum interest, in illis crassa est, quemadmodum ait Galenus. in nobis autem tenuissima est. dicitur agmios, uel ammios; ab hac quoq; uniuersus inuoluitur foetus, & in ea immediate foetus situs est; & sudor à foetu emanās, atq; eius excrementum continetur, in quo sudore innatat, atq; ab eo fulcitur: ita enim minus molestus est puer matri. Ne mireris autem à foetu alia excre-

menta non decidi præter urinam, & sudorem: nam ratio in promptu est, quod scilicet foetus ex solo sanguine alitur, eoq; laudabili, non mēstruo, & teterrimo, ut uulgus hominum putat. Sudor, vt diximus, penes foetum seruatur hac in mēbrana, quæ ammios dicitur; urina uero ipsa, alterum scilicet foetus excrementum seruatur inter amnion, & allantoida. hoc autem non temere, sed summa cū prudentia effecit Deus Omnipotens, ne lotium attingeret foetum, qui cum tenellus sit, supra quam dici possit: à lotio salso, atq; acri facile exesus fuisset. Natura itaq; Dei ministra in fundo uesticæ porū, seu



seu meatum genuit, qui vracos nominatur, qui à vesicæ fundo ad umbilicum sursum fertur; exit vero ea in parte, per quam vena, arteriaq; umbilicalis ingreditur, ipsiq; adhærescit. hic uracos amnion membranam perforat, itaq; fœtus urinam in allantoidem defert. Hic quærere aliquis posset, neque id iniuria, quo pacto tanta excrementorum vis tam diu non putrescens detineatur. Cui respondere facile possum, id caloris naturalis conferuantis uirtuti acceptum ferendum. Neque hæc tam diuturna excrementorum fœtus conseruatio inutilem profus naturæ existimes, imo uero & dum in utero  
 10 fœtus alitur, ita ab vtero gerentibus facilius sustinetur. Dum uero partus instat tempus, has duas membranas amnion, & allantoida disrumpunt, & exeunt, secumq; una fœtus. propterea obstetrices duo, quæ diximus, excrementa aquæ nomine pæssim vocant. cum aquam exeuntem uident, partum mox in lucem proditurum astantibus prædicunt: qui si tunc exit, partus ipsius exitus est facilior, feliciorq;. Nam parum excrementorum humiditate partes lubricæ redduntur. quod si remoratur, magna cum difficultate, ægreq; parituram puerperam certo scito. Scire omnes cupiunt, quæ sit pariendi dolorum causa potissima: quibus breui satisficiam, dolere  
 20 vehementissime parientes ob angustiam oris matricis, quam tunc adeo dilatari necesse est, ut fœtui absq; difficultate exitus pateat. & quoniam ex mulieribus nonnullas inuenias, quibus os uteri durius est, & nerueum magis, hinc dolores parturientium nõ sunt iidem; sed aliquæ statim, & pene sine dolore pariunt; aliæ diutius in doloribus, & cruciatibus, illisq; uehementissimis versantur, priusquam pariant: ita ut inueterata sit inter mulierculas, & vetulas opinio, in ipso partu nullum esse os, quod suo stet loco mulieris parturientis; sed omnia dimoueri, atque è sua sede exire. licet rei ueritas hæc sit: os coccygis duntaxat in partu pati. propterea obserua mulieres,  
 30 quæ peperere: de regione coccygis sæpe, multumq; conqueri. sed iam ad fœtum ipsum redeamus. Fœtus in matris vtero alimentum per umbilicum suscipit, venæ umbilicalis ope: fabulæq; sunt, quas magnus Hippocrates, qui omnia scire non potuit solus: de pueri nutrimento in aluo matris dixit: quodd scilicet per os exugat, & profecto tanti viri errorem tam crassum nequeo satis mirari; nam inter os fœtus, matricisq; substantiam multum interest. sed fac nullum inter hæc spatium dari; age, os fœtus vteri corpus attingat: quo pacto succum, qui vel in matris ventriculo est, aut in intestinis, exugere posset optime Hippocrates? Quamobrem haud dubie scias candide lector, fœtum nihil profus per os assumere. quodd si assu-

Vracos quid, ubi & cur.

Cur sudor & urina pueri rot mensibus detenta nõ putrescant. Vilitas sudoris & urinae dura in utero sumus.

Vilitas sudoris & urinae in partu.

Quid appellent obstetrices aquæ.

Si cum excrementis exeat fœtus partus est facilis & cur. Cur tanti sint dolores parturientium.

Cur aliæ magis, aliæ minus dolent in partu.

Ossa omnia mulieris in partu è sede moueri falsum est. Coccyx in partu patitur.

Quomodo fœtus nutriatur.

Hippocratis error maximus refellitur.

Infans in vtero alitur per venâ vmbilicalem sanguine perfectô.

Cur sanguis è quo alitur infans in vtero per vasa seminaria defertur.

Sanguine menstruo non alitur probatur.

Aliquibus vtero gerentibus fluit menstruus sanguis.

Quibus prægnantibus menses non fluunt cur non fluant.

Menstruus sanguis quid sit.

Menstruis non ardeunt arbores.

Causa erroris Hippocratis quod infans ore sugat cibum in vtero unde manauit.

Cur quod in intestinis infantis, qui in vtero est continetur non male oleat.

Quibus membris dum in vtero sumus non sit opus vi.

Infans in vtero non indiget vfu cordis

In vtero per arterias respiramus.

meret, suo ipsius sudore hausto obrutus non interire non posset: sed per venam vmbilicalem duntaxat nutriri, nutriri inquam bono sanguine, atque adeo perfectô, qui per vasa seminaria defertur: quod iccirco factum fuit, vt materiam vnâ cû sanguine continenter deorsum ferrent, tanquam auxiliares copias, si quandoque sanguis deflisset. Quod si perfecti seminis numeros omnes non explet, nihiloscius materia est, quâ natura eo mittit, vt in semen tandem conuertatur. Vana quidem est, falsâq; eorum sententia, qui foetum sanguine mēstruo nutriri aiunt. nam quod illi pro huius rei probatione in medium afferunt; dum foetus in vtero est, statò tempore mensis non fluere, nihil est; nam ego complures noui, quibus vtero gerentibus singulis mensibus menses profluebant; quod ob magnam sanguinis copiam in illis mulieribus euenire certum est. Quibus vero tanta sanguinis copia non adest; ijs, dum grauidæ sunt, neque adsunt menstruæ purgationes, quia non gignitur, quod superuacaneum sit naturæ inutile, & ab vtero eiciendum. sed vniuersus ad foetum ipsum naturæ miraculo distribuitur. Nihil enim aliud esse existimato menstruum sanguinem, qui diuersis rationibus diuersas habet appellationes, quàm sanguinem superuacuum, qui herbas, atq; arbores non cogit arefcere: quemadmodum scripsit Aristoteles. Hippocratis vero sententiam, quod infans ore sugat: hinc ortam puto: quod is materiam illam, quæ in foetus intestinis conspicitur; fæces, cibi; excrementa crediderit, quemadmodum in adultis. sed deceptus est bonus Hipp. non enim cibi, sed sanguinis excrementum illud est, quod in foetus intestinis continetur. propterea non male olet materia illa, quemadmodum fæces nostræ. Quod si cibi excrementa forent; emitterentur, veluti lotium emittitur. Itaque vndiq; conspurcati essemus magno naturæ errore, magno infantis detrimento, quod absurdum esset. Natura igitur sapiens noluit nos, dum in vtero matris versamur; neque oculis vti, neq; auribus, neque instrumento odoratus, neque gustus, neque ore, neque pulmonibus, neque ventriculo, neque intestinis, neque ano, neq; pedibus, neque manibus, pedibus. quo enim tendas in illis materni vteri tenebris? quod attrectes? quis penis vfu? quis ani? quis intestinorum, aut ventriculi? quid ore trahere nisi mortem posset? quid gustet? quid olfaciat? quibus harmonijs aures detineat, & mulceat? quorsum oculos flectat, & recreet? imo vero quod magis miraberis; neque cordis vfu tunc eget infans; nam vitalis spiritus, seu maior spiritualis sanguis per arterias matris vmbilicales ad foetum fertur; quibus arterijs medij, quarumque auxilio respiramus, si illa respiratio





spiratio dici meretur: adeo ut fœtui nihil sit elaborandum, neque in sanguinis, neque vitalium spirituum generatione. hæc namq; à matre iam elaborata ad omnes fœtus partes deferuntur. hæc arteriæ umbilicales, & uena item umbilicalis à matrice ad umbilicum vsq; longo nimirum ductu à peritoneo inuoluuntur ibi crasso satis; quæ uasa contorquentur, & quosdam nodos efficiunt; quibus uisis nodis (non enim iidem numero sunt in omnibus quæ peperere) prædicunt obstetrices, quæ medicæ ipsæ quoq; si Deo placet, uideri uolunt: tot fœtus ab eo utero prodituros, quot ipsi sunt nodi; licet totidem

Arteriæ & venæ umbilicales describuntur.

Obstetricum prædicti tor fore partus quot nodi cernuntur in uasis arteriæ venæ quæ umbilicalis.

Vfus venæ & arteriæ umbilicalis.

Vasorum nexus in umbilico nexus progressus & utilitas.

Non est laqueus qui prædicat suspendendos quæ putant obstetrices.

Quomodo possint gigni plures fœtus in utero licet una tantum sit eius cauitas.

Quomodo fiant mōstra plurium infantium se attingentium.

De situ infantis in utero.

Situs infantis in utero quem imaginabantur, non quem viderant describere anatomici alij.

Temerarium est scribere, cuius oppitum sensu deprehendi possit.

Tres situs soli dantur infantis in utero.

Primus situs.

- 10 plus minus in extremo fœtu, quot in puerpero conspiciantur. Hæc autem uasa creatâ sunt non temere, sed ut sanguis ad fœtum deductus cunctaretur, & cessaret quodammodo in ipso cursu: ut hac cunctatione ad ipsum perueniret. Vasa hæc, quæ diximus, à membranis testâ ad ceruicem tendunt, & circa ipsam flexuntur deorsum tendentes, atque in umbilicum infiguntur. Qui vasorum nexus per sinistram scapulam ascendens per dextram descendit; idq; ut in exitu membranas cum secundina secum vnâ traherent, quod superstiosæ mulierculæ laqueum esse dicunt, atque in lucem editis male oīnantur; quasi illi, si superstites sint: non possint tandem nō suspendi. Sed si diligentius hæc naturæ arcana scrutarentur in illis præsertim, qui non sunt agrippæ, sed capite antesignano prodeunt; idem in omnibus obseruarent: cum tamen pauci suspendantur, non omnes. Illud præterea adnotandum est, quamuis unica adsit in utero cauitas, tamē plures fœtus in illo concipi posse, si apta adsit tot conceptibus materia. quæ cōceptus mareria, semen inquam est; dum uero fœtus delineantur, nisi suis singuli membranis distinguantur, simul cohærent: monstraq; hominū sese attingentium fiunt. De fœtus formatione satis multa hæcenus dicta sunt: Nunc de situ eius in utero dicamus. quā partem libentius, ut opinor, lector candidus percurreret, quod alij non rem ipsam, sed quod verisimile cuiq; uisum est; ita scriptū reliquerunt; omnes tamen à rei ueritate tam aberrarunt, quā qui maxime. Ego uero nō semel, sed sæpius nō modo mortuos fœtus, sed uiuos etiā è matris utero hisce manibus extraxi. quod dum efficerem, situm eius in utero diligenter obseruauui, quem à quibusdā Anatomicorū picturis adeo diuersum esse facile perspexi, ut non potuerim eorū temeritatem non valde mirari, qui quod falsum est, cuius oppositum sensu deprehendi potest, posteris scriptū relinquere non erubuerint. Tres igitur fœtus in utero situs obseruasse fateor, & profiteor, præterea nullos. quorum prior est caput deorsum versum, hicq; est situs omnium frequentissimus.

Secundus situs.

Tertius situs.

Qui primo situ sunt in vtero quomodo exeāt vterum.

Qui secundo situ in vtero continebantur agrippæ.

Qui tertio situ sunt in matrice quomodo in lucem ferantur.

Non potest infans in vtero à capite ad pedes delabi; vel contra.

Quocunq; situ sit infans in vtero sphæricus in oblongum vergens situs est.

Particularis decretio singularum partium infanti quo situ sint in vtero, & vera.

Jacobus Bonus medicus Ferrariensis.

Fœtus humani generationis nutritionis & situs cōsideratio nos ad deum laudandū inuitat.

Secundus capite sursum elato, quo situ raro videtur infantes in vtero. Tertius transuersim iacet, atq; hic est secundo rarior. Propterea priore situ infantes capite præeunte in lucem prodeunt. Secundi pedibus, qui & Agrippæ vocatur. Tertij natibus, facie omnes coccygem matris versus respiciunt. Iam enim explosa illorū sententia est, homines prius quàm vterū exeant, simiarū instar seu funambulorum, & mimorū à capite ad pedes, vel è contra dilabi, & procumbere, vel è cōuerso. Id enim loci angustia minime patitur, quæ tanta est, vt vix nostri sit capax, cū excrementis, membranisque; siue capite elato, siue deorsum labete, vel transuersim siti simus. Quocunq; aut situ ex hoc triplici toties enumerato nos vterus exceperit: in globū atq; orbem excipimur; sphæricusq; est omnis situs infantis in vtero: sphæricus inquā in oblongum vergens, & vt priuatim res magis innotescat, dexterum brachiū nobis tunc flectitur; manus autem extrema vnā cū digitis extenditur; qui digiti sub aure dextera, superq; ceruice positi sunt; sinistrū vero brachium tantū non extenditur, supraq; sinistrā mammā, nec non supra faciem (caput namq; in vtero ita flectitur; vt mentum ad thoracem perueniat:) sinistrum itaq; brachium medio cubito dextero fulcitur digitis semiextensis, pollice deorsum: crura tanta arte sursum feruntur, & incuruantur, quasi in arcū; vt dictū, visuq; res pulcherrima, & admirabilis existat. femur, tibia, pesq; extremus dexter nobis eo tēpore flectitur, adeo vt à femore abdomē attingatur, à genu vmbilicus, deinde tibia deorsum flectitur, calceq; sinistras nates attingit, extremū eleuans pedem, pudendaq; occultās, adeo vt pollice dimidium, tibiā ipsemet tangat, sinistrū crus ipsum quoq; semiflectitur. femur vētrē imū tangit; tibia supra abdomen, thoracemq; vertitur, & sub extremum brachiū. pes aut extremus sursum voluit dextrū olecranium attingēs, sinistriq; brachij metacarpium. dorsum deinde in anteriora fertur, adeo ut ex his omnibus globus sphæricus oblongus euadat. atq; hic est verus, & legitimus situs humani fœtus in vtero, quem ego Iacobo Antonio Bono Ferrariensi Medico præcellenti, qui simplicia medicamēta in Romana Academia publice p̄fitetur, estq; rei Anatomicae, reliquarumq; bonarū artium, & scientiarum tā studiosus, quàm qui maxime: cum eum vnice diligā primum lubens ostendi: Qui rei pulchritudine allectus, & detentus obstupuit, summiq; opificis sapientiam inenarrabilem summis laudibus extollebat. Quis enim fœtus humani generationē, nutritionem, situmq; cōtemplatus non obstupescat? Quis Dei infinitā bonitatem satis laudet? Equidem de his filere fatius est, quàm pauca dicere.

REALDI



# REALDI COLVMBI CREMONENSIS

DE RE ANATOMICA

LIBER XIII.

DE TEGENTIBVS FABRICAM  
HVMANI CORPORIS.

De Cuticula, Cute, Pinguedine, Membrana car-  
nosa, Pilis, & Perioestio. Cap. I.



ORPVVS nostrum, in quo tantum industriae  
natura merito collocavit, vndiq; tectum esse  
decurt, ne ab aere ambiente alterari, ab exter-  
nisq; rebus lædi tam facile posset. propterea  
natura prudens hæc tegumēta genuit, extrin-  
secusq; in vniuersi superficie obduxit, primo  
cuticulam, quam epidermida vocant Græci,

Epidermis & cuti-  
cula.

quæ cutem supereminet, & ambit. hæc nobis communis est cum  
cæteris animantibus; tenuissima est earum pellicularum instar, quas  
inter caparum septa videmus, facile aboletur, facile etiam restitui-  
tur, estq; omnis prorsus sensus expers. Huic epidermidi vera cutis  
subest, derma à Græcis dicta, quæ & ipsa vniuersum corpus inue-  
nit; quædam tamen loca excipio, vbi perforatur, vt in auribus, ocu-  
lis, naribus, ore, pene, ano, vulua, extremis digitis, vbi vngues  
affixi sunt: his addere poteris vmbilicum in foetu. Præter hæc cutis  
foramina, vel lippis nota, & perspicua vbiq; poris refertissima est,  
& instar cribri foraminulenta, per quæ sensui occulta foramina su-  
dor exit. Sed hæc in nonnullis latiora sunt, in alijs angustiora: hinc  
alijs sudor nullo negotio profluit: alijs ægre excitatur. Cutis sub-  
stātia nō est vbiq; eadem: nam hic crassior existit, ibi minus crassa,  
illic tenuior. Crassior cutis in capite conspicua est: licet Aristot.  
oppositum scripserit, cutem, inquam, capitis omnium tenuissimā  
esse. Subtilis admodum est cutis in facie, pene, scroto, vola, atq;  
internis digitis, seu digitorum interuallis; quamuis illa ob exercitia  
frequentia crassescere consueuerit. reliquas corporis partes si accu-  
rate contemplaberis, parum interesse iudicabis: cuius substantia  
neruea est: nerueum autem, seu neruosum cum dico, rem ex neruis  
confla-

Dependit & re-  
nascitur facile.  
Sensus expers.

Derma vera cutis.

Substantia varia.

Aristotelis error.

Vbi tenuior sit cu-  
tis.

Substantia ner-  
uea.

Quid per nerue-  
um sit intelligē-  
dum.

Cutis sentit con-  
tra Aristotelem.  
Vbi sit pertinax.

Adeps sub cute.

Utilitates pingue-  
dinis.

Galenī error.

Generatio pingue-  
dinis.  
In scroto & pene.

Vbi dura reperia-  
tur adeps.

Error Auicennæ.  
Quartum innolu-  
crum.

Quare dicatur car-  
nosa.

Galenī error.

Colligitur Gale-  
num non secuisse  
homines.

conflatam minime intelligo, sed ex substantia alba, sensu prædita, ex nervorum filamentis, venis, & arterijs conflata. quare cū nervis non careat; optimo sensu præditam esse quid vetuit? quamvis contrarium senserit philosophus, qui sensum in carne falso posuit. Cutis alicubi pertinax est, alibi laxa, in facie namq; in auribus, in vola, in planta pedis pertinacem esse excoriando experieris. Quoniā in hisce locis cutim mobilem esse oportuit. Sub cute pinguedinē, seu adipem cernes; nihil enim nunc refert; quæ colore alba est, itaque nota unicuique, vt neque descriptione, neque alia egeat explanatione. Vfus pinguedinis est, vt calorem natium non secus ac vestis detineat; neq; hoc solum præstat, sed propugnaculi vice fungitur; cibi etiam vice in extremis inedijs fungitur; & in maribus, quemadmodum in foeminis reperitur, quicquid Gal. lib. de Temperam. scripserit in maribus scilicet nullam, aut exiguam quidem certe adesse pinguedinem. Gignitur autem ex sanguine crasso è venis exudante, eiusq; copia ingens in frigidis temperaturis cernitur, cōtra exigua in calidis, cum à pene, scrotoq; discesseris, in reliquis nostri corporis partibus inueniri pinguedo potest. Quòd si motū vsumq; eorum, quæ pinguedine carent, consideraueris, facile rationem diuersitatis inuenies. Substantia pinguedinis nō est homogenea vbiq; : nam in vola, & sub pedis planta, pene carnea est, ac dura. huiusmodi vero ob motum ipsum effecta est. nō est tamē sensus organum, vt Auicenna scriptū reliquit. Pinguedini subest membrana carnea dicta, quæ ipsa quoque vniuersum corpus ambit : & quartum illius innulocrum existit, à summo capite ad extremum vsque pedem velaminis instar. Carnea vero, seu carnosa dicitur eò quòd in collo carnosa euadit, atque adeo carnosa, musculosa. Adde veteres Anatomicos huic membranæ carnosæ nomen imposuisse; quoniam infantibus carnea est, multisq; fibris referta; quæ deinde euanescent tractu temporis. Illud velim non oscitanter animaduertatis, carneam membranam sub ala minime musculosam dari: licet Galeno primo de Anat. administ. musculosam ibi esse hanc membranam existimauerit. Ex quo loco, vt reliquos nunc missos faciā, aperte colligi potest Galenum simias, brutaq; nō homines secuisse. Adhæret carnea membrana musculis ipsis, & inter ipsam, cutemq; venæ ambulant superficiariæ, è quibus sanguis mittitur; & arterijs carent. Tempora excipio, frontem, caput, penem, scrotum, & digitos, quibus locis exiguæ numero inueniuntur arteriæ inter cutim, & membranam carneam.



## De Pilis.

## Cap. II.

**P**ILI quanquam superuacuae partes nescio quo pacto videntur esse: tamen quoniam corporis nostri veluti tegumentum existunt: De his quoque sermo à nobis habendus est. Nam praeterquam quòd corpus tegunt, vt diximus; eidem propugnaculi vice deseruiunt. Addunt aliqui tertiū vsum pilorū, vt vapores illi fuliginosi, qui in terra alimenti coctione eleuantur, dum in substantiā membrorū trā-  
 10 sit, in pilorum nutrimentum consumerentur: quam sententiā neq; laudo, neq; vitupero. facti etiam sunt pili ad ornatum. ortus eorum hic est. è cute emergunt, eam totam perforantes. in radice crassiorē pilum, quā in reliquis partibus deprehendes; pinguediniq; illi affiguntur, quam inter cutem, membranamq; carneā sitam esse diximus, praeterquam in scroto. propterea pili alimētum à pinguedine trahunt: itaq; augescunt. eorum substantia sicca est, vt videtis in varijs nostri corporis partibus: vix euim agrestem hominem inuenias, qui pilosus vndiq; conspiciatur, vt in brutis cernimus. Ego tamen hispanum quendam vidi pilis refertissimum in omni corpo-  
 20 ris parte, praeterquam in facie, & manuum parte. Vidi etiam vestalem adeo pilosam. sunt qui scribant neq; in planta pedis, neque in manus vola, pilos oriri posse. Causam in latum tendinem reijciunt cum nullo pacto sit causa; sed depiles hae partes factae sunt tum ob vsum, tum ob motum. Quod autem haec pilorum carentia (vt ita dicamus) in latum tendinem reijci nequaquam debeat, instantiam in promptu habeo plantae, volaeq; leporis, quae depilis non est, sed pilis referta; licet lati tendinis expers non sit. quas partes in lepore natura sagax pilis muniuit leuitatis gratia, quae res in animali adeo timido ob fugam necessaria erat. Sed iam de pilis satis.

Pili pro secundo tegumento.

Vnde oriantur.

Ex qua trahant alimentum.

Hispanū pilosum.

Vestale pilosam.

Quare vola &amp; planta careant pilis aliorum sententia reprobat.

30

## De Periostio.

## Cap. III.

**P**ERIOSTION membrana est neruea, tenuisq; quae ossa ambit, illisq; valde, atque adeo valide adhærescit, multo sensu praedita. propterea multi decepti sunt huius membranae ignoratione ossa sentire existimantes. hanc in interna caluaria ne quaerito; nam ibi nulla est, quamuis sub pericranio inueniatur; neque dentes periostio inuestiuntur. Quid enim dentibus opus erat periostio? neq; illud in articulationibus ossium spectabis; quod si adesset, miros dolores excitaret in illorum motu.

Substantia.

Periostium in interna caluaria non reperiri. Dentes vacant periostio.

Cur in articulis non inueniatur.

REALDI

# REALDI COLVMBI CREMONENSIS

DE RE ANATOMICA

LIBER XIII.

DE VIVA SECTIONE.

Viva Sectio.

Cur viva vtamur  
sectione.



Galenus cur non  
securus homines.

Non debebat Ga-  
lenus aliquis cō-  
tradidere.

Ex simia sectione  
perfectæ humani  
corporis anatome  
acquiri non  
potest contra Ga-  
leni ordinem.

Non licet homi-  
nes viuos secare.

Cur in iuvene ca-

V<sup>M</sup> Anatomes cognitioni studiose incumbimus velis ( vt aiunt ) & equis : nonnulla quandoque occurrunt, quæ nos in ipso cursu remorantur, quorum actionem scire nullo pacto possumus, nisi uiua sectione vtamur, non hominis quidem, vt veteres usi sunt, quod nefas, atque impium Christiano medico non videri non posset : sed brutorum, cum præsertim animaduertere liceat, ob viuum humani corporis anatomen, qua prisca medici utebantur; adeo male audisse, vt non modo viuos homines secare, sed ne hominis quidem cadauer liceret. Atque hanc vnam ob causam Galenum adductum puto, ut ab humani corporis Anatome abstineret. Sed bone Galene si tibi crudele nimis videbatur viuum hominē secare; si animus horrescebat, si reformidabas, vel si tibi neque vel mortuum hominem secare per Principum edicta, aut inueteratam consuetudinem nō licebat; quo pacto licebat tibi simias secanti ueteribus contradicere, quos humana corpora secuisse, tu ipse testis es locupletissimus? Profecto hodie cum ob communem viuorum vtilitatem concedant Pontifices, Reges, atque Imperatores, ut in publicis Academijs quotannis Anatomici reorum cadaueribus secandis Anatomen profiteantur, facile est controuersias istas diiudicare. Multis in locis veteres reprehendis; cum tute maiore his dignus sis reprehensione. Nam & si simia simile quid habeat homini; simia tamen est, non homo; neque eius compago hominis fabricæ omni ex parte respondet; partesq; nonnullas in homine conspicies, de quibus ueteres Anatomici loquebantur, quibus simia caret. sed ad rē redeamus. Cum viuos homines secare Christiana Religione prohibeamur, si neque simiæ, neque vrsi, aut leonis copia suppetat, cuius fabrica humanæ proxime accedit, quorum etiam viuorū sectio, quod feræ sint, licet mansuetæ, cum irritantur difficillima esset, de viui canis sectione loquamur. Canem igitur deligito, seu



- seu marem illum, seu foeminam mauis, iuuenem: catelli namq; dū secantur, vociferantur magis, quā fenēs. oblonga etiam sit ceruice. Canem propono viuū secandum potius, quā suū, quōd pro reuersuorum neruorum usu dignoscendo suēs minus accommodi sunt, tum ob pinguedinem exuberantem, tum ob eorum ingrātum nimis auribus clamorem, & grunitum, quod ego Cremonę expertus sum, ut pręcellenti medicorum collegio in hoc quoq; satisfacerem pręsertim Bonhomini Ofredo, Hieronymo Macagno, Petro Manę, Ioanni Baptistę Picenardo, Ioanni Franciscō Bor-
- 10 gio, Ioanni Baptistę Bonetto: cum enim totius Anatomēs historiā ex humanis cadaueribus accurate me dissecante conspexissent: efflagitarunt, vt uiui canis Anatomen pro vocis organo pręcipuo illis in iuuenē sue ostendere ne grauaret. Quod lubens feci, neque sine frustrati sumus, sed nimis obstrepebat. Dimisso itaq; sue, canis iuenculus in promptu sit longo (vt diximus) collo. (est enim canis animal, quod latratu vocem effingit, atq; efformat) Tabella adsit necesse est supra, infraq; foraminibus eo ordine distincta, vt ijs uinculis fuscipiēdis sat sint; quibus quatuor canis crura uincias: ita tamen, vt explicata sint, & distincta. Caput item eo modo de-
- 20 ligandum est: vt canis quidem uociferari possit: at non mordeat: In cuius uiuā sectione, priusquam ad eam accedas, illud primo animaduertendum est, in quo vox consistat, quod admirabile est; deinde pulmonis motum contemplaberis. Deinde quo pacto pulmo cor amplectatur; deinde cur fiat, ut altera thoracis parte laesa illaesa altera perstet. Vnde mediastini utilitas elucet. Pręterea diaphragmatis motum contemplari potes, quod inspirando dilatatur, & expirando constringitur: quod cum fit, sursum agitur, cū vero dilatatur, deorsum fertur. Ad hęc pulcherrima visu illud quoq; accedit, motus scilicet cordis quemadmodum amplificetur, atq; ar-
- 30 ctetur: item qualis sit motus arteriarum in uiuā Anatome, si lubuerit, conspiciaberis: nunquid idem sit, uel oppositus motui cordis. Comperies enim dum cor dilatatur, constringi arterias; & rursus in cordis cōstrictione dilatari. Verum animaduertas, dum cor sursum trahitur, & tumesceri uidetur; tunc constringitur. cum vero se exerit, quasi relaxatus deorsum vergit: atque eo tempore dicitur cor quiescere. estq; tunc cordis systole, propterea quod facilius suscipit, minoreq; labore. at cum transmittit, maiori opus est robore. Neque hoc floccifacias: etenim non paucos reperiās, qui eo tempore cor dilatari certo opinantur, quo uere constringitur. Illud insuper adnotare debes omnem pulsus differentiam detecto corde
- k conspi-

ne tractanda uiua sectio.

Quare non in sue tractanda uiua sectione.

Canis potius quā aliud animal in uiua sectione capi debet.

Quomodo constitui debeat canis pro sectione uiua.

Que consideranda in uiua sectione.

Diaphragmatis motus contemplatio.

Viua sectionis summa utilitas. Motus arteriarum ex uiua anatome.

Cordis cōstri-ctio, & dilatatio quā fiat.

Cordis systole.

In detecto corde, pulsus differentias dignosci.

Cerebri motus cū  
cordis motu co-  
incidit.

Vteri viuentis ca-  
nis sectio.

Allantois membra  
na lotium conti-  
nctur.

Amnios membra  
na sudorem cō-  
tinet.

Mira sectæ canis  
moriatur in fœ-  
tum beneuolen-  
tia.

conspici posse: ita vt ex hac viui canis sectione plus vna diecula di-  
fscas, quàm multis mensibus ex pulsu arteriarum: neque tantum tri-  
bus integris mensibus uoluptatis, atq; pulsuum cognitionis capies  
ex lib. Gal. de Puls. quantum vna horula ex inspectione cordis mo-  
uentis canis. Præterea videre licet, quo pacto cor, non modo vt  
omnes norunt, dilatatur, atque cōstringitur; sed cerebrum quoq; .  
quod paucis notum est. In cordis sectione quum primum pericar-  
dium aperis: humorem aqueum in pericardio detentum diligenter  
inspicere ne asperneris. si canem sœmellam pregnantem secabis,  
abdomen reserato, vteroq; accurate, quoad eius fieri poterit, sec-  
cto, fœtum inuolutum eximito; & quo pacto chorion membrana  
vtero annexa sit, non oscitanter considerato; & quo pacto venæ, ar-  
teriæq; disrumpantur. Item secundinam in canibus instar fasciæ fœ-  
tum circundare, ut Vesalius pinxit, dum ipsum humanum fœtum  
pingentem expectabamus, non canis, ut in nostro tractatu de fœtu  
apertius explicauimus. Allantoide postmodum abrupta, lotium  
diffluit, disrupta amnio, sudorem manantem cernes. situmq; canis  
in vtero pulcherrimum obseruabis. anterioribus enim pedibus ceu  
manibus crucem referentibus iacent catelli. ac si omnipotenti Deo  
supplices pro eorum creatione, atque in lucem exitu preces effun-  
derent. Illud insuper nunquam credidisses, quod videns obstupe-  
sces: morientem matrem catulorū, quos Anatomicus ab eius vtero  
abstraxit: maiorem curam gerere, quàm suimet. Nam si coram  
ipsa filium lædis, latrat, vociferatur; sin illum ori illius admo-  
ues, filet, atque magna pietate lambit. Quod si aliud, non catellus ori  
eius, quam secas, matris accedat, rabie percita mordet. quem na-  
turæ amorem, atque adeo parentum in liberos incredibilem chari-  
tatem in publicis theatris maxima spectatorum admiratione sæpius  
ostendi, Patauij præsertim, cum adesset Illustriissimus ac Reueren-  
dissimus Rainutius Farnesius, tunc Venetiarum prior, nunc Car-  
dinalis S. Angeli nuncupatus, quem honoris, & obseruantia gratia  
nomino. Aderat item Bernardus Saluiatus Romæ prior, nunc  
Episcopus \* & Aluissius Ardinghellus Episcopus Forosẽmpro-  
nienfis. aderat Felix Acrambonus, Ioannes Baptista Vrsinus nunc  
Archiepiscopus, Eques Vgolinus Fanensis, Bernardinus Thile-  
sius omnes tunc iuuenes magnæ eruditionis, & expectationis, qui  
expectationem, quam de se Patauina Academia conceperat, lon-  
go interuallo superarunt. Hi omnes, item alij multi summa cum  
voluptate huic viuæ canis sectioni interfuerūt. & illud insigne exẽ-  
plum de ingenti amore vel brutorum in filios se nunquam oblituros

asseue-

19

26

30



asseuerabant. neque has duntaxat discendi voluptates, quas hæc-  
 nus memorauī: ex uiua canis sectione percipies, sed cognosces, quā  
 in hoc longa errauerit uia Peripateticorum princeps Arist. cum au-  
 sus est dicere tres ventres inesse cordi, in quorum dextro sanguis  
 adit calidissimus in sinistro frigidissimus, in medio mediocris. Tu  
 vero dextro cordis ventriculo inciso, si digitum immiseris, calor te-  
 pidus tibi occurret. at in sinistro tantus, ut ferre uix possis. Illud in  
 super, quod sæpe in disquisitionem venit, quo pacto vere se habeat  
 experieris, an in arteria venali aer, & uapor ille, quem capinosum

Aristotelis error  
 de cordis ventri-  
 culis.

Improbaf ridicula  
 de capinoso va-  
 pore sententia.

10 quasi humidum dicunt, vel sanguis contineatur. Caue autem pu-  
 tes Anatomicū tor, tantaq; spectatoribus ex vnius uiui canis sectio-  
 ne ostendere posse; sed plures adfint necesse est: nam animā prius  
 efflasset canis, quā hoc vel illud obseruare potuiffes. Postquam  
 igitur canem, ut diximus, tabellæ affixeris: nouacula, cuius acies  
 pulchre abradat, colli cutem recta aperi, à larynge initio sumpto,  
 & pene ad summum usque thoracem peruento. deinde profundiori  
 sectione musculos, qui asperæ arteriæ imminet, parumper secato,  
 deinde dimisso rasorio cultro, vel digitis potius ab aspera arteria  
 musculos seiungito, idq; ita dextere, ne reuersiuos nervos, qui ibi

Plures canes cõpa-  
 rentur in uiua se-  
 ctione oportet.

Quomodo thorax  
 aperiri debeat in  
 uiua sectione.

20 in conspectum venturi sunt, vilo pacto lædas. hi reuersiui, seu re-  
 currentes, seu vocales nervi sursum reuertuntur asperæ arteriæ ad-  
 hærentes: atque in laryngam immittuntur. recurrentem neruum  
 ita facile agnosces, tum quia albicat, tum quia instar fili videtur ef-  
 se. hunc eleuato, nam si illum digitis compresseris, dictum, ac factū  
 misero cani uox imminuitur. si manum detrahas, ita ut animalibus  
 spiritibus aditus pateat, vox denuo reuertetur. sin dextrum neruum  
 abscindas, prorsus amittitur. Nunc de sinistro reuersiuo neruo  
 dicamus. Administratio eodem modo fiat, quo in dextero dictum  
 est, si neruum uinculo excipias & coarctes, statim mutus efficitur:

Recurrentes, ner-  
 ui quo pacto in-  
 ueniuntur, & tra-  
 ctantur.

Quomodo uox au-  
 teritur & minui-  
 tur.

30 si dissoluas, semilatrabit, ob dexteri nervi abscissione, sin transuer-  
 sum dissecaueris, mutus in æternum fiet. superuiuere tamē posset, si  
 dimitteretur cum tanto vulnere, nisi alia afflictio afflicto adderetur.  
 Profecto pulchrum est spectatu, consideratq; pulcherrimum, quo  
 pacto duo neruuli adeo paruuli tam bellam edant actionem, qualis  
 est vocis ipsius efformatio. nemoq; est, qui non obstupescat. hanc  
 rem non poterat non satis mirari doctus, atque insignis philosophus  
 Hieronymus Pontanus, & Excellentissimus pontificius medicus  
 Paulus Manilius, nec nō Excellens Ioannes Valuerdus Anatomicę  
 Artis admodum studiosus, meiq; amantissimus: Cum præsertim  
 Aristotelem scirent sentire vocem à corde proficisci. Quod si quis

Vocem non à corde, vt Aristoteli visum est proficisci.

Aristotelis erroris causa.

Septi tranuerſi motus cōtemplatio.

Pulmonis motus cōtemplatio.

Cautio à pulmone.

Aqueus humor in pericardio, & uiuentis, & mortui inesse.

Pulsus cōtemplatio.

obſtinate Ariſtotelis ſententiam tueri velit, inquiring arterijs carotidibus deligatis vocem amitti : is ſciat, niſi vna neruum recurrentem nuncias, quod ſæpe uſu uenit, id nullo pacto factum iri. Veriſimileq; eſt eos, qui Ariſtotelei impoſuerunt de vocis origine, quod à corde oriebatur ea coniectura, neruum reuerſuum vna cum carotide arteria vinculis excepiſſe : & hanc præcipue fuiſſe erroris cauſam. cum veritas hæc ſit, neruis, quos diximus, ſectis vocem omnino tolli, compreſſis non tolli quidem, ſed animal ſemiuocale reddi. Poſtquam iam mutus canis proſtat; ſepti tranſuerſi motum tibi licebit cōtemplari, ſi abdomine à ſummo ad imum ſectō, contractisq; tum inteſtinis, tum ventriculo, & deorſum detruſis, & ſi opus fuerit ſectiōne facta, iuxta coſtarum inferiorum deductum. Deinde pulmonis motum cōtemplaberis thorace anterieus reſerato, & ex altero latere coſtarum cartilaginibus cultro exciſis : nam hic non eſt nouacula locus tutus. Caue autem, dum id ages, ne pulmones, aut cor vſquā offendas : nam tanta ſanguinis copia exiliret, ut uidere amplius, quod cupiebas, nullo pacto poſſes. abſciſſis, quæ diximus, thoracem manu dilatato, & binas ſpongiæ frigiduſcula aqua prius madidas, deinde expreſſas in illum immitto, tu alteram, alterā vero miniſter, qui tibi opitulatur : cartilaginibusq; quas abſcididiſti, admoueto, vt ſanguinem à venis, & arterijs intercoſtalibus manantem, neque cunctantem deſinant, & remorentur, comprimentē; itaq; compreſſas tandiu detinito, vt pulmonū motum ſpectare, ac ſpeculari poſſis : quo facto pericardium aperi, & aquam in viuente adhuc animante intueberis ; licet non deſint qui affirmare audeant in cadaueribus duntaxat animalium aquam in pericardio contineri. Si poſt tot infelicis canis cruciatus, vel feliciſ potius, qui ob rerum pulcherrimarum agnitionem ſpectaculum de ſe præbuit, ſuperuixerit ; omnes vel plurimas ſaltem pulſuum differentias obſeruare poteris : cor illius conſpicatus reliquas differentias in alio cane conſpicaturus, qui an catellus ſit, vel plurium menſium, tunc nihil intereſt. Nam iam vocis originem in alio cane tuis oculis intuitus fueras, & latrantem primo magno eiulatu, deinde voce imminuta, poſtremo amiſſa ob eam, quam diximus, cauſam conſideraueras. Thorace igitur huius ſecundi canis primum aperto per rectam lineam in cartilaginem : ſed illum cōfeſtim aperi, atq; vnā pericardion : deinde abdomine quoque aperto magnæ arteriæ manum admoueto : diligenterq; quoad eius fieri poterit, conſidera illa dilatetur, dum cōſtringitur cor : vel oppoſito modo ſe res habeat ; ibiq; differentias omnes pulſuum ſub oculos intueberis in rem



- rem præsentem deductus magnos, longos, latos, veloces, latos celeres, frequentes, paruos, neq; hos modo, sed veloces quidem tardos, aut frequentes, sed interpollatos, item frequentissimos, minimos, tardissimos, vndosos, & formiculares. aliud præterea spectaculum iucundum, quod ad cognitionem attinet, de se præbere miser canis poterit. nam si arteriam asperam inter anulum, & anulum secueris, & arundinem immiseris, si eam ori admoueris, & buccis infles, pulmones illico attolluntur, & cor ipsum amplexabuntur, & paulo post pulsus immutabitur se ipso maior factus; quo uiso sat scio obstupesces. *Quod si tertium canem uiuum secare in animum induxeris: thoracem eo quo diximus pacto aperire poteris, motuq; pulmonum denuo diligentius cōsiderare: deinde dextro cordis vētriculo adaperto in illum digitū immittito, vt certior fias, nunquid sanguis ille calidissimus existat; statimq; sinistro cordis vētriculo secto, animaduertere tuo periculo poteris, tantū caloris ibi adesse, ut manus illum ferre nullo pacto possit; tantum abest, ut iuxta Aristotelis sententiā, frigidissimus existat. Rursus in quarto alio cane arteriam venalem referabis, sed procul à corde, vt certo discas sanguisne, an aer in illa contineatur. Quod si es indefessus lector optime, & sciēdi cupiditate flagras: quintus adhuc adsit in promptu canis; vt rem admirabilem, neq; omnibus obuiam contēpleris: thoracem cultro, vt diximus ocysus aperi, corq; apprehendito: minifter vero tuus diligens, atq; expertus mira celeritate acu crassa, & contorta, quā manibus gerebat, in qua contortum filum immissum est, quatuor cordis vasa arcte colliget; deinde cor abscindat; eodemq; tempore vincula abscindantur, quibus crura quatuor iuncta erāt, & in pedes proijciatur. Canem absq; corde vociferari audies, progredi videbis; qua re nihil magis admirabile cōspicari poteris. & hac re visa desinas adeo obstinate in omnia Aristotelis verba iurare; qui licet magnus Philosophus fuerit; scire tamen omnia solus nullo pacto potuit. In sexto præterea cane aliud, ne pigeat, cernito: cranio namq; excoriato eius partem frāgere celerime poteris, membranisq; duris incisis cerebri motum contemplari: quod cerebrum ita mouetur, ut ipsum cor moueri omnes fatentur, motu scilicet dilatationis, & constrictionis. neque aliter fieri poterat ob animalium spirituum generationem, quam cerebro acceptam ferunt omnes pene tum philosophi, tum medici.*

Quomodo cor à pulmonibus amplectatur, & ex pulmonibus pulsus augeatur.

Vtriusque ventriculi cordis sanguinis experientia aduerlus Aristotelis sententiam.

Probationum sanguinis, an aer in arteria venali contineatur.

Quomodo abscindi possit cor à cane & adhuc illi uita parumper supersit.

Mirum non esse Aristotelem cuncta non nouisse.

Cerebri motus cōtemplatio.

# REALDI COLUMBI CREMONENSIS

DE RE ANATOMICA

LIBER XV.

DE IIS QVAE RARO IN ANATOME  
REPERIVNTVR.

10

Medici superioris  
ætatis quales.



ROFECTO miseret me vicem superioris ætat  
tis medicorū qui in friuolis, & dialecticis que-  
stionibus die noctūq; tempus conterentes, de  
his rebus absq; quarum exquisita cognitione  
ne nosce quidem morbos ipsos vllō pacto pos-  
sumus, nihil docebant, discabantūe, vel adeo  
confuse, & indistincte, & infide, vt ignorare

Satius est ignora-  
re quā scire per-  
peram.

Cognitionem sim-  
pl. med. non de-  
bent medici in  
pharmacopolas  
reicere.

Anatomē quomo-  
do olim tractare  
tur.

fatius fuisset, quā perperā scire. & vt de materia medicinali nunc  
nihil dicam, quā omnem ad pharmacopolas reiciebant, Anato-  
mica rei vel prorsus ignari erant, vel quod tonforibus quoque no-  
tissimum erat, id tantum sciebant. Itaque cum Anatomicam disse-  
ctionem publice profitebantur, situm quærebāt intestinorum, ven-  
triculi, iccoris, lienis, vesicæ, renum, cordis, pulmonisq; deinde  
caluaria disrumpita, cerebrum ibi contineri videbant, reliqua oscitā-  
ter sane, & suis cum arabibus cæcutientes. quod si quicquam illis  
occurrebat præter hæc, aut quod cum Mundini, aut Auicēnæ scri-  
ptis non conueniret, id omne tanquam monstrum naturæ in illius  
indiuuidui fabrica ostentabant, adeo vt complura monstrōsa in sin-  
gulis cadaueribus esse existimarēt. Ego uero licet ab ineunte æta-  
te innumera corpora dissecuerim, & ab hinc quindecim annos, & 20

Ridiculum, mon-  
strum esse quod  
cū Mundini scri-  
ptis non conue-  
nit.

Anatomen publi-  
ce xv. annos pro-  
fessus.

amplius complura cadauera Patauij, Pisis, Romæq; in corona fre-  
quentis Academiæ, tamen hæc duntaxat rara uisi, & à cæteris di-  
screpantia obseruare potui, quæ reticere nullo pacto possum, vt  
hoc exēplo obseruare alia quoq; possint posthac diligētiores Ana-  
tomici. prius uero quā de rebus raris historiam exordiar: hoc vnū  
te excellens Iacobe Bone admonitum volo, nullum genus hominū  
mihi disseccandum defuisse, nisi mutum hominem ab ortu, quamuis  
quandoq; anno vno quatuordecim cadauera mihi disseccare cōtige-  
rit. Hinc igitur de rebus in Anatome hominis raris, & animauer  
tēdis à capite incipiā. Capitis futuras uario modo se habere com-  
peri

Jacobus Bonus.  
Dissecuit, omne  
genus hominum  
præter mutum ab  
ortu.

In capitis futuris



peri; nam in quibusdam nullo pacto erant cōspiciuæ. alijs futura re-  
 cta deerat, huic erant ossa triangula, illi quadrangula, alij sagittæ  
 specie, alijsq; id genus figuris futuræ circumdatis. eam tamen figu-  
 ram, quæ X Græcam litteram imitetur, de qua Hippocrates, &  
 Galeus meminerunt: fateor me nunquam vidisse: licet lynceis pe-  
 ne oculis sæpenumero inquisuerim. Magnam quoq; in dentibus  
 diuersitatem obseruaui, tum quo ad numerum dentium, tum quo  
 ad dentium radicum numerum. in nonnullis præterea dentes maxil-  
 lis ad eos nixos obseruaui, ut diuelli nullo modo possent, nisi maxil-  
 læ ossis frustum insigne unà abstraheretur. De maxilla inferiore  
 hoc in summi Pont. penu uidere est, caput Gigantis (maximū enim  
 est omnium capitū quæ hætenus viderim) in quo maxilla inferior  
 capiti adeo connata, & coniuncta est; vt omni motu prorsus careat  
 10 atque in viuente non carere non potuerit. Primam quin etiam ver-  
 tebram occipitio ita adhærentem hisce oculis vidi, vt moueri neuti-  
 quam posset. Vertebrarum numerus in quibusdam immutatus cer-  
 nebatur. Nam quod attinet ad vertebrae colli, hæ in omnibus pe-  
 ne septem sunt, ego vero nunc sex, nunc octo ceruicis vertebrae  
 comperi; vertebrae thoracis tum vndecim, tum tredecim. Verte-  
 bras lumborum interdum sex, interdum quatuor. os sacrum non-  
 nunquam ex quinque, alias ex sex ossibus constare vidi. Costas  
 item viginti duas, viginti quinq; & viginti sex. Quandoque duas  
 ex his, tresque admodum connexas; at in alijs in notatu dignum tu-  
 20 morem excreuisse. Sternum ex duobus ossibus, & ex tribus, & ex  
 quatuor. os Ileon vnitum sacro osse deprehendi. Femur proces-  
 sus quosdam ad palmi longitudinem, acutosq; . itidem in tibia, sed  
 non tam proceros. vidi femur cum tibia, molaq; vniri; femur tibiā  
 in incredibilem tumorem excreuisse; sex in manu digitos: extremus  
 30 etenim pollicis articulus in duos diuidebatur. sed quamuis hæc, quæ  
 hætenus memorauī, memoranda videantur esse, & admiranda;  
 admirabilius tamen erit, quod mox audies. Excellens medicus  
 Ioānes Bertonius ab auricula mihi amicissimus sceleton mihi dedit,  
 quæ ego domi ad studiosorum utilitatem diligēter adseruo, in quo  
 ossa omnia, idest omnes totius corporis articuli à capite ad extre-  
 mos vsq; pedis digitos uniti cōspiciuntur. huic quatuor dentes de-  
 sunt, bini supra, totidem infra ex illorum regione, qua uia cibus, &  
 potus intromittebatur. Romæ in Xenodochio diui Iacobi incurabi-  
 bilium diu vitam traxit; uiuens autem, quem senem uidit, & inuisit  
 sæpe Ioannes Auricula, nihil aliud mouebat, quàm oculos, linguā,  
 penem, abdomen, thoracem; nam cartilagine quidem costis ar-  
 ticulatæ

quid rarum vide-  
 rit.

Galenī & Hipp.  
 error.

In dentibus quid  
 rarum.

In maxilla inferio-  
 re quid rarum.  
 Caput gigantis.

Maxilla inferior  
 capiti connata.

De vertebra pri-  
 ma occipitio ad-  
 hærente.

De vertebrarum  
 numero.

Vertebrae colli.

Vertebrae thora-  
 cis.  
 Vertebrae lumba-  
 rum.  
 Costæ.

Sternum.

Ileon.  
 Femoris proces-  
 sus.

Tibiae processus.  
 Femur, tibia &  
 mola vnita.

Sex digiti in ma-  
 nu.

Pollicis extremus  
 articulus bifidus.

Ioannis Bertonij  
 sceleton admira-  
 bile visu describi  
 tur.

Monstra.

Lazarus vitri uorax gustu carens.

Quarta neruorum coniugatio in Lazaro vitri vorace ad palatum &amp; linguam non tendebat.

In musculis quam differentiam inuenerit.

In furibus illustribus quid rarum obleruauerit.

Crura.  
Pedes.

Venæ.

Vreteres.

ticulatæ erant, sed nondum coaluerant, reliquæ corporis partes omnis motus expertes relinquebantur. Alios secui, quibus brachia ab ortu deerant; alios quibus deerant crura. Præterea corpus integrum intuitus sum; cui dimidium alterius cohærebat. Auriculas instar brutorum in hominibus, cæcos iam inde ab incunabulis, & similia. sed quod maiore admiratione me affecit; fuit inspectio Lazari uitri voracis vulgo dicti, quem patritij omnes Veneti, imo Veneti omnes, omnes Ferrarienses de facie nouerant. hic nullo prorsus gustu, dum uiueret, præditus erat; nullam in edendo voluptatem, nihil iniucundum persentiebat. insipida, amara, dulcia, pinguis, salsa, acria, non distinguebat; vitrum, saxa, lapides, ligna, uiua animalia, carbones, pisces è viuario extractos adhuc salientes vorabat. Vorabat lutum, lineos, laneosq; pannos, scænum, stipulam, & vt breui omnia complectar, quidquid homines, quidquid animantia vorant, quidquid illi edendum seu deglutiendum potius offerebatis, mercede proposita, dictum, ac factum ingurgitabat. Testis est inter reliquos Martinus Aromatarius Patauij ad Angeli insigne, cui sacculum carbone repletum, & saccum insuper deuorauit. quo uiso persoluit, quod pollicitus fuerat comminatus ne ad pharmacopolium amplius accederet: ueritus ne se cum taberna, & uasis esitaret. Cum igitur hoc naturæ monstrum mihi diffecandū esset Patauij, cœpi huiusce rei diligenter, quoad eius fieri potuit, causam venari, quā me tandem Deo duce ex particulari illius structuræ affectum esse confido. Nam quarta neruorum coniugatio, quæ gustus gratia in alijs hominibus à natura producta est, in hoc Lazaro uitri vorace neq; ad palatum, neque ad linguam reptabat, sed ad occipitium reflectebatur, sed de hoc Lazaro satis, superq; .  
 In musculis vero equidem uarietatem percepi, at non multam. Erant aliqui, quibus in facie musculus abundabat, alijs in thorace, alijs in extrema manu. Vidi & nonnullos, quibus aliqui musculi deficiebant, vt in nonnullis furibus illustribus, in quibus diffecandis oculatissimus fui. obseruaui in his deesse musculum illum, à quo latus tendo in vola proficiscitur, quo lato tendine nō carebant. sed non à dicto, verum à brachialis ligamento exoriebatur. In cruribus item, pedibusq; aliquam diuersitatem inueni, sed hæc mea sententia non multi facienda erant. In venis autem miram natū sum sæpenumero uarietatem, in internis inquam, atque externis. Nam in eodem latere duas internas iugulares venas deprehendi, duas, tres, quatuorq; & plures eodem latere, emulgētes binas item eodem latere seminarias venas, Vreteres quatuor, venas in abdomine, & cru-

10

20

30



# IN ANATOME CONTINGVNT LI. XV. 265

- & cruribus varicofas maximæ molis. Vidi etiam renem vnum dun  
taxat, eumq; maximum. Animaduerti intestinorum tenuium mu-  
tuum ingressum, spatio ampliore, quàm sit digiti longitudo, præ-  
sertim in nonnullis, quos dolor iliacus enecauerat. Iecur quando-  
que mihi se obtulit inspiciendum peritonæo adnexum, adnexam  
item vidi peritonæo lienem. Adde lienes adeo grandes, vt viginti  
librarum pondus vnusquisque ex his longe excederet, quos cartila-  
go exterius obuoluebat. Quæ res cum ab Antonio Mirandulano,  
quem nostri temporis philosophorum principem appellare merito  
possumus, & ab excellētissimo Iustiniانو Finetto, & Francisco  
Sanfonio diligenter spectaretur: non poterant satis mirari nouita-  
tem tantæ molis primum, deinde illius partis extrinsecæ cartilagi-  
næ. Conspicatus sum omentum peritonæo, nec non abdominis  
musculis adnexum; Præterea omenti selibram extra vmbilicum: &  
in scroto omenti libram, & amplius. Pulmonem in pluribus pleuræ  
connexum, nunc in altero latere, nunc in vtroque, atque hæc pul-  
monum in nonnullis cum pleura connexio in causa plerunque est,  
vt medici decipiantur penetrantia Thoracis vulnera nequaquam  
agnoscentes, quippe qui hoc Chirurgorum axioma putent, omne  
Thoracis vulnus penetrans extra spirare; at in illis, quibus hæc pul-  
monum connexio cum membrana succingente cōtingit: possunt  
vulnere Thoracem perforante laborare, neque tamen respirare  
vulnus cernitur. Quidquid tum in pulmonibus, tum in iecore ip-  
so steatomata comperi, nec non atheromata. Vidi & in pulmonibus  
ossa non parua, vt superiore anno in Francisco Capello, quem  
Paulus IIII. Pont. Max. è Verona Romam accersiuisset, vt Sancti spi-  
ritus hospitalis commendator, seu præceptor esset. cuius sectioni  
tu Iacobe bone interfuisti. In Thorace magnam aquæ copiā vidi.  
Vidi in corde vlcerà, & Tumores duos præter naturā, præsertim  
in sinistro cordis ventriculo. Vidi in nonnullis septum, quo cordis  
ventriculi distinguuntur, cartilagineum. Alios in quibus sinister  
ventriculus cordis deesse videbatur, tam exiguæ molis erat. Disci-  
pulum item in Romana Academia mortuum secui (aderat excel-  
lens medicus Alexander Traianus Petronius à ciuitate castellana  
acris iudicij vir) huic misero iuueni pericardium deerat, itaque su-  
binde in syncopim incidebat, subinde mortuo similis conspicieba-  
tur, quo genere morbi exanimatus est. Inueni quoque partē Tho-  
racis pulmone destitui, hoc est minimam pulmonis portionem ad-  
esse: quod vero reliquum erat cavitatis, ab aqueo humore occupa-  
batur. Dissecui non semel, qui ob fortem Apoplexiam obierant, in  
quorum

Renes.

Iecur.

Liens.

Cartilago circa lie-  
nem.  
Antonius Mirādu-  
lanus.

Iustinianus finet-  
tus.

Franciscus Sanfo-  
nius.

Omentum.

Pulmo.

Omne vulnus tho-  
racis penetrans  
extra spirare sal-  
sum est.

In pulmonibus  
steatomata & a-  
theromata.  
In Francisco Ca-  
pello os in pul-  
mone.  
Paulus IIII. pon-  
max.  
Iacobus Bonus.  
Thorax.  
Cor.  
Septum cordis.  
Ventriculus sin-  
ister.

Alexāder Traianus  
Petronius.  
Rarus admodū ca-  
sus.  
Pericardium.

In thorace pulmo-  
nis portio mini-  
ma.

Sectio apoplectici

Monstrum patauij  
dissectum maris  
semetris cui a-  
lius anteriore in  
parte incumbere-  
bat.

Marcus Antonius  
Ianua.

Quid in monstri  
sectione inueni.

Membrana Hy-  
men.

Ant. Fracanzanus  
Paulus crassus  
Ioannes caius.

Quid si hymen.

Lapides in renib.  
Lapides in pulmo-  
nibus.  
Lapides in iecore.  
Egnatius generalis  
congregationis Ie

quorum cerebro magnam aquae copiam reperi: perspicuam qui-  
dem, sed glutinosam. Monstrum mihi oblatum est Patauij dissecan-  
dum. erat infans semestris aetatis, ut alij mares sunt, cui alius imperfe-  
ctus infantulus anteriore parte incumbebat, cruribus, brachijs,  
dorso, abdominis parte, pene, medioque collo. videbatur autem ca-  
put huius imperfecti puelli in Thoracem perfectioris intrusum.  
Hoc monstrum vixit aliquandiu. Quamobrem inter studiosos vi-  
ros lis orta est, & quaestio, utrum cor vnicum illi adesset, vel duplex.  
idem de Iecore, cerebroque quaesitum est, & de alijs internis mem-  
bris. Marcus Antonius Ianua illustris philosophus vnicam in illo 10  
subiecto animam esse opinabatur. Nam si quis imperfectam illam  
appendicem, & pondus inutile attigisset; ille, quem integrum me-  
brorum omnium diximus, statim perferescere animaduertebatur.  
Non deerant tamen, quibus oppositum videretur. hoc itaque mo-  
dum, ubi diem suam obiit, ego rei nouitate allectus libenter secui.  
quae autem obseruaui, haec ferme sunt. In imperfecto, quem dixi,  
nonnulla intestina aderant, ex quorum vnus portione tum vesica,  
tum anus construebantur. nullum ibi aderat iecur, neque cor, ne-  
que cerebrum; sed ren permagnus, quem ego hepatis penè mune-  
re fungi sum opinatus. nam ab extremo iecore perfecti infantis 20  
crassa vena, duraque instar arteriae deducebatur ad renem illum infi-  
gnem; atque inde venae aliae complures passim distribuebantur. at ab  
arteria dextra axillari perfecti puelli arteria ortum ducebat, quae post  
modum per vniuersam partem monstri imperfectioris deduceba-  
tur. Item à neruis dextri brachij exibant, qui per reliquum corpus  
imperfecti homunculi disseminabantur. atque hactenus de mon-  
stro Patauiino. Nunc de membrana hymene quid obseruaerim,  
dicam tibi: licet vulgus hominum putet nullam esse virginem, quae  
hymena non habeat. Ter duntaxat illam iuueni, bis in duabus par-  
uulis puellis, semel in natu maiore, quam cum dissecarem: intere- 30  
rat Excellentissimus Antonius Fracanzanus Vicentinus, & Pau-  
lus Crassus Patauiinus, & vna cum his Ioannes Caius Anglus. Est  
hymen membrana quaedam sub nimphis ante ceruicem vteri vni-  
co foramine praedita superiore parte, ut menses effluere possent.  
atque haec illa est eadem membrana, quae ingressum penis quam-  
uis membrati hominis prohibet.

Lapides autem innumerabiles penè hisce manibus extrahi in-  
uentos in renibus colore vario, in pulmonibus, in iecore, in vena  
portae, ut tu tuis oculis vidisti Iacobe Bone in Venerabili Egnatio  
Generali congregationis Iesv. vidi etiam lapillos in vteris, in  
vesica,



vesica, in intestino colo, in venis hæmorrhoidalibus, atque in umbilico: In bilis quoque vesicula, quod tamen exciderat, varij coloris, variæq; figuræ lapillos; & in nonnullis complures inueni, vidi abscessum. De abscessibus autem quid attinet dicere? Inter reliquos sæpe simillima materia refertissimum abscessum in omento, & peritonæo cuiusdam mulieris extraxi: quæ ob harum partium abscessum in hydropem inciderat. & mirum mihi visum fuit, cum eiusdæ iecur, & lien, neque in colore, neque in substantia præter naturam affecta esse viderentur, in illius tamen abdomine aquæ incredibilē

10 copiam adfuisse. hanc hydropicam, dum ego Romæ dissecarem: intererat excellens Cosmus Iacomellus, nunc Romæ Archiatros. Innotuit mihi ex Anatome abscessus cor vndique circumplectens & cor illius iam fermè putrescens. quam rem excellens medicus Marcus Appogius ab Oximo magna admiratione intuebatur. Præterea iecur, quod toties scirrhum deprehendi, lienem quoque non modo scirrhu laborantem, sed extra cartilagine obductum, quod summa cum voluptate vidit excellentissimus Stephanus Cerasius. Multa alia minoris momenti, rara tamen obseruauimus, ne tractatus hic nimis excresecat, missa faciam. Non possum tamen

20 abstinere, quin tibi explicem breui quoad eius fieri potest, quid in tribus Cardinalibus Romæ, quid Patauij in Hermaphrodito deprehenderim, quam historiam postquam absoluerò finem faciam. In Cardinali Gambarà Brixiano tumorem prædurum, & ad omni magnitudinem in sinistro cordis ventriculo Romæ vidi, vbi illum in affinium gratiam dissecarem. In Cardinali Cibo vena, quæ à liene ad os ventriculi tendit, insignis erat magnitudinis; quæ quum primum ob anastomosim, vel fracturam referata est: illico ventriculus sanguine repletus fuit, & nō modo ventriculus, sed intestina omnia, licet, dum adhuc viueret, in morbo ipso libras aliquot tum

30 per vomitum reieciisset, tum per secessum deieciisset. Quam sectionem dum ego summa diligentia peragerē ob subiecti dignitatem, & ob morbi raritatem: aderat excellentissimus Antonius Musa Brasauolus Ferrariensis, quem honoris gratia nomino. In Cardinali Campegio intestina omnia ad hypochondria redacta erant. propterea cauitas inferior abdominis destituta erat, & spina detecta. Quamobrem medico licebat abdomen Cardinalis attrahenti magnæ arteriæ motum persentire; & vnà cum illa durities persentiebatur. Illa vero durities nihil aliud erat, quàm vertebrarū corpora: cuius rei nouitatem non poterat satis mirari excellēs Augustinus Riccus Lucēsis. sed profecto mi Bone, vel optime potius

su habebat lapides in uena portæ  
Lapides in ureteris.  
Vesica.  
Umbilico.  
Venis hæmorrh.

Vesica bilis.  
De abscessibus.

Hydropicus cui iecur, & lien in colore & substantia non erant præter naturam.

Cosmus Iacomellus.  
Abscessus i corde.  
Marcus appogius.  
Iecur scirrhum.

Lien scirrhusa cartilagine obducta.

Stephan' cerasius.

In Cardinali Gambarà tumor durus oui magnitudine in sinistro ventriculo cordis.

In Cardinali Cibo iecur ventriculus & intestina sanguine refertissima.

Antonius musa Brasauolus.  
In Cardinali Campegio intestina ad hypochondria redacta.

Augustin. Riccus.

Fœmina androgyna  
secta quid raro-  
rum.

Hermaphroditus  
quomodo dica-  
tur mas aut fœ-  
mina.

Cingara herma-  
phrodita uiuente  
quid raro.

Iacobe, inter tot admirabilia, & rara, quæ in humani corporis fabrica diuersis temporibus obseruaui; nihil admirabilius, nihil rarius censeo, quàm quod de neutra natura diligenter inuestigauī. Proposito enim mihi Androgyno, seu hermaphrodito, subiecto in quam eodem mare, & fœmina. superioribus et enim annis fœminam mihi videre contigit, quæ præter vuluam, membro quoque virili prædita erat, quod tamen non erat admodum crassum. Quâobrem in eius anatome generationis vasa accurate admodum peruestigauī. vasa seminaria, testesq; considerans, nunquid vlla inter hæc communio, & consensus adesset: Tandem hoc comperi, vasa quidem præparantia, ab aliarum fœminarum præparantibus vasis non differre; sed deferentia differre: nam bipartita erant, & ex binis quaternaria natura genuerat, ex quibus duo, quæ etiam maiora erant, ad matricis concauum destinabantur, reliqua duo ad penis radicem, qui glandularum parastatum expers erat. Hoc tam admirabile uisū, & speculatu erat quàm quod maxime: quo pacto natura prudens, sagaxq; locum satis tutum selegerat, per quod vasa hæc ad penem deferri possent: & quemadmodum meatum, qui in ipso est pene, perforarent: qui meatus in alijs tum semini, tum lotio cōmunis existit. hic vero urinæ nihil quicquàm opis afferebat; nam instar aliarum mulierum urina exibat. vterus autem, nec non vteri ceruix à cæterarum fœminarum matrice, colloq; nihil distabat: sed in testibus discrimen erat; nā testes in hac crassiores erant, quàm in reliquis mulieribus: sed quoad situm ipforum nullum discrimen depræhendi. Peni scrotum contiguum non erat, imo vero scroto prorsus carebat: & duobus musculis præditus erat huius fœminæ penis, non quatuor, vt in maribus perfectis. Præterea penis huius hermaphroditi tenui pelle integebatur, nullum aderat præputiū, sed duo spongiosa corpora, per quæ duæ arteriæ ferebantur, ab illis ortæ, quæ ad vesicā tendebant. Atq; hæc sint satis de Hermaphrodito, quæ mortuum secui. Duos deinde Hermaphroditos uiuentes consideraui, in quibus alter mas, fœmina altera erat (dicuntur autem à superabundanti vel mares, vel fœmine, vt vel plantandis hominibus, vel homini suscipiendo sunt aptiores, vel aptiores creduntur) Fœmina erat æthiopica mulier earum, quas cingaras appellant Longobardi. hæc neque agere, neque pari cōmode poterat; nam vterque sexus imperfectus illi cōtigerat suo magno malo; penis namque minimi digiti longitudinem, crassitiemq; non excedebat; uulūq; autem foramen adeo angustum erat, vt minimi digiti apicē vix intromitteret. optabat misera, vt hunc illi penem ferro



ferro euellerem, quippe qui sibi impedimento esse diceret, dum cum viro coire exoptabat. optabat etiam, ut vuluæ foramen illi amplificarem, vt viro ferendo idonea esset. Ego vero, qui horum vāforū discrimen intueri sapius cupiebam; verbis detinui. Non. n. sum ausus aggredi illius cupiditati satisfacere; quoniam id absque vitæ discrimine fieri non posse existimabam. Hermaphroditus vir, quem viuū summa diligentia inspexi, hoc modo habebat. penis aderat cum scroto, testibusq; sub quibus in petineo seu tauro, quo loco (inter anum scilicet, & testes) fit sectio pro extrahendo vesicæ lapide: foramen quidem perstabat in vuluæ morem, sed non penetrabat. atque hi sunt quos vidi, hermaphroditi. Sed priusquā finem huic tractatui imponam: libet recensere, quid monstruosum in muliere animaduenterim. Fœmina erat, cuius vulua ab aliarum fœminarum vuluis nihil peculiare, & diuersum habebat; & matricis colli portio prominebat, vel matricis collo simile. matrix autē nulla aderat in abdomine, neque vasa seminaria, neque testes. & quoties cum viro coibat (coibat autem sæpe) mirandum in modum conquirebatur.

Vir hermaphroditus quomodo haberet.

Vulua rara.

F I N I S.

Venetijs in vico Sanctæ Marinæ,  
ex Typographia Nicolai Beuilaquæ Tridentini,  
Anno Christi. MDLIX.

## Errata in textu sic corrigito.

Pagina. 14. linea. 4. *δβελαια*. scribe *δβελαια*.

19 lin. 21. *δβελαιαν*. scr. *δβελαιαν*.  
30 lin. 14. quintum scr. quartum.  
37 lin. 17. opticos. scr. opticos.  
39 lin. 8. famulatur. scr. famulatur.  
ead. lin. 11. cauius. scr. cauitas.  
44 lin. 7. scutalem. scr. scutalem.  
57 lin. 38. vertebra. scr. coniugatio.  
58 lin. 19. illorum. scr. illorum.  
64 lin. 23. & 24. *σπῆρος*. scr. *σπῆρος*.  
81 lin. 21. crassissima. scr. crassissima.  
83 lin. 26. ipsum. scr. ipsum.  
85 lin. 1. prima non paruis. dictio prima abūdar.

ead. lin. 6. nam exterius crassius est, latius ac depressum magis. scr. nam interius crassius est; exterius autem latius, ac depressum magis.

ead. lin. 33. quintus. scr. octauus.

104 lin. 31. *συνδευος*. scr. *συνδευος*.

110 lin. 7. reicimus. scr. reicimus & vbiūque scriptum inuenieris reicio per simplex i. scr. per duplex ij.

112 lin. 4. manui. scr. manus.

ead. lin. 24. praeferat. scr. praeferat.

126 lin. 2. quemadmodum voluit. scr. quemadmodum voluit Gal.

138 lin. 19. a spinis extremarum dictio extremarum superest.

140 lin. 3. vitalia. scr. naturalia.

154 lin. 9. pedem. scr. pedis.

156 lin. 32. summa manu. scr. summam manu.

167 lin. 22. axilla. scr. axillari.

170 lin. 20. lirion. scr. linon.

173 lin. 26. ad vteri. dictio ad superest.

179 in inscriptione de iecore, & venis lib. 6.

scr. de corde, & arterijs lib. 7.

183 lin. 1. cranei. scr. cranij. & vbiūque scriptum inuenieris craneum per e. scr. per i.

184 lin. 30. conformi. scr. rectiformi.

187 lin. 11. ile. scr. ileique.

200 lin. 2. hic, dictio hic superest.

202 lin. 8. & 33. cucullarem. scr. cucullarem.

205 lin. 19. praeferat. scr. praeferant.

206 lin. 12. impartiri. scr. impertiri.

209 lin. 20. decimum. scr. decimumque.

210 lin. 16. trochantira. scr. trochantire.

217 lin. 6. beatas celorum mentes intueamur.

scr. beatas celorum mentes intueamur.

218 lin. 24. paulo vltcrius progreditur. oculi di-

midium penes vitreū humorem natura uea-

collocat. scr. & paulo vltcrius progreditur

ad oculum dimidium. Penes vitreum humo-

rem natura ueam collocat.

ead. lin. 16. Graece latina. scr. Graece latine.

219 lin. 26. se praeferat. Dictio se superest.

233 lin. 31. sint. scr. sunt.

235 lin. 3. siphiae. scr. siphac.

ead. lin. 7. validaeque. scr. valideq.

236 lin. 34. sancte. scr. sancte.

237 lin. 34. eandem. scr. tandem.

ead. lin. 36. continentur. scr. continentur.

239 lin. 1. circumdatur. scr. circumdantur.

240 lin. 3. minus. scr. magis.

ead. lin. 4. vniuntur. scr. vniunt.

244 lin. 6. caput, & c. illud, & c. superest.

210 lin. 40. medij. scr. medij.

211 lin. 25. materia. scr. materia.

262 lin. 15. nosce. scr. noscere.

ead. lin. 39. animaduertendis. scr. animaduert-

endis.

## Errata in postillis sic corrigito.

Pagina. 12. postilla. 7. Hippocratis. scr. Hippo-

crates.

14 post 3. *δβαλα*. scr. *δβαλα*.

16 post 9. fungosa. scr. fungosa.

23 post 14. tertius. scr. tertij.

ead. post ult. quartus. scr. quartj.

25 post 9. capiti. scr. capitis.

49 post 6. sic. scr. sit.

50 post vltima committur. scr. committitur.

53 post 1. articulatur. scr. articulantur.

62 post 5. Florentia. scr. Florentia.

ead. post vlt. comparantur. scr. comparantur.

74 post 6. *καρτος*. scr. *καρτος*.

ead. post 8. quatuor. scr. quatuor.

85 post 1. prima. scr. rima.

ead. post 9. quintus. scr. octauus.

97 post 1. selsaminis. scr. selsaminorum.

ead. post 2. reposita. scr. repositu.

101 post 12. humeris. scr. humeri.

124 post 3. anatomem. scr. ananomen.

145 post vlt. in lapide. scr. lapidem.

165 post. vlt. hzmorrhoidales. scr. hzmorrhoidales.

168 post 5. iecoraria. scr. iecoraria.

170 post 6. lirion. scr. linon.

209 post 4. conecitur. scr. connectantur.

210 post 4. vltus iamenti iner. scr. vltus ligame-

ti inter.

212 post 8. paristhmiz. scr. paristhmiz.

ead. post 5. glandula in sella sphenoidis fuci-

piens. scr. glandula in sella sphenoidis fuci-

piens.

228 post 7. suspectat. scr. suspecta.

233 post 4. lienz. scr. liene.

239 post 12. suastantia. scr. substantia.

243 post 8. abq. scr. abq.

244 post vlt. collunt. scr. collum.

247 post 1. vmbilicali. scr. vmbilicalis.

251 post 10. oppitum. scr. oppositum.

252 post 4. continebantur. scr. contineantur.

ead. post 8. descriptio singularum partium in-

fantis. scr. descriptio singularum partium in-

fantis.

257 post 4. constiui. scr. constiui.

264 post 3. vittu. scr. vitri.

Cetera, si qua sunt, lector non omnino oiscians per se ipse facile animaduertet, qualia sunt commata, & cola nonnulla, vel literarum inuersiones.



**N**Os Frater Felix Perettus de Montealto, Doct. Theol. ex Ord. Min. Conuent. in  
Conuentu magne domus Venet. Regens, & Heretice prauitatis Inquisitor. Quia vi-  
dimus, & legimus opus quoddam Latino compilatum sermone, de medica disciplina  
tractans, cui titulus, *Anathomia Do. Realdi Columbi Cremonensis*; & errorem in eo nec  
vllum deprendimus contra Fidem Catholicam, bonos mores, aut principes; Ideo admitti-  
mus, &c. In quorum fidem, &c. Venet. Ex magna Domo Fratr. Min. Die xxiiij.  
Ianuary.

M D LIX.

Idem Frater Felix, qui supra, Regens, & Inquisitor, manu propria.







618756997





